

DIPUTADOS IGNORAN ACUERDOS, CIENCIA Y VOZ CIUDADANA AL RECHAZAR AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO EN RESTAURANTES Y BARES



Organización Mundial de la Salud
Día Mundial No Tabaco
Premio 2011

[Inicio](#) [Contacto](#)

Buscar en este sitio ...

BUSCAR

[NOSOTROS](#) [NUESTRAS ACCIONES](#) [COMO PARTICIPAR](#) [TABAQUISMO EN CHILE](#) [NOTICIAS DE CHILE Y LA REGIÓN](#) [CENTRO DE DOCUMENTACIÓN](#)

Portada / Nuestras Actividades / DIPUTADOS IGNORAN ACUERDOS, CIENCIA Y VOZ CIUDADANA AL RECHAZAR AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO EN RESTAURANTES Y BARES

DIPUTADOS IGNORAN ACUERDOS, CIENCIA Y VOZ CIUDADANA AL RECHAZAR AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO EN RESTAURANTES Y BARES



ignorando evidencia científica y voz popular, 47 diputados votaron dejar fumar en restaurantes y bares

29 de enero de 2012, Valparaíso – La Cámara de Diputados aprobó la propuesta gubernamental de reformar la Ley de Tabaco de manera extraña; rechazando los ambientes libres de humo de tabaco en bares y restaurantes.

Los diputados aprobaron la propuesta general y la despacharon al Senado con una votación en general de 66 votos a favor, 22 en contra y 12 abstenciones.

Pero se rechazó (con 47 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones) la disposición que prohibía fumar en pubs, restaurantes y casinos de juego, salvo en sus patios o espacios al aire libre; y la que disponía que en el caso de hospitales y organismos del Estado, el director de Servicio determinaría el área delimitada para los fumadores (47 votos en contra, 41 a favor y 10 abstenciones).

La votación vulneró el acuerdo establecido la semana pasada entre la Comisión de Salud y la OMS. La Comisión de Salud aprobó la

EL PULSO: NOTICIAS DE CHILE Y EL MUNDO

> 19 Jan 2012 CHILE: Diputados mandan al Senado proyecto sobre ambientes libres de humo de tabaco Los diputados aprobaron y despacharon al Senado, a segundo trámite constitucional, el proyecto (boletín 7914) que modifica la ley del Tabaco, en materia de ambientes libres de humo. La votación en general fue de 66 votos a favor, 22 en contra y 12 abstenciones. Sin embargo, se rechazó, con 47 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones, la disposición que prohibía fumar en pubs, restaurantes y casinos de juego, salvo en sus patios o espacios al aire libre; y la que disponía que en el caso de hospitales y organismos del Estado, el director de Servicio determinaría el área delimitada para los fumadores (47 votos en contra, 41 a favor y 10 abstenciones).

> 18 Jan 2012 CHILE: Senado: Comisión promete revertir indicaciones de Concertación y UDI a proyecto de ley antitabaco Esto porque a pesar de que el espíritu de la iniciativa era de tolerancia cero al

<http://www.chilelibredetabaco.cl/2012/01/diputados-rechazan-ambientes-libres-de-humo-de-tabaco/>

Anti-tobacco legislation in Chile: A mere smokescreen?



Bao Anh Nguyen
Andrea Feigl


DRCLAS

Jan 19th,
2012

Chile: highest smoking rate in LAC



Tobacco as the 4th leading risk factor





Tobacco Legislation and Policy

1950: Causal link between smoking and lung cancer

- **1995; Law 19.419 on Matters Related to Tobacco Advertising and Consumption**
- **2003: Law 19.884 on Electoral Spending**
- **2005: Chile ratifies the Framework Convention on Tobacco Control**
- **2006: Law 20.105 (modifies Law 19.419)**
- **2008: FCTC Guidelines Art. 5.3.**
- **2009: Law 20.285 on Public Transparency and Access to Information**
- **2011/12: law on restriction of smoking in public spaces**

Research Question

- **What was the impact of the 2005 tobacco law?**
- **What are the reasons for these preliminary results?**
 - Impact on prevalence, smoking rates, and smoking initiation age
 - Political context and factors
 - Economic context

Methodology

Interviews with key stakeholders:

- Dr. María Teresa Valenzuela Schmidt (Universidad de Chile)
- Professor Gonzalo Valdivia (Public Health Department of Universidad Católica de Chile)
- Dr. David Debrott, Economist

ENS (Encuesta Nacional de Salud) 2003 and 2009 dataset:

Surveys distributed to nationally representative Chilean sample (≥ 15 years and older) to wave 1 (2003) and wave 2 (2009).

Objective: to examine changes in smoking outcomes from 2003 to 2009 (pre- and post- tobacco legislative and policy reform).

Respondents

Wave 1 (2003): 3619 (40%)

Wave 1:

Mean age: 49.20 years

Education: 8.60 years

Males: 1646 (45%)

Females: 1973 (55%)

Wave 2 (2009): 5412 (60%)

Wave 2:

Mean age: 46.56 years

Education: 9.71 years

Males: 2198 (41%)

Females: 3214 (59%)


Initial comparisons for group equivalency?

Age: $t(9029) = 6.56, p < .01$.

Education: $t(8890) = -9.807, p < .01$.

Gender: $\chi^2 (N= 9031) = 21.03, p < .01$.


Age of Smoking Initiation (2003 and 2009)



$$F(4, 2943) = 162.81, p < .001; R^2 = .18.$$

Wave status: $\beta = -.19$, $t(2241) = -11.26, p < .001$.


Past 30-Day Tobacco Use (2003 and 2009)



$F(4,2239) = 12.72, p < .001; R^2 = .02.$

Wave status: $\beta = .11, t(2241) = 5.19, p < .01.$

Past 30-Day Smoking by Age and Gender



$F(4,2239) = 12.72, p < .001; R^2 = .02$.

Gender X wave did not significantly improve prediction

Age X wave did not significantly improve prediction


Past 30-Day Smoking Behavior: Wave 2003

Agecategories	Mean	Std. Deviation	N
15-24	6.92	9.404	174
25-44	8.21	7.542	406
45-64	9.25	7.886	291
65+	7.95	7.281	61
Total	8.28	8.039	932

Past 30-Day Smoking Behavior: Wave 2009

Agecategories	Mean	Std. Deviation	N
15-24	8.32	12.481	237
25-44	10.71	12.884	543
45-64	12.24	16.109	449
65+	10.45	14.215	83
Total	10.79	14.136	1312

Implications of Results



Strong Lobby, Weak Implementation


Chiletabacos' response to the question: “How can you be dedicated to the business of selling a product that damages people's health?”

- “We share the community’s desire to reduce the impact of smoking on health, and we are committed to working with governments and organizations to achieve this.”
- **No increase in taxes, despite expert recommendations**
- **Weak enforcement of smoke-free spaces**
- **Only 1 public anti-tobacco campaign**
- **Only 1 anti-smoking label on cigarette boxes**
- **Most Night Clubs Smoking-Only**



Policy Recommendations

- 1) Focus on those who do not yet smoke, or who smoke occasionally
- 2) Focus on those who produce tobacco products
- 3) Focus on cultural change
- 4) Focus on the pocket book



Questions/Comments?

Gracias!

Ley de Tabaco 19.419 (1995)

Ley de Tabaco 20.105 (2006)

Art.1º	Actividades relacionadas al tabaco
Art.2º	No publicidad en <18 años.
Art.3º	Venta a <16 años.
Art.4º	Advertencia de riesgos en salud.
Art.5º	Programas de educación en colegios.
Art.6º	Facultad de Servicios de Salud.
Art.7º	Prohibido fumar espacios públicos.
Art.8º	Infracciones constituyen falta.
Art.9º	Sanciones cursadas por Juez de Policía Local.
Art.10º	Responsabilidad individual.
Art.11º	Servicios de Salud actúa como parte en procesos legales
Art.12º	Vigencia legal.

- LEY 19.419. Diario Oficial 09.10.1995. REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA RELACIONADAS CON EL TABACO.
- Ley 20.105. Diario Oficial de 16.05.06 Modificación Ley 19.419.

Ley de Tabaco 19.419 (1995)

Ley de Tabaco 20.105 (2006)

Art.1°	Actividades relacionadas al tabaco
Art.2°	Publicidad: solo excepcionalmente en los lugares de venta.
Art.3°	Menores de edad: prohibir la venta a menores de 18 años
Art.4°	Advertencia para la salud: modificación en cajetillas y anuncios publicitarios.
Art.5°	Programas de educación en colegios.
Art.6°	Informes a la autoridad: informe anual sobre composición de los productos
Art.7°	Prohibiciones: ambientes libres de humo
Art.8°	Procedimiento y sanciones: más estrictas y de mayor costo.
Art.9°	Sanciones cursadas por Juez de Policía Local.
Art.10°	Responsabilidad individual.
Art.11°	Servicios de Salud actúa como parte en procesos legales
Art.12°	Vigencia legal.
Prevención de riesgos	

LEY 19.419. Diario Oficial 09.10.1995. REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA RELACIONADAS CON EL TABACO.

Ley 20.105. Diario Oficial de 16.05.06 Modificación Ley 19.419.



Políticas Internacionales



Etiquetas de Advertencia

- **Intervenciones propuestas:** aumentar el tamaño de las etiquetas, incluir mensajes y/o imágenes
- Favorecerían mayor conocimiento de los riesgos asociados a tabaco y motivación para dejar de fumar

Conocimientos de Riesgos Asociados a Tabaco	Intención de cese tabáquico OR (IC 95%)
Cáncer de pulmón	2.88 (2.34 - 3.54)
Cardiopatía	2.51 (2.16 - 2.91)
Accidente Cerebrovascular	1.91 (1.70 - 2.15)
Ca. Pulmón en no fumadores	1.62 (1.45 - 1.81)
Impotencia	1.56 (1.42 - 1.77)

Hammond D, Fong GT, McNeill A, et al. Effectiveness of cigarette warning labels in informing smokers about the risks of smoking: findings from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. *Tob Control* 2006;15(suppl III):iii19–25.

Borland R, Yong H-H, Siahpush M, et al. Support for and reported compliance with smoke-free restaurants and bars by smokers in four countries: findings from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. *Tob Control* 2006;15(suppl III):iii34–41.

Borland R, Yong H-H, Cummings KM, et al. Determinants and consequences of smoke-free homes: findings from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. *Tob Control* 2006;15(suppl III):iii42–50.