

Observatorio Chileno de Drogas

Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2011
8º Básico a 4º Medio

SENDA
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

Observatorio Chileno de Drogas

Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2011 8º Básico a 4º Medio

SENDA
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, 2011

Observatorio Chileno de Drogas
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile
Santiago, Chile
2012

© SENDA
Registro de Propiedad Intelectual N° 224.806
ISBN: 978-956-9141-11-9

Equipo Responsable: Observatorio Chileno de Drogas
Producción editorial e impresión: Andros Impresores

ÍNDICE

7 **PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÕGICOS**
10 Objetivos del estudio
10 Metodología
10 Elaboración de la muestra y trabajo de campo
10 Marco muestral
10 Diseño muestral
11 Procedimientos de selección muestral
11 Factor de expansión
12 Trabajo de campo
13 Muestra lograda

17 **PRINCIPALES RESULTADOS**
19 Consumo de tabaco
19 Consumo de alcohol
21 Consumo de marihuana
23 Consumo de cocaína
23 Consumo de pasta base
24 Consumo de inhalables
24 Otros indicadores asociados al consumo de drogas
26 Factores protectores y de riesgo
26 Percepción de riesgo
26 Disponibilidad y acceso
27 Familia y entorno
28 Drogas en el colegio y uso de sustancias en el entorno
29 Principales actitudes ante la marihuana
29 Percepción de problemas asociados a la marihuana y el alcohol

31 **PRINCIPALES RESULTADOS REGIONALES**
33 Región de Arica y Parinacota
37 Región de Tarapacá
42 Región de Antofagasta
47 Región de Atacama
52 Región de Coquimbo
57 Región de Valparaíso
62 Región Metropolitana de Santiago
67 Región del Libertador Bernardo O'Higgins
72 Región del Maule
77 Región del Biobío
82 Región de la Araucanía
87 Región de Los Ríos
91 Región de Los Lagos
96 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
101 Región de Magallanes y Antártica Chilena

107 **ANEXO 1: CUADROS ESTADÍSTICOS CON INFORMACIÕN COMPLEMENTARIA**

141 **ANEXO 2: CUESTIONARIO APLICADO**

Principales Aspectos Metodológicos

Principales Aspectos Metodológicos

SENDA ha realizado el Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile (2011) en conformidad con el compromiso de observar las tendencias en el uso de drogas en el país en población escolar a través de un estudio sistemático, metodológicamente consistente y en escala nacional. La serie en población escolar consta de nueve estudios: los tres primeros se llevaron a cabo con un instrumento que se conoce como DUSI (1995, 1997, 1999), bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación; los seis últimos, en cambio, se han realizado bajo formato, procedimientos y responsabilidad de SENDA (2001, 2003, 2005, 2007, 2009 y 2011). La serie DUSI no es comparable con la serie SENDA, de manera que solo se informa acerca de la evolución del uso de drogas en población escolar con los resultados obtenidos en estos últimos estudios.

La serie de estudios en población escolar se realiza cada dos años, durante el segundo semestre de los años impares. La etapa de levantamiento de terreno del estudio correspondiente al presente año, se ejecutó entre los meses de octubre y diciembre de 2011, en 103 comunas del país. Esta serie ha conservado sus características fundamentales en cuanto a su representatividad nacional y regional, el mecanismo de selección de estudiantes en cada curso, y los protocolos de aplicación del cuestionario.

Por otro lado, el módulo de prevalencias de consumo de drogas tampoco ha registrado grandes modificaciones respecto a sus predecesores, salvo en el orden de las preguntas y la estructura del cuestionario para una mejor comprensión de los estudiantes. A lo largo de la serie, la muestra no ha variado demasiado en cuanto a tamaño y cobertura. El aumento en el número de comunas que configuran el universo de estudio, además de buscar mejorar la precisión de los parámetros estimados, se debe a la subdivisión de comunas antiguas y al crecimiento poblacional de algunas a más de 30.000 habitantes.

CUADRO 1:
Serie de estudios nacionales de drogas en población escolar

Año	Estudio	N° de comunas	Muestra efectiva	Universo
2001	IV Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.722	825.908
2003	V Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.489	975.364
2005	VI Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	59.881	988.149
2007	VII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	91	52.145	968.996
2009	VIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	99	48.980	969.339
2011	IX Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	103	33.509	863.886

En el presente estudio, la cantidad de alumnos encuestados fue de 33.509 pertenecientes a 2.068 cursos de 971 establecimientos educacionales, lo que equivale a un porcentaje de logro del 71%. La muestra no lograda se concentró principalmente en los establecimientos particulares pagados y en la región Metropolitana, que alcanzó el 56,3% y 60,8%, respectivamente.

Un elemento adicional a considerar es que en el 2011 se registraron movilizaciones estudiantiles (paro y/o toma) antes y durante el levantamiento de terreno, lo cual explica en parte la tasa de rechazo observada, principalmente en establecimientos municipales y subvencionados. Del total de establecimientos no logrados, el 23,5% se encontraba en toma al momento de encuestar. Esto, sumado al menor tiempo disponible para dar cumplimiento a las actividades curriculares del año en escuelas que reportaron movilizaciones en etapas previas, dificultó el trabajo de campo.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile 2011, tuvo como objetivos principales:

- Determinar la magnitud del uso de drogas en población escolar de 8° básico a 4° medio: por sexo, por cursos, por tipo de establecimientos y por regiones.
- Medir la evolución o tendencias del uso de drogas en población escolar en 2001 - 2003 - 2005 - 2007 - 2009 y 2011.
- Describir la magnitud y tendencias de algunos factores de riesgo/protección asociados al uso de drogas en población escolar.
- Conocer la magnitud del uso de nuevas drogas, tales como MDMA-Éxtasis y otras drogas de síntesis.

METODOLOGÍA

El estudio consistió en la aplicación de encuestas en colegios a los alumnos que se encuentran cursando 8° básico, 1° medio, 2° medio, 3° medio y 4° medio. Se realizó en un total de 103 comunas urbanas seleccionadas a lo largo de las 15 regiones del país. La muestra teórica inicial considerada para el estudio fue de alrededor de 58.000 estudiantes provenientes de 2.903 cursos de entre 8° básico y 4° medio.

Considerando el protocolo de trabajo de campo, la cantidad máxima de alumnos a entrevistar por curso no debía sobrepasar los 20 alumnos.

El estudio se basó en una muestra de colegios, cursos y alumnos, con diseño probabilístico en cada una de las comunas seleccionadas a nivel nacional. La aplicación de la encuesta fue realizada por un organismo externo a SENDA, convocado mediante licitación pública (Adimark GfK).

Los análisis respecto del consumo de drogas a nivel regional que se presentan en este informe se encuentran desagregados por sexo y dos tramos de cursos. Mayores desagregaciones de la muestra conducen a errores muestrales altos y, por lo tanto, a estimaciones con baja precisión. Ello explica, entonces, por qué no es posible desagregar la información a nivel comunal. La explicación anterior es válida también para aclarar por qué no es posible obtener medidas de consumo de riesgo de drogas ilícitas por regiones, en el entendido de que las prevalencias de consumo con temporalidad menor a un año son en general bajas para poder inferir dicha información con un escaso margen de error. No obstante lo anterior, dadas las altas prevalencias de consumo de alcohol en el último mes, es posible obtener las prevalencias de embriaguez por ingesta de alcohol en cada una de las quince regiones del país, información que se incluye en el apartado dedicado a regiones.

Elaboración de la muestra y trabajo de campo

En la presente sección se describen los procedimientos utilizados para construir la muestra del Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2011.

En primer lugar se describe el marco muestral general del estudio, luego el diseño muestral para así señalar los procedimientos técnicos aplicados en la construcción de la muestra y los factores de expansión.

Marco muestral

El marco muestral para la aplicación del estudio corresponde al directorio de colegios proporcionado por el Ministerio de Educación, para el año escolar 2011. Los tipos de colegios o establecimientos, a saber, son los siguientes:

- Públicos Municipalizados: dependen de los municipios y reciben aporte del Estado por alumno matriculado y asistiendo regularmente a clases.
- Particulares Subvencionados: son propiedad de privados y reciben una subvención del Estado por alumno matriculado y asistiendo regularmente a clases.
- Particulares Pagados: pertenecen a privados y no reciben aporte del Estado.

El universo del estudio corresponde a la población escolar del 2011 de Chile, conformada por los alumnos matriculados en establecimientos educacionales municipalizados, particulares subvencionados y particulares privados de 8° básico, 1° medio, 2° medio, 3° medio y 4° medio de las 103 comunas seleccionadas a lo largo de las 15 regiones del país. Las comunas poseen una población urbana igual o superior a 30 mil habitantes. La selección de las comunas, por ende, no es aleatoria, sino que se sustenta en un criterio de magnitud poblacional. La población que tiene posibilidad de ser seleccionada corresponde a los alumnos matriculados en establecimientos educacionales de los niveles y dependencias ya señalados.

Diseño muestral

El diseño muestral del Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar consiste en un muestreo probabilístico estratificado por conglomerados bi-etápico.

a) **Probabilístico**
   Esto significa que las unidades de selección tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ingresar en la muestra para cada curso de la población, lo cual permite conocer la precisión de los resultados muestrales.
b) **Estratificado**
   Esto significa que las unidades de selección son agrupadas por características geográficas (regiones).
c) **Por conglomerados**
   Porque previamente se conforman conjuntos de unidades de los cuales se obtiene la muestra, correspondiente a los tipos de establecimientos educacionales y niveles de los cursos.
d) **Bi-etápico**
   Porque la unidad de selección es obtenida después de dos etapas.

La primera etapa consiste en la selección estratificada de cursos con probabilidad proporcional a su tamaño. A los diseños muestrales que cumplen la condición de que las probabilidades de inclusión de primer orden son proporcionales a una variable de tamaño auxiliar (matrícula, en el presente caso) se les denomina diseños con probabilidades de inclusión proporcionales al tamaño (PPT). La segunda etapa consiste en la selección aleatoria de estudiantes al interior de los cursos previamente seleccionados.

La definición de los estratos es determinada por la combinación de las variables comuna, dependencia (municipal, particular subven-

cionado y particular privado) y nivel (de 8º básico a 4º medio). De este modo, la muestra se define a nivel comunal, con segmentación según dependencia y nivel. Una vez seleccionados los cursos, se escogen aleatoriamente 20 alumnos en su interior.

La metodología de selección de la muestra se basó en el método de Sampford bajo el sistema de estratos, los que fueron definidos de acuerdo a tipos de dependencia, comuna, región y nivel. Así, para cada comuna, se seleccionó un total de 10 = 2 x 5 cursos (dos cursos por cada nivel escolar) en cada tipo de dependencia (particular subvencionado, municipal), salvo en el caso de los colegios particulares pagados, donde de acuerdo a la experiencia previa, es más difícil el acceso, por lo que se determinó realizar una sobremuestra en este tipo de establecimientos, llegando a un total de 15 = 3 x 5 cursos seleccionados.

En el método de Sampford los elementos son seleccionados con reemplazamiento, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Seleccionar el primer elemento con probabilidad a_i.
2. Seleccionar los n-1 restantes elementos con probabilidades proporcionales a,

$$\frac{a_i}{1 - a_i}$$

3. Finalizada la extracción, la muestra es aceptada si todos los elementos son diferentes. En caso contrario se rechaza, y se vuelve al paso 1.

Así pues, aunque en el proceso hay reemplazamiento, la muestra final no contiene elementos repetidos, por lo que se trata de un método sin reemplazamiento. Con este procedimiento se demuestra que la probabilidad de selección es proporcional.

Esta selección anidada permitió obtener, en términos muestrales, una representación de cada uno de los estratos que conforman la muestra, y con ello, impedir que por razones de selección aleatoria, quedara alguno de estos fuera.

Procedimientos de selección muestral

El marco muestral corresponde al directorio de matrículas del Ministerio de Educación más actualizado a la fecha de realización del estudio. Antes de seleccionar la muestra se debe depurar el directorio de matrículas de modo de responder a los requerimientos del diseño muestral ya descrito.

Los pasos generales a seguir son:

1. Seleccionar las comunas que se incluyen en el diseño muestral, definidas a priori de acuerdo al criterio poblacional ya mencionado. Durante el 2011 no se excluyeron los establecimientos pertenecientes a las zonas rurales.
2. Seleccionar los códigos de enseñanza correspondientes de acuerdo a los criterios utilizados por el Ministerio de Educación. En años anteriores se seleccionaron los códigos 110, 310, 410, 510, 610, 710, 810, de la variable cod_ense del directorio de matrículas.
3. Seleccionar los establecimientos que poseen como mínimo un alumno en al menos uno de los niveles de interés (de 8º básico a 4º medio).
4. La variable cod_depe en el directorio de matrículas posee cinco categorías. Siguiendo los criterios de agrupación de SIMCE, dicha variable debe ser recodificada del siguiente modo: Municipal (Corporación Municipal y Municipal DAEM, códigos 1 y 2), Particular Subvencionado (Particular Subvencionado y Corporación Privada o de Administración Delegada, códigos 3 y 5), y Particular (Particular Pagado, código 4).
5. El directorio de matrículas cuenta con información sobre el número de alumnos (de 8º básico a 4º medio) y el número de cursos por nivel. A partir de la división de ambas cifras (alumnos del nivel y cursos del nivel), se puede obtener el tamaño promedio de cada curso. En las versiones anteriores del estudio, el número de cursos de un nivel se obtuvo a través de la división del total de alumnos por 30, pues se asume que este es el número promedio de alumnos por curso en el país. El 2011 se decidió utilizar la información disponible en el directorio de matrículas, de modo de obtener una cifra más precisa del número de cursos y su tamaño en cada establecimiento. Esto implicó realizar una serie de procedimientos asociados al formato del directorio de matrículas, con el objetivo de disponer de un registro de cursos que especifique su tamaño promedio. Dichos procedimientos no son complejos y dependerían finalmente del formato de la base de datos requerido por el programa estadístico usado para seleccionar la muestra. En el caso específico de la muestra 2011, esta fue calculada utilizando el software SAS.
6. Antes de seleccionar la muestra, a cada curso se le debe asignar una letra en orden alfabético (de la A a la Z), para poder posteriormente identificar los cursos seleccionados.
7. Se debe calcular la proporción de alumnos que definirá el número de casos a seleccionar en cada estrato. Por tratarse de una asignación proporcional, dicho valor será igual al total de alumnos de un estrato dividido por el total de alumnos del marco.
8. Puesto que existen estratos muy pequeños, el 2011 se definió como uno el número mínimo de cursos a seleccionar por estrato.

Factor de expansión

Una vez levantada la totalidad de la muestra, se debe calcular el factor de expansión. Este corresponde al inverso de la probabilidad de selección de cada alumno.

Su fórmula es:

$$Factor = \frac{M_h M^*_{hi}}{M_{hi} N_h m_{hi}}$$

Donde,

M_h es el número de alumnos del estrato h (combinación de comuna, nivel y dependencia), según el directorio de matrículas del Mineduc.

M_{hi} es el número de alumnos en el curso seleccionado i, según el directorio.

N_h *es el número de cursos de la muestra en el estrato h, a nivel* comunal.

M^*_{hi} es el número de alumnos en el curso seleccionado i, según actualización en terreno.

m_{hi} es el número de alumnos seleccionados por curso i del estrato h, a nivel comunal.

Trabajo de campo

Pretest e instrumento
El instrumento base del presente estudio contenía algunas diferencias respecto al empleado para la versión 2009, lo que hizo necesario evaluar la pertinencia del cambio del cuestionario a través de la realización de un estudio piloto con las siguientes características:

- Testeo de 130 preguntas, muchas de ellas con sub-preguntas separadas por letras
- Testeo de dos formatos de cuestionario: uno con características similares a los años anteriores (en términos de diagramación, y mejorando el orden de este), al que nos referiremos como formato 1, y otro con un formato que permitiera al estudiante ir avanzando correlativamente para cada pregunta, y que dejara en claro que la encuesta estaba dividida en secciones temáticas, a diferencia de las utilizadas en años anteriores, el que fue denominado formato 2.
- El periodo de aplicación consideró los días 10, 11 y 12 de agosto de 2011 y se realizó en ocho colegios. En cinco de ellos se aplicó el cuestionario en formato 1 y en los tres restantes se aplicó el formato 2.

Ambos cuestionarios testeados fueron de formato autoaplicado, con la inclusión de una hoja de respuesta, y contenían 131 preguntas con alternativas de respuesta sobre uso de drogas lícitas e ilícitas, factores asociados y descriptores individuales, socioeconómicos y demográficos, con una duración estimada que no sobrepasaría los 45 minutos.

De acuerdo a los resultados del estudio piloto, según las tasas de no respuesta de cada pregunta y la duración total de la entrevista, el formato 2 resultó más adecuado a la hora de contestar el cuestionario. Este cuestionario resultó ser, mediando algunas modificaciones de contenido y diseño al original, el instrumento de aplicación definitivo.

Instrumento
El diseño del cuestionario buscaba principalmente facilitar el entendimiento del estudiante y aumentar su tasa de respuesta. Esto, debido a que se detectó que en experiencias anteriores el formato del cuestionario pudo haber influido en que los alumnos omitieran ciertas preguntas y sintieran más tedio o rechazo del previsto a la hora de contestar, sobre todo cuando estaban llegando al final de la encuesta o cuando veían varias preguntas en una misma línea horizontal.

Por ello se optó por utilizar un formato más lineal, que no indujese al alumno a omitir preguntas. Además, se destacó el término e inicio de secciones a través de títulos, se circuló los números de las alternativas, se destacó en negrita el número de preguntas y las indicaciones de cómo responder, con el fin de evitar errores al momento de marcar la respuesta.

El instrumento final está adjunto como Anexo a este informe.

Hoja de registro
Para facilitar y mejorar el levantamiento de terreno se implementó una hoja de registro que fue llenada para cada curso encuestado, lo cual permitió dejar constancia de todas las situaciones de terreno a la hora de realizar la aplicación de la encuesta, además de variables de identificación del curso y colegio que permiten respaldar la información entregada por cada alumno. Esta fue completada por cada encuestador y fue llenada antes y durante la aplicación del cuestionario.

Información a colegios
Durante el trabajo de campo, cada facilitador se presentaba en los establecimientos con una carta informativa firmada por el Subsecretario de Educación, con el fin de generar instancias de acceso a los establecimientos mediante este documento oficial que respalda la seriedad e importancia del estudio. Además, se envió una carta informativa del estudio a todos los establecimientos por el correo físico y/o electrónico, firmada por la directora de SENDA.

Entrevistadores
Las personas que aplicaron este estudio en terreno fueron seleccionadas específicamente para cumplir esta función, y entrenadas por personal técnico a través de instructivos de capacitación en todas las regiones del país.

De acuerdo al plan de trabajo, se realizó el levantamiento de las encuestas en forma simultánea en todo el país con los equipos regionales, contando con un número adecuado de facilitadores por zona. En total se capacitó a 228 personas a lo largo del país, con la siguiente distribución por regiones:

CUADRO 2:
Distribución de encuestadores, por región. Chile, 2011

Región	Número de encuestadores
Tarapacá	15
Antofagasta	13
Atacama	5
Coquimbo	14
Valparaíso	19
O'Higgins	7
Maule	10
Biobío	26
Araucanía	10
Los Lagos	5
Aysén	8
Magallanes	10
Los Ríos	10
Arica y Parinacota	4
Metropolitana	72
TOTAL	**228**

Fechas de trabajo
Para evitar distorsiones en los resultados y dificultades para cumplir con la muestra presupuestada se decidió aplicar el estudio en una sola etapa, la que comenzó el día 20 de octubre de 2011 y se extendió por aproximadamente dos meses. Se decide iniciar la aplicación un mes después de Fiestas Patrias, debido a que estas podrían, eventualmente, afectar los reportes de consumo de último mes.

Supervisión
Por las características del estudio, se aplicó una supervisión de tipo coincidental, donde los supervisores visitan los establecimientos el mismo día y hora en que los encuestadores han sido citados por las autoridades del establecimiento para la aplicación de las entrevistas. De acuerdo a lo estipulado, se supervisó un 25% del trabajo

realizado por cada encuestador además de contrarrestar la información de hojas de registro por cada curso entrevistado, con las encuestas realizadas.

Dificultades del estudio

En el 2011 se registraron movilizaciones estudiantiles (paro y/o toma) antes y durante el levantamiento de terreno, lo cual explica en parte la tasa de rechazo observada, principalmente en establecimientos municipales y subvencionados. Lo anterior, independientemente de no poder ingresar a los establecimientos, provoca que las clases se desarrollen de forma irregular, en particular en el caso de los cuartos medios, cuyo término del año escolar es previo al resto de los cursos. Esta intermitencia provocó que muchos de los establecimientos educacionales postergaran o rechazaran la aplicación de la encuesta (situación que se dio de forma más recurrente en establecimientos municipales). Del total de establecimientos no logrados, el 23,5% se encontraba en toma al momento de encuestar. Esto, sumado al menor tiempo disponible para dar cumplimiento a las actividades curriculares del año en escuelas que reportaron movilizaciones en etapas previas, dificultó el trabajo de campo.

La gran cantidad de establecimientos que no señalaban una respuesta concreta acerca de si permitirían aplicar el cuestionario a los alumnos, fue otro motivo de no logro. A pesar de que el protocolo de visita contempla un mínimo de tres contactos y que, en algunos casos, con material en mano el encuestador propusiera la aplicación de la encuesta en el momento, se produjeron situaciones donde estos establecimientos "pendientes de respuesta" pasaran a ser establecimientos perdidos al final del año escolar.

Un tercer motivo de rechazo ocurrió cuando el director y/o el centro de padres no permitieron la aplicación de la encuesta.

Muestra lograda

El diseño muestral implicaba que cualquier situación de reemplazo podría ser hecha solo sobre aquel curso perteneciente al mismo estrato (conglomerado) del curso original. Por lo tanto, todos aquellos cursos pertenecientes a los establecimientos que rechazaron la aplicación, incluidos aquellos en paro o toma, iban siendo reemplazados de acuerdo a su estrato por el curso correspondiente que figuraba en la muestra de reemplazo.

La cantidad de alumnos encuestados fue de 33.509, pertenecientes a 2.068 cursos de 971 establecimientos educacionales.

GRÁFICO 1:
Distribución de cursos logrados y teóricos, por sexo y dependencia administrativa. Chile, 2011



La información entregada por el gráfico 1, indica que el nivel de logro global a nivel de cursos es de un 71,2% (2068/2903). Dentro de los factores que explican esta situación se encuentra el bajo nivel de logro en los cuartos medios (50,2%) y en los establecimientos particulares pagados (56,3%). El nivel de logro obtenido en el presente estudio es cerca de 14 puntos porcentuales más bajo que el registrado en 2009 (85,2%).

La descripción de la muestra obtenida se detalla a continuación:

CUADRO 3:
Distribución de casos logrados, por comunas y dependencia administrativa. Chile, 2011

Región	Comuna	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	Total
Tarapacá	Iquique	148	179	52	379
	Alto Hospicio	59	140		199
	Total Regional	**207**	**319**	**52**	**578**
Antofagasta	Antofagasta	153	177	229	559
	Calama	170	148	92	410
	Total Regional	**323**	**325**	**321**	**969**
Atacama	Copiapó	38	167	235	440
	Vallenar	138	175	69	382
	Total Regional	**176**	**342**	**304**	**822**
Coquimbo	La Serena	155	156	141	452
	Coquimbo	156	177		333
	Ovalle	146	177	54	377
	Total Regional	**457**	**510**	**195**	**1.162**
Valparaíso	Valparaíso	133	172	30	335
	Concón	137	175	0	312
	Quilpué	125	160	150	435
	Villa Alemana	104	164	235	503
	Viña del Mar	100	161	50	311
	Los Andes	161	167	200	528
	La Ligua	151	129		280
	Cabildo	145	137		282
	Quillota	149	164	49	362
	Calera	124	183		307
	Limache	103	161		264
	San Antonio	126	144		270
	San Felipe	150	154	152	456
	Total Regional	**1.708**	**2.071**	**866**	**4.645**
O'Higgins	Rancagua	62	228	128	418
	Coltauco	157	120		277
	Machalí	149	162	232	543
	Rengo	167	161		328
	San Fernando	153	163	207	523
	Total Regional	**688**	**834**	**567**	**2.089**
Maule	Talca	40	191	237	468
	Constitución	155	191	73	419
	Cauquenes	159	198		357
	Curicó	115	183	264	562
	Linares	44	157	63	264
	Parral	148	176		324
	Total Regional	**661**	**1.096**	**637**	**2.394**
Biobío	Concepción	99	183	91	373
	Coronel	154	139		293
	Chiguayante	99	176	205	480
	Lota	35	158		193
	Penco	147	66		213
	San Pedro de la Paz	52	178	202	432
	Talcahuano	77	159	161	397
	Tomé	171	40		211
	Hualpén	186	163	183	532
	Curanilahue	191	169		360
	Los Ángeles	146	161	107	414
	Chillán	131	171	133	435
	Total Regional	**1.488**	**1.763**	**1.082**	**4.333**
Araucanía	Temuco	123	186	91	400
	Padre Las Casas	40	175		215
	Pitrufquén	150	172		322
	Villarrica	86	118	33	237
	Angol	194	176	0	370
	Victoria	195	152		347
	Total Regional	**788**	**979**	**124**	**1.891**

Región	Comuna	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagado	Total
Los Lagos	Puerto Montt	82	177	122	381
	Castro	32	145		177
	Ancud	31	175		206
	Osorno	40	124	138	302
	Total Regional	**185**	**621**	**260**	**1.066**
Aysén	Coyhaique	144	129		273
	Puerto Aysén	91	142		233
	Total Regional	**235**	**271**		**506**
Magallanes	Punta Arenas	28	160	266	454
	Total Regional	**28**	**160**	**266**	**454**
Metropolitana	Santiago	47	115	153	315
	Cerrillos	86	72		158
	Cerro Navia	125	142		267
	Conchalí	20	40		60
	El Bosque	71	158		229
	Estación Central	138	104	157	399
	Huechuraba	16	157	0	173
	Independencia	119	190	39	348
	La Cisterna	105	152	73	330
	La Florida	107	107	150	364
	La Granja	151	148		299
	La Pintana	30	154		184
	La Reina	92	158	153	403
	Las Condes	188	58	189	435
	Lo Barnechea	78	35	16	129
	Lo Espejo	102	193		295
	Lo Prado	22	88		110
	Macul	32	176	60	268
	Maipú	94	86	35	215
	Ñuñoa	67	86	83	236
	Pedro Aguirre Cerda	122	177		299
	Peñalolén	120	137	87	344
	Providencia	0	197	180	377
	Pudahuel	114	148	147	409
	Quilicura	29	109	0	138
	Quinta Normal	59	140		199
	Recoleta	163	109	236	508
	Renca	21	32		53
	San Joaquín	110	141		251
	San Miguel	70	109	62	241
	San Ramón	132	33		165
	Vitacura	170	158	196	524
	Puente Alto	92	131	49	272
	Colina	92	134	89	315
	Lampa	85	101		186
	San Bernardo	65	106	143	314
	Buin	51	151	89	291
	Paine	131	119	0	250
	Melipilla	137	52	122	311
	Talagante	139	31	43	213
	Padre Hurtado	72	138		210
	Peñaflor	135	76	1	212
	Total Regional	**3.799**	**4.948**	**2.552**	**11.299**
Los Ríos	Valdivia	57	161	238	456
	La Unión	167	152	75	394
	Total Regional	**224**	**313**	**313**	**850**
Arica y Parinacota	Arica	112	114	225	451
	Total Regional	**112**	**114**	**225**	**451**

Principales Resultados

Principales Resultados

CONSUMO DE TABACO

En este estudio se observa una nueva disminución del uso diario de tabaco entre escolares, confirmando la tendencia a la baja observada en los últimos estudios publicados. Tomando como referencia la prevalencia de consumo en el último mes, el uso de cigarrillos desciende de 42% a 25,9% a lo largo de toda la serie, obteniendo en el estudio actual su registro más bajo. La prevalencia diaria de cigarrillos (20 o más días de consumo en el último mes) desciende desde 15,8% (inicio de la serie) a 8,1% en 2011. En los hombres la prevalencia diaria bajó de 11,6% a 7,5% y en mujeres de 13,9% a 8,7%, ambos descensos son estadísticamente significativos.

GRÁFICO 2:
Evolución de la prevalencia de consumo diario, mes y año de tabaco en Población Escolar. Chile, 2001-2011



La disminución en el uso diario de tabaco también se observa en todos los niveles. En octavo básico el descenso fue de 2,6 puntos porcentuales (5,3% a 2,7%) con respecto al inicio de la serie, mientras que en cuarto medio cae prácticamente a la mitad (de 26,6% a 13,8%). Por dependencia administrativa, se registran significativos descensos en colegios municipales (de 13,2% a 8,6%), subvencionados (de 12,2% a 7,8%) y particulares pagados (de 13,1% a 9,2%).

CUADRO 4:
Evolución de la prevalencia diaria de consumo de tabaco, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2003-2011

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2003	15,8	14,8	16,7	5,3	11,3	18,4	23,0	26,6	15,2	15,5	18,3
2005	15,3	14,2	16,5	4,7	11,4	17,8	21,6	24,8	14,7	15,3	17,1
2007	13,6	12,5	14,7	3,8	10,2	15,0	19,7	21,3	13,4	13,6	14,3
2009	12,7	11,6	13,9	4,3	9,8	14,1	17,9	19,4	13,2	12,2	13,1
2011	8,1	7,5	8,7	2,7	7,0	9,3	11,2	13,8	8,6	7,8	9,2

CONSUMO DE ALCOHOL

Los resultados para el uso de alcohol muestran una estabilización en el consumo respecto a lo observado en el último estudio, a diferencia de los tres estudios anteriores, en los que se registró un descenso de alrededor de 8 puntos porcentuales. Los resultados del presente estudio muestran que las declaraciones de consumo de alcohol en el último mes se encuentran en 34,7%, esto es una variación (que no es estadísticamente significativa) de 0,8 puntos porcentuales respecto al 2009. Al igual que en el caso del tabaco, este es el registro más bajo de toda la serie de estudios.

GRÁFICO 3:
Evolución de la prevalencia de consumo vida, año y mes de alcohol en Población Escolar. Chile, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes por sexo se observa que el consumo de los hombres bajó ligeramente de 35,6% a 34,6% entre 2009 y 2011, mientras que en las mujeres pasó de 35,5% en 2009 a 34,9% en 2011. Como se apreció en los estudios pasados, las prevalencias de consumo en hombres y mujeres son prácticamente iguales. Cuando se analizan estos resultados por curso, se advierte que los cuartos medios tienen una prevalencia (52,5% en 2011) casi tres veces mayor a la observada en octavos básicos (18,7%), y que la prevalencia de consumo crece (significativamente) a medida que el nivel aumenta. Respecto a dependencia administrativa del establecimiento, es posible notar que se mantuvieron las brechas entre los tres tipos de establecimientos. La diferencia de 12,5 puntos porcentuales (a favor de los colegios particulares) observada entre establecimientos particulares pagados y municipales es estadísticamente significativa, siendo levemente superior a la apreciada en el estudio anterior (9,8 puntos porcentuales). Finalmente, en términos generales, tanto por cursos y tipos de establecimientos no se advierten variaciones respecto al estudio anterior.

CUADRO 5:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2001-2011

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2001	38,9	40,3	37,5	20,9	32,8	41,2	49,9	55,4	33,7	40,4	49,4
2003	38,7	39,1	38,4	21,2	31,5	42,5	50,8	57,0	34,1	39,8	48,8
2005	43,3	43,2	43,5	21,4	36,8	47,8	55,6	62,3	38,2	44,7	54,2
2007	38,2	37,9	38,4	18,7	30,1	41,1	50,3	55,0	33,7	39,2	47,7
2009	35,5	35,6	35,5	17,6	28,1	37,7	45,7	52,8	32,9	35,5	42,7
2011	34,7	34,6	34,9	18,7	29,4	38,6	44,7	52,5	31,6	35,1	44,1

Entre los indicadores que permiten identificar patrones riesgosos de uso de alcohol se encuentra la medida que pregunta por el consumo de 5 o más vasos de alcohol (cerveza, vino o licor) en una salida habitual de sábado por la noche. Este indicador ha presentado una tendencia descendente desde el 2007, cuando marcó 11,9%, hasta el registro actual de 8,9%. A pesar de observar disminuciones tanto en hombres como en mujeres durante el último bienio y a diferencia de lo que ocurre con la prevalencia de consumo de último mes, el consumo de 5 o más tragos es significativamente mayor en hombres que en mujeres. El descenso de alcohol en sábado por la noche se concentra principalmente en terceros y cuartos medios y en establecimientos municipales y particulares pagados.

CUADRO 6:
Evolución de la intensidad de uso de alcohol en Población Escolar, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2003-2011

Proporción que declara que llega a tomar 5 o más tragos en una salida de sábado por la noche

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2003	13,4	18,0	9,0	5,0	10,4	15,4	18,8	21,8	13,2	13,6	13,7
2005	11,5	15,0	8,2	3,6	7,9	12,4	16,9	20,3	11,1	11,8	12,1
2007	11,9	15,6	8,2	3,9	8,3	12,5	17,2	19,3	11,9	11,6	12,6
2009	10,1	13,2	7,2	3,0	7,5	10,7	14,8	16,4	10,6	9,6	10,5
2011	8,9	11,7	6,3	3,4	7,1	9,8	12,3	15,7	9,2	9,0	6,7

El problema del indicador de intensidad de consumo presentado anteriormente es que hace referencia a un periodo muy restringido de tiempo (salida de sábado por la noche). Para caracterizar de mejor manera la intensidad de ingesta de alcohol en población escolar se incorporaron dos preguntas que hacen referencia al consumo de último mes con respecto a la fecha de encuesta: número de episodios de consumo intenso (5 o más tragos en una sola ocasión) y cantidad de tragos (medida estándar que contiene aproximadamente 13 gramos de alcohol puro) consumidos el día de mayor ingesta en el último mes.

Entre los estudiantes que reportaron consumir alcohol en el último mes, la proporción que declaró haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días fue de 64,3%, o en otras palabras, 2 de cada 3 han tenido a lo menos un episodio de consumo intenso (o embriaguez) en los últimos 30 días. Desagregando esta variable por sexo, se puede apreciar que un 68,1% de los hombres y un 60,6% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia estadísticamente significativa). Al desagregar este resultado por dependencia administrativa se observa que un 54,1% de los estudiantes de colegios particulares pagados ha tenido a lo menos un episodio de embriaguez, lo que contrasta con lo reportado en los establecimientos municipales y subvencionados donde la proporción bordea el 65%.

GRÁFICO 4:
Proporción de prevalentes de último mes que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Chile, 2011



Cuando se analizó la cantidad de tragos que los estudiantes que reportaron consumo intenso llegaron a ingerir en el día de mayor consumo, se observó que bordea en promedio los 9 tragos (independiente del sexo y el curso). En otras palabras, estos estudiantes consumen en promedio 4,5 veces más que aquellos que reconocieron consumir alcohol en el último mes, pero que no lo hicieron hasta la embriaguez (1,8 frente a 9 tragos en el día de mayor consumo del último mes).

Finalmente, los estudiantes con a lo menos un episodio de embriaguez proveniente de un colegio particular pagado consumen, en promedio, un trago menos que sus pares de establecimientos municipales (9,2 tragos) y particulares subvencionados (9,1 tragos) en el día de mayor consumo.

CUADRO 7:
Promedio de tragos en el día de mayor consumo en el último mes según intensidad de consumo de alcohol. Chile, 2011

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Sin reporte de consumo intenso	1,8	1,9	1,7	1,4	1,5	1,9	1,9	2,1	1,8	1,7	2,0
Con reporte de consumo intenso	9,0	9,2	8,8	8,6	9,4	9,1	9,1	8,7	9,2	9,1	8,0

CONSUMO DE MARIHUANA

Para el presente estudio se han registrado declaraciones de consumo de marihuana de último año significativamente mayores que en los estudios previos, llegando a un 19,5%, lo que equivale a 4,7 puntos porcentuales más que los registrados al inicio de la serie (14,8%) y 4,4 respecto del estudio anterior. Desagregando este resultado por sexo se observa que no existen diferencias entre hombres y mujeres.

La variación observada en la prevalencia año se explica principalmente por un incremento de la tasa de incidencia (medida anual) de 7,5% a 10,5% en el último periodo, lo que se traduce en que para este año alrededor de 83.772 estudiantes consumieron por primera vez marihuana en el último año.

GRÁFICO 5:
Evolución de la prevalencia de consumo vida, año y mes de marihuana en Población Escolar. Chile, 2001-2011



En el estudio 2009 la población de estudiantes de octavo básico registró un aumento significativo de 1,2 puntos porcentuales en su prevalencia de consumo. Para 2011 las declaraciones de consumo de marihuana en octavo básico vuelven a presentar un aumento significativo de 6,5% a un 10,5%. Este fenómeno va acompañado de una disminución de la percepción de riesgo del consumo experimental de marihuana, cayendo desde 37,6% en 2009 a 24,2% en 2011 y un estancamiento de la desaprobación parental para el consumo de marihuana (84,3% en 2011).

Si bien todos los cursos encuestados presentaron variaciones al alza, la mayor variación se observó en los segundos medios, pasando de 16,7% en 2009 a 23,4% en 2011. La razón del consumo entre octavos básicos y cuartos medios continúa su descenso desde el inicio de la serie de estudios, pasando de ser 5,3 en 2005 (por cada 5 consumidores de cuarto medio había 1 consumidor en octavo básico), a 3,4 en 2009 y 2,3 en 2011.

Por dependencia administrativa, se aprecian aumentos significativos en establecimientos municipales (15,9% en 2009 a 20,7% en 2011) y en establecimientos particulares subvencionados (14,5% en 2009 a 19,6% en 2011). El consumo en establecimientos particulares pagados no presentó variaciones en el último bienio. Al inicio de la serie el consumo era mayor en los establecimientos particulares pagados, sin embargo, desde el 2007 se observa que la marihuana está siendo consumida en mayor medida que en establecimientos municipales y particulares subvencionados.

CUADRO 8:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2001-2011

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2001	14,8	16,2	13,5	5,5	11,1	17,0	20,9	22,5	14,4	15,0	15,4
2003	13,0	14,3	11,7	4,9	9,1	15,2	18,7	21,6	13,0	12,5	14,3
2005	14,7	16,1	13,4	4,8	9,9	16,2	21,2	25,8	15,0	14,3	15,3
2007	15,6	16,7	14,5	5,3	12,1	17,2	21,7	23,6	15,3	15,6	16,2
2009	15,1	15,7	14,5	6,5	11,6	16,7	20,4	22,1	15,9	14,5	14,8
2011	19,5	20,2	18,9	10,5	16,8	23,4	26,2	24,3	20,7	19,6	14,6

El tipo de marihuana consumida con mayor frecuencia en los últimos 12 meses es la marihuana "verde" (yerba) con un 50%, mientras que la marihuana prensada con 30,4%. No se observan diferencias por sexo, salvo para el caso de la marihuana transgénica que es más consumida por los hombres (6,1%). Por dependencia administrativa, si bien la marihuana "verde" es la consumida con mayor frecuencia, se aprecia que el consumo de marihuana prensada es mayor en los establecimientos municipales (34,9%) que en los particulares pagados (13,9%) y que más de la mitad de los estudiantes provenientes de establecimientos particulares consumen marihuana "verde".

CUADRO 9:
Consumo de tipos de marihuana por prevalentes de último año, según sexo y dependencia administrativa. Chile, 2011

	Total	Hombre	Mujer	Municipal	Subvencionado	Pagado
Marihuana prensada	30,4	28,8	32,4	34,9	29,7	13,9
Marihuana verde	50,0	50,4	49,6	42,0	52,9	65,4
Marihuana verde transgénica	4,0	6,1	1,9	3,9	3,6	8,5

En las versiones 2009 y 2011 del estudio destaca la incorporación de una escala de tamizaje para detectar consumo perjudicial de marihuana en adolescentes, la que además está siendo utilizada en varios países de Europa y en otros países latinoamericanos. Esta escala, la Cannabis Abuse Screening Test (CAST), se desarrolló y probó en Francia para explorar el consumo de marihuana, intentando develar potenciales patrones de uso dañino independiente de que exista o no un diagnóstico clínico asociado. La idea detrás de este tipo de instrumentos es identificar conductas de riesgo con la finalidad de prevenir problemas asociados al consumo de marihuana antes de que ocurran. El CAST es un instrumento de tamizaje que consiste en seis preguntas que buscan capturar patrones o conductas de riesgo asociadas al consumo de marihuana en el último año. La escala identifica tres niveles de riesgo acorde al puntaje obtenido:

- 1 a 2 puntos CAST: bajo nivel de riesgo
- 3 puntos CAST: moderado nivel de riesgo
- 4 o más puntos CAST: alto nivel de riesgo.

Los resultados muestran que la proporción de prevalentes de último año que presentan consumo de alto de riesgo de marihuana bajó significativamente de 22,3% en 2009 a 15,3% en 2011. A diferencia de lo que se observa en la prevalencia de uso, cuando se analiza el consumo perjudicial de marihuana sí se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres y según la dependencia administrativa de los establecimientos.

GRÁFICO 6:
Evolución de los distintos niveles de riesgo de Escala CAST sobre consumidores de último año de marihuana. Chile, 2009-2011



Al desagregar la proporción de consumidores de alto riesgo según curso se aprecia que tanto primeros medios (23,9% frente a 15,3%), terceros medios (22,7% frente a 12,1%) y cuartos medios (18,8% contra 10,9%) presentan variaciones significativas a la baja respecto al año anterior. Por dependencia administrativa también se registró una baja significativa en los tres tipos de establecimientos (en colegios municipales de 26,0% a 19,2%; subvencionados de 20,4% a 13,8% y particulares pagados de 17,8% a 9,5%), no obstante se observa una gradiente entre los establecimientos.

CUADRO 10:
Evolución de consumidores de riesgo alto según Escala CAST sobre consumidores de último año de marihuana, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2009-2011

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2009	22,3	26,3	18,6	22,3	23,9	24,5	22,7	18,8	26,0	20,4	17,8
2011	15,3	19,8	10,9	21,8	15,3	18,7	12,1	10,9	19,2	13,8	9,5

CONSUMO DE COCAÍNA

Tomando siempre como referencia la prevalencia de último año, este estudio no registra una variación significativa en el consumo de cocaína (clorhidrato). La tendencia de la serie se mantiene estable para este indicador en torno al 3%. El reporte de consumo de esta sustancia para el presente estudio es de 3,2%, equivalente a 0,2 puntos porcentuales menos que el 2009.

GRÁFICO 7:
Evolución de la prevalencia de consumo vida, año y mes de cocaína en Población Escolar. Chile, 2001-2011



Desagregando el consumo de cocaína por sexo, se observa un cambio en la relación del consumo masculino (4,5%) frente al femenino (2,0%), superando levemente la relación 2 a 1 que se venía observando en los estudios anteriores (diferencia significativa por sexo). Respecto al comportamiento por cursos se aprecia un descenso significativo en los cuartos medios, pasando desde un 4,3% registrado en 2009 a un 3,0% en 2011. Si bien los octavos básicos y segundos medios presentan variaciones, estas no son significativas.

Al igual que con la marihuana, por dependencia administrativa se aprecia un descenso significativo en colegios particulares pagados desde 2,8% en 2009 a 1,7%, no así en municipales y subvencionados.

CUADRO 11:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2001-2011

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2001	3,2	4,4	2,1	1,3	2,2	3,6	4,5	5,3	3,2	3,4	2,8
2003	3,1	4,2	1,9	1,6	2,1	3,3	3,8	5,6	3,1	3,2	2,7
2005	2,8	3,8	1,9	1,8	2,6	2,9	3,4	3,9	3,4	2,6	2,1
2007	3,1	4,1	2,0	1,7	2,9	3,0	3,6	4,3	3,4	2,8	2,9
2009	3,4	4,5	2,4	2,4	3,1	3,5	4,1	4,3	4,1	3,0	2,8
2011	3,2	4,5	2,0	2,7	2,7	4,1	3,7	3,0	4,0	3,1	1,7

CONSUMO DE PASTA BASE

El consumo de pasta base en población escolar siempre ha estado por debajo de los reportes de clorhidrato de cocaína. En la presente versión del estudio se observa una disminución significativa del consumo de esta sustancia en el país respecto al estudio anterior, pasando de 2,6% a un 2,2%. Este descenso es más marcado en mujeres y en establecimientos particulares pagados, cayendo 0,7 y 0,8 puntos porcentuales (baja significativa), respectivamente. En contraste con lo que ocurre con marihuana, el patrón de consumo por curso no arroja una tendencia creciente en edad, la diferencia observada entre octavos básicos y cuartos medios es de 0,2 puntos porcentuales.

GRÁFICO 8:
Evolución de la prevalencia de consumo vida, año y mes de pasta base en Población Escolar. Chile, 2001-2011



Para pasta base también se observa una gradiente por dependencia administrativa, siendo los establecimientos municipalizados los que presentan las prevalencias más altas. En el caso de la pasta base el rango de la diferencia va desde 3,2% en colegios municipalizados a 1,2% en particulares pagados, manteniéndose la brecha entre ambos en el presente estudio. El consumo para el 2009 se encontraba equiparado entre establecimientos subvencionados y particulares pagados. En esta versión del estudio los establecimientos subvencionados presentaron una prevalencia 0,7 puntos porcentuales mayor a los establecimientos particulares. La diferencia observada en el consumo entre los tres tipos de establecimientos es estadísticamente significativa.

CUADRO 12:
Evolución de la prevalencia año de consumo de pasta base, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2001-2011

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2001	2,3	3,1	1,5	1,3	2,1	2,6	2,8	2,9	2,7	2,1	1,5
2003	2,5	3,5	1,6	1,5	2,2	2,8	2,8	3,8	2,9	2,3	1,9
2005	2,5	3,4	1,7	1,7	2,5	2,8	2,9	2,9	3,4	2,1	1,6
2007	2,6	3,5	1,7	1,7	2,6	2,8	2,6	3,3	3,3	2,1	2,3
2009	2,6	3,4	1,9	2,1	2,8	3,1	2,4	2,7	3,7	2,0	2,0
2011	2,2	3,1	1,3	2,4	2,0	2,5	2,0	2,2	3,2	1,9	1,2

CONSUMO DE INHALABLES

Por primera vez en la serie de estudios se incorporó un módulo completo para la caracterización del consumo de sustancias inhalables en población escolar. Este módulo (de extensión similar al de tranquilizantes, cocaína y pasta base) busca indagar y pesquisar de una manera más precisa y confiable la realidad del consumo de estas sustancias en el país.

A nivel nacional, la prevalencia año de consumo de sustancias inhalables fue de un 4%, siendo el valor más alto registrado en toda la serie de estudios. La variación en relación al 2009 (3%) es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 9:
Evolución de la prevalencia de consumo vida, año y mes de inhalables en Población Escolar. Chile, 2001-2011



Se registró un incremento significativo en las prevalencias de consumo en octavos básicos, pasando desde un 3,1% en 2009 a un 4,1% en 2011, no así en los demás niveles. Por dependencia administrativa se registran aumentos significativos respecto al estudio anterior en establecimientos municipales (3,2% a 4,5%) y particulares subvencionados (2,8% a 3,7%). A diferencia de lo que ocurre con pasta base y cocaína, no existe una gradiente marcada por nivel socioeconómico, siendo la prevalencia observada en particulares pagados levemente superior a los subvencionados (solo es estadísticamente significativa la diferencia observada entre subvencionados y municipales).

CUADRO 13:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2001-2011

Serie	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2001	1,9	2,5	1,3	1,2	1,8	2,2	2,3	2,1	1,9	1,7	2,1
2003	3,2	3,6	2,8	2,9	3,2	3,7	3,1	2,9	3,6	2,9	2,8
2005	2,8	3,1	2,6	2,4	3,2	3,3	2,9	2,2	3,3	2,5	2,6
2007	3,1	3,2	3,0	3,0	3,8	3,2	2,8	2,5	3,2	3,0	3,2
2009	3,0	2,9	3,0	3,1	3,4	3,1	2,8	2,3	3,2	2,8	2,9
2011	4,0	4,0	3,9	4,1	4,1	4,2	3,5	3,7	4,5	3,7	4,0

OTROS INDICADORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS

Entre otros indicadores asociados al consumo se encuentran Precocidad (proporción de prevalentes vida que ha iniciado su consumo antes de los 15 años), Edad de inicio e Intensidad del consumo (proporción de individuos que ha consumido a lo menos 10 veces en el último año).

Para marihuana se observa que tanto precocidad y edad de inicio se han mantenido estables respecto a lo observado en 2009, mientras que intensidad detiene la tendencia al alza reportada desde 2005, presentando un descenso significativo desde 6,5% en 2009 hasta 5,8% en 2011. Este último descenso respecto al estudio anterior se explica principalmente por una caída en hombres (7,7% a 6,5%) y en los establecimientos particulares pagados (5,7% a 3,6%).

CUADRO 14:
Evolución de indicadores asociados al consumo de marihuana. Chile, 2001-2011

Serie	Precocidad	Edad de Inicio	Intensidad
2001	44,8	14,6	-
2003	46,4	14,5	5,4
2005	41,4	14,7	4,8
2007	41,2	14,7	6,2
2009	46,1	14,5	6,5
2011	46,8	14,5	5,8

Indagando más en profundidad respecto a la intensidad del consumo, la proporción de prevalentes de último año que consumió 10 o más veces marihuana en el último año presenta una variación (significativa) desde un 34,6% en 2009 a un 31,3% en 2011, variación explicada por descensos en hombres y en segundos medios. Una medida de consumo ocasional o experimental es el consumo de una o dos veces en el último año. Este indicador no presenta variaciones a nivel nacional (36,1% en 2009 frente a 32,7% en 2011), sin embargo muestra un aumento significativo en octavos básicos y descensos significativos en el resto de cursos (salvo tercero medio).

CUADRO 15:
Intensidad de uso de marihuana en último año según declaraciones de número de veces

Proporción de prevalentes año que declara consumir 10 o más veces en el último año y una o dos veces en el último año.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
10 o más veces en el último año											
2003	36	40,6	30,5	23,7	34,8	34,5	37,9	40	37,3	34,6	35,9
2005	30,3	33,7	26,2	26,7	28,4	31,2	30,7	31	32,5	27,7	31,1
2007	35,3	39,2	31	29,4	34,6	35,8	35,5	36,7	36,5	34,2	36
2009	34,6	38,6	30,5	29,6	34,6	35,7	35,3	34,5	37,9	33,1	30,4
2011	31,3	33,9	28,1	24,1	36,6	27,1	33,7	32,2	34,8	29,9	26,2
Una o dos veces en el último año											
2003	29,2	26,8	32,2	34,5	27,9	29,5	29,6	28	29	29	30,5
2005	41,2	38,8	44,1	44,2	41,4	41,3	40,8	40,7	38,6	44	40,9
2007	34,9	32,4	37,6	39,8	35,8	34,8	33,5	34,7	33,8	35,8	34,6
2009	36,1	32,8	39,6	38,6	37,9	35,5	33,1	37,7	32,1	37,5	42,9
2011	32,7	30,8	34,9	48,3	31,2	29,7	33,2	28,3	30,9	33	39,2

Para cocaína y pasta base se observan comportamientos distintos, por un lado tanto precocidad y edad de inicio en cocaína mantienen cierta estabilidad respecto a los reportes anteriores, con indicadores en torno al 40% y una edad de inicio un poco menor de quince años. Sin embargo, en el caso de pasta base se aprecia un aumento significativo de precocidad desde un 49,1% en 2009 a 57,1% en 2011 y un descenso de la edad de inicio. La intensidad de uso para cocaína total (cocaína y/o pasta base) revierte lo ganado en 2009, volviendo a los niveles del estudio de 2007 con un 2%.

CUADRO 16:
Evolución de indicadores asociados al consumo de cocaína y pasta base. Chile, 2007-2011

Serie	Cocaína		Pasta base		Cocaína y/o Pasta base
	Precocidad	Edad de Inicio	Precocidad	Edad de Inicio	Intensidad
2007	38,2	14,7	45,1	14,5	1,9
2009	42,5	14,5	49,1	14,2	2,9
2011	39,2	14,7	57,1	13,7	2,0

La intensidad de uso (10 o más veces) sobre consumidores de último año de cocaína y/o pasta base muestra un aumento significativo respecto al estudio anterior (26,1% a 32,5%), volviendo a los niveles registrados en 2007, mientras que para consumo ocasional se observa una variación (no significativa) de alrededor de 6 puntos porcentuales. A pesar de la estabilidad observada en este último indicador, se advierten descensos significativos en octavos básicos y establecimientos particulares pagados.

CUADRO 17:
Intensidad de uso de cocaína total en último año según declaraciones de número de veces

Proporción de prevalentes año que declara consumir 10 o más veces en el último año y una o dos veces en el último año

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
10 o más veces en el último año											
2003	31,1	33,4	26	29,4	27,9	30,5	30,7	34,6	33,1	28,4	32,3
2005	22,2	21,3	23,8	22,2	21,8	22,2	24,2	20,5	23,6	18,3	26
2007	31,4	32,6	28,9	34,3	34,9	32,6	29,8	27,4	32,9	29	34
2009	26,1	27,4	24	22,5	25,5	26,7	27,9	26,3	28,6	25,1	18,7
2011	32,5	33,5	28,8	37,2	27,6	31,8	29	40,6	31,9	33,5	25,3
Una o dos veces en el último año											
2003	30,9	29,2	34,6	25,8	30,2	30,5	36,9	28,8	28,3	33	33,3
2005	27,7	25,8	31,6	21,3	15,5	39,6	28,5	33,2	23,1	34,6	29,9
2007	38,7	35,4	45,6	40,7	35,4	37,1	40,1	41,1	38,3	40,1	35,4
2009	41,1	38,4	45,7	44,2	40	42,9	40,8	38,8	36,8	45	46,5
2011	35,6	33	40,9	31,6	37,1	39,1	38,8	26,8	30,8	39,7	26,4

Entre los datos entregados en el estudio 2009 se encuentra el de policonsumo de sustancias. En dicho estudio se mostró que el uso de otras drogas distintas de marihuana se asociaba a un patrón de policonsumo con pasta base y cocaína, en donde más del 75% del consumo de pasta base y cocaína se daba en combinación con marihuana. Para 2011 se observa un cambio en este patrón llegando a valores cercanos al 60% (57,9% en pasta base y 67,4% en cocaína), sin embargo, para inhalables se observa un aumento del consumo asociado con pasta base llegando a valores cercanos al 43%. Otro hecho es el patrón de consumo de tabaco con marihuana, en donde se observa un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al consumo conjunto de tabaco y marihuana (28,7% en 2009 a 38,9% en 2011) en población escolar.

CUADRO 18:
Evolución del Policonsumo de drogas en Población Escolar: Prevalencias de consumo de último año de distintas drogas. Chile, 2009/2011

Proporción que ha consumido en el mismo periodo cada una de las drogas consideradas en la cabecera de cada columna

2009						
	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína	Inhalables
Tabaco	100	70,2	88,2	81,7	83,6	79,5
Alcohol	86,5	100	91,0	80,4	83,8	83,0
Marihuana	28,7	24,0	100	74,8	80,8	52,0
Pasta base	4,7	3,7	13,1	100	46,0	27,6
Cocaína	6,2	5,0	18,3	59,3	100	30,6
Inhalables	5,1	4,3	10,2	31,0	26,6	100
2011						
	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína	Inhalables
Tabaco	100	55,7	76,8	60,3	67,2	62,4
Alcohol	85,8	100	85,6	75,2	81,8	81,9
Marihuana	38,9	28,2	100	57,9	67,4	47,4
Pasta base	3,5	2,8	6,6	100	32,8	23,8
Cocaína	5,7	4,5	11,2	47,5	100	24,1
Inhalables	6,4	5,5	9,6	42,2	29,4	100

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO

Percepción de riesgo

La percepción de riesgo se define como la proporción de estudiantes que declara que para ellos consumir una sustancia (por ejemplo alcohol o marihuana) en un patrón determinado de uso (por ejemplo uso experimental o uso frecuente) representa una conducta de gran riesgo.

En el caso de alcohol existen dos medidas estándar: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con el consumo de alcohol. Para el caso de tabaco la medida empleada es percepción de riesgo del consumo frecuente.

En línea con los resultados ya reportados en materia de consumo, la percepción de riesgo frente al uso frecuente de tabaco vuelve a presentar un aumento significativo respecto al estudio anterior, lo que se traduce en que este indicador presenta un aumento en tendencia desde el 2007. Para el 2011 el indicador fue de 49,9% mientras que para el 2009 y 2007 fue de 45% y 42,5%, respectivamente.

A pesar de haber observado una estabilización del consumo de alcohol respecto a su tendencia, la percepción de riesgo de uso de alcohol diario y embriaguez muestran un aumento significativo en relación al estudio anterior de 11,8 y 10,7 puntos porcentuales.

En el caso de marihuana y cocaína, las medidas empleadas son consumo experimental y frecuente. Un aspecto que debe ser mencionado es el cambio del fraseo para la medición de la percepción de riesgo para consumo experimental de marihuana, cocaína y otras drogas realizado en la presente versión del estudio. Hasta el 2009 la pregunta hacía referencia a la percepción de riesgo del consumo de droga como "una o dos veces", en la versión 2011 se añadió la aclaración "en la vida". Es por esto, que la comparación de los indicadores de percepción de riesgo "experimental" obtenidos en 2011 respecto a su tendencia no serán analizados. Solo se reportará a nivel transversal.

La percepción para consumo frecuente de marihuana repunta alrededor de 10 puntos porcentuales volviendo a los niveles observados en el estudio del 2005 (48% en 2011). El aumento de este indicador se concentra principalmente en mujeres (39,8% en 2009 a 50,9% en 2011) y los terceros medios, que aumentaron más de 12 puntos porcentuales respecto a lo observado en el 2009 (34,6%).

Por otro lado, en el caso de cocaína se vuelve a observar un descenso desde la creación de este indicador cuando marcó 68,9% en 2005 hasta el valor actual de 58,8% (variación no significativa respecto al 2009). Al desagregar la percepción de riesgo de uso frecuente de cocaína, los octavos básicos vuelven a presentar un descenso significativo respecto al estudio anterior (57,2% en 2009 a 53,9% en 2011). También se aprecian diferencias entre tipos de establecimientos. Para el 2011, un 50,5% de los alumnos provenientes de establecimientos municipales considera riesgoso el consumo frecuente de cocaína, mientras que para alumnos provenientes de establecimientos particulares pagados llega a 76,8%.

CUADRO 19:
Evolución de percepción de riesgo. Chile, 2001-2011

Proporción que declara gran riesgo respecto a las frases que se indican

Sustancia	Indicador	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Marihuana	Uso experimental (una o dos veces en la vida)	-	39,6	39,8	29,6	30,2	17,0
	Uso frecuente (una o dos veces por semana)	51,3	47,2	51,8	38,2	37,8	48,0
Cocaína	Uso experimental (una o dos veces en la vida)	-	54,9	49,6	43,8	41,4	27,6
	Uso frecuente	-	-	68,9	63,9	60,2	58,8
Tabaco	Uso frecuente	-	-	36,0	42,5	45,0	49,9
Alcohol	Abuso (embriagarse algunas veces)	-	-	52,9	69,9	69,1	79,8
	Uso diario	-	-	42,6	44,4	45,8	57,6

Disponibilidad y acceso

En el caso de alcohol se incorporó una nueva pregunta para pesquisar la facilidad de compra de alcohol, cuya proporción (personas que declaran que les sería fácil o muy fácil comprar alcohol) fue de un 44,3%, de 69% para quienes consumieron alcohol en los últimos 30 días y de 31,2% para los estudiantes que no reportaron consumo. A medida que aumenta la edad (curso), la proporción se incrementa independiente de si el entrevistado es o no consumidor de alcohol. Por dependencia administrativa, los prevalentes de establecimientos pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprar alcohol, con un 74%, seguido por los prevalentes de los particulares subvencionados y municipales, con 69,4% y 66,2%, respectivamente.

CUADRO 20:
Comparación de facilidad de compra de alcohol según consumo en el último mes. Chile, 2011

Proporción de estudiantes que declara que les sería fácil o muy fácil comprar alcohol

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Total	44,3	47,6	41,0	24,9	38,5	47,5	55,1	69,6	40,1	45,4	52,6
No Prevalentes mes	31,2	33,5	28,6	19,3	27,9	33,5	41,2	55,4	28,1	32,4	35,7
Prevalentes mes	69,0	74,1	64,2	49,2	63,9	69,7	72,2	82,5	66,2	69,4	74,0

Entre los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias ilícitas se encuentran facilidad de acceso y oferta reciente. Facilidad de acceso se entiende como la proporción de estudiantes que declara que les sería fácil conseguir droga, mientras que oferta reciente es la proporción de individuos que ha recibido un ofrecimiento de droga en el último año. Ambos indicadores permiten caracterizar la disponibilidad y la percepción de acceso a drogas ilícitas a nivel nacional.

En el caso de la marihuana, la proporción que declara que le sería fácil conseguirla se mantuvo estable respecto a lo reportado en 2009 (38,4% frente a 38,7%). A pesar de esta estabilidad general, se produjo un descenso significativo en establecimientos particulares pagados en relación al 2009 (39,3% en 2009 a 33,8% en 2011),

mientras que en los otros tipos de establecimientos se mantiene estable. En la exposición a ofrecimientos recientes de marihuana se observa una disminución significativa respecto al estudio anterior, pasando desde un 30,7% a un 25,6% en 2011, siendo además este dato el más bajo de toda la serie.

En el caso de cocaína y pasta base se observan descensos en la exposición a oferta en el último año con caídas de 3,6 y 3,9 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que para facilidad de acceso también se aprecian descensos significativos en cocaína (17,2% en 2009 a 12,8% en 2011) y pasta base (16,9% en 2009 a 10,8% en 2011). Un hecho común entre las disminuciones observadas es que representan caídas en nivel independiente del sexo y la dependencia administrativa del establecimiento. Estos descensos son consistentes con lo encontrado en el Estudio Nacional en Población General 2010 para ambas sustancias e indicadores.

GRÁFICO 10:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Chile, 2001-2011

Proporción que declara que le ofrecieron drogas en el último año



GRÁFICO 11:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Chile, 2001-2011

Proporción que declara que le sería fácil conseguir drogas



En promedio, para el caso de marihuana y cocaína, de cada 10 estudiantes que declaran haber recibido un ofrecimiento de droga en el último año poco más de 15 declara que le sería fácil acceder a ella (15 para marihuana y 16 para cocaína). Esto muestra una desalineación existente entre las percepciones declaradas por los estudiantes y la realidad efectiva a la cual se ven enfrentados. Este mismo ejercicio se puede realizar con los consumidores de último año, en este caso tiende a equipararse la relación entre la percepción de acceso y la oferta efectiva, siendo casi 1 a 1 para marihuana (1,1) y de 1,2 para cocaína.

La proporción de consumidores (de último año) que ha estado expuesta a oferta de marihuana ronda el 80% en los últimos tres estudios (8 de cada 10 adolescentes que consumieron marihuana recibió a lo menos un ofrecimiento en el último año). Sin embargo, en el estudio 2011 cae a 69,5%, al igual que la facilidad de acceso que también cae más de 25 puntos porcentuales en este grupo respecto a los estudios previos.

CUADRO 21:
Evolución de oferta reciente y facilidad de acceso a marihuana para prevalentes año de marihuana. Chile, 2001-2009

Serie	Oferta año	Facilidad de acceso
2001	87,5	83,5
2003	84,7	83,5
2005	78,4	81,6
2007	84,8	81,3
2009	81,1	75,5
2011	69,5	43,6

Familia y entorno

El presente estudio contempla un listado de variables que buscan capturar el nivel de involucramiento de los padres con sus hijos.

Los estudiantes que reportan que sus padres tienen conductas vinculadas con la prevención del consumo tienen prevalencias de consumo de alcohol y marihuana hasta dos veces más bajas que aquellos que declaran que sus padres no las tienen. La desaprobación parental frente al consumo de alcohol impacta en las declaraciones de consumo de alcohol de último mes (49,8% frente a 28,2%), mientras que para el caso de la desaprobación parental frente al consumo de marihuana, la prevalencia año de la sustancia también muestra una brecha entre padres que desaprueban, en relación a aquellos que no lo hacen, siendo la probabilidad de consumir marihuana dos veces más alta para estos últimos (36,7% frente a 16,4%).

GRÁFICO 12:
Evolución de indicadores seleccionados de involucramiento parental según prevalencias de consumo de marihuana y alcohol. Chile, 2011



Tal como se muestra en el gráfico anterior (y en general a lo largo de la serie de estudios), existe asociación entre el grado de involucramiento de los padres con el consumo de sustancias de los hijos, relación que también se observa con el hábito de consumo de alcohol de los padres. Según reportes correspondientes al 2011, un 6,8% de los estudiantes declara que el padre tiene el hábito de consumir alcohol diariamente, mientras que un 2,7% declara que las madres lo poseen.

Cuando alguno de los padres consume alcohol diariamente, la prevalencia de consumo mensual de sus hijos aumenta en un 18% para los varones y un 42% para las mujeres. El impacto en la prevalencia mensual de consumo de alcohol de que alguno de los padres tenga este hábito es significativamente mayor en mujeres que en hombres, con una diferencia de 7,5 puntos porcentuales entre ellos (48% frente a 40,5%).

GRÁFICO 13:
Prevalencia mes de alcohol por consumo de alcohol diario de padres, según sexo. Chile, 2011



Drogas en el colegio y uso de sustancias en el entorno

Las declaraciones de consumo y tráfico de drogas en los alrededores del colegio habían aumentado en el estudio de 2007, aumento que tiende a consolidarse con los datos actuales. La proporción que declara haber visto personalmente a un alumno vendiendo o pasando drogas en los alrededores del colegio varió de 52,2% a 48,6% entre 2007 y 2009 y se mantiene en 50,9% en el actual. Asimismo, la proporción que reconoce haber visto a alguien consumiendo drogas dentro del colegio cae a 37,7% en el presente estudio, valor inferior a lo observado en los dos estudios anteriores. Los indicadores de drogas en el colegio o su entorno continúan siendo más altos en los establecimientos municipales respecto de los establecimientos particulares subvencionados y pagados. Sin embargo, en el presente estudio la disminución de la brecha observada entre subvencionados y pagados durante 2009 desaparece, mostrando así una diferencia significativa entre los tres tipos de establecimientos.

CUADRO 22:
Evolución de la percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el entorno escolar, según dependencia administrativa. Chile, 2005-2011

Proporción que dice haber visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo/pasando o usando drogas en el colegio o en los alrededores del colegio

Serie	Total	Municipal	Particular Subvencionado	Particular Pagador
Ha visto drogas en los alrededores del colegio				
2005	40,2	44,3	37,0	38,0
2007	52,2	55,6	50,4	48,9
2009	48,6	52,4	46,1	47,0
2011	50,9	52,9	51,2	41,7
Ha visto drogas dentro del colegio				
2005	29,1	37,1	23,1	23,7
2007	42,4	50,7	36,6	38,0
2009	39,2	48,2	33,2	35,6
2011	37,7	44,8	36,1	21,8

Otros indicadores asociados al entorno hacen referencia al comportamiento de los pares. Desde el 2001 se pregunta respecto a si algún amigo del entrevistado presenta consumo regular de alcohol o marihuana. Esta variable es una medida relevante para determinar, independiente de lo que ocurre en el establecimiento, el nivel de riesgo asociado al grupo más cercano.

Los resultados muestran descensos significativos para la proporción de estudiantes que declara consumo regular de alcohol y marihuana (en amigos) respecto al último estudio. El consumo de alcohol en los pares varía desde un 74,8% en 2009 a un 66,1% en 2011, mientras que para el caso de marihuana desciende a 42,2% desde el 47,8% observado en 2009.

CUADRO 23:
Uso de alcohol y marihuana en amigos: proporción que declara que, a lo menos, menos del 50% consume

¿Cuántos de tus amigos toman alcohol regularmente? ¿Cuántos de tus amigos fuman regularmente marihuana? Ninguno, Menos de la mitad, La mitad, Más de la mitad, Todos o casi todos, No sabe

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Alcohol											
2001	76,4	78,1	74,7	61	73,8	80,4	85,1	85,5	74,6	76,5	81,1
2003	70,2	72,4	68,1	51,5	66,3	75,8	81,1	83,9	67,1	70,6	77,9
2005	66,7	68,2	65,3	43	61,3	73,3	79,5	83,1	63,1	67,1	76,4
2007	74	75,4	72,7	52,8	68,5	79,3	85,5	87,4	71,6	74,3	80,4
2009	74,8	76	74	53,8	70,2	81	84,7	87,8	72,7	74,7	80,9
2011	66,1	65,3	67	45,9	64,3	71,3	77,5	80,8	62,8	66,4	76,8
Marihuana											
2001	47,3	48,9	45,7	36,8	45	49,5	54,1	53,7	48,8	47,1	43,7
2003	39,8	41,7	37,9	27,7	35,7	43,2	48,2	50,2	40,7	38,8	39,9
2005	37,3	38,7	35,9	23,1	31,7	40,1	46,4	50	37,8	36,3	38,7
2007	46,6	48,9	44,4	30,1	41,5	49,5	56,7	58,5	47,1	46,3	46,1
2009	47,8	50,1	45,8	32,8	43,6	52,1	55,5	57,8	49,1	46,6	48,2
2011	42,2	43,1	41,3	28,2	40,5	47,3	49,4	51,4	44,2	42,1	34,4

Porcentajes sobre muestra total (la categoría "No sabe" aparece como "Alguno" en el cuadro)

Independiente del año de estudio, el consumo en el entorno cercano aumenta por curso (gradiente más pronunciada para el caso de alcohol), para el consumo de marihuana la diferencia entre los octavos básicos y los cuartos medios es de 23,2 puntos porcentuales, mientras que para alcohol es de 34,9 puntos porcentuales. Por otro lado, la proporción de amigos que consume alcohol en establecimientos particulares pagados es mayor que los pares en establecimientos municipales y subvencionados, caso contrario para la marihuana, donde la proporción de amigos que consume esta sustancia es mayor en estos últimos establecimientos.

Principales actitudes ante la marihuana

A lo largo de la serie de estudios en población escolar se ha preguntado respecto a un conjunto de ideas asociadas al consumo de marihuana, las que podrían actuar (muchas veces) como facilitadores del consumo experimental u otras conductas de riesgo. Las ideas más comunes son que la marihuana carece de poder adictivo, que el uso experimental no tiene consecuencias y que la mayoría de los jóvenes la consume.

La evolución de estas percepciones acerca de la marihuana muestra un aumento sistemático en los estudiantes. Una de ellas es la creencia que probar marihuana no hace daño, la cual se eleva de 33% hasta 43% a lo largo de la serie de estudios. Respecto a que la mayoría de los jóvenes usa marihuana (si bien disminuyó significativamente respecto al estudio anterior), registra un aumento de 40,7% a 50,8% durante los últimos 10 años, mientras que la idea que la marihuana tiene un bajo poder adictivo cayó alrededor de 6 puntos porcentuales respecto al estudio, volviendo a los niveles observados en 2005.

GRÁFICO 14:
Evolución de principales actitudes respecto de la marihuana, según sexo y dependencia administrativa. Chile, 2003-2011



Percepción de problemas asociados a la marihuana y el alcohol

En las dos últimas versiones de la serie de estudios se hacen preguntas a los estudiantes respecto a un conjunto de problemas que normalmente se vinculan con el uso de marihuana y alcohol. Los reportes de estas percepciones son materia de análisis y estudio para el desarrollo de política pública.

La asociación observada entre el consumo de alcohol y los problemas planteados ha presentado un aumento significativo respecto al estudio anterior. La percepción de que el alcohol se vincula con problemas familiares aumentó cerca de 5 puntos porcentuales, mientras que en materia de problemas de salud también se observa un aumento de más de 10 puntos porcentuales. Estos reportes son consistentes con el aumento observado en la percepción de riesgo para abuso y consumo diario de alcohol.

GRÁFICO 15:
Evolución de la percepción de problemas relacionados al alcohol. Chile, 2009-2011



Por otro lado, el comportamiento de las creencias para marihuana muestra un comportamiento distinto. Se observa un descenso significativo (60% a 57,8%) en la creencia de que el consumo de marihuana está relacionado con problemas familiares, mientras que para el caso de problemas de salud aumenta 2,7 puntos porcentuales en relación al estudio anterior (variación significativa). Este último reporte respecto a problemas de salud se contradice con la caída en la percepción del poder adictivo de la marihuana y el aumento en la percepción de que probar marihuana una o dos veces no hace daño, además de la baja percepción de riesgo asociada al consumo experimental.

GRÁFICO 16:
Evolución de la percepción de problemas relacionados a la marihuana. Chile, 2009-2011



Principales Resultados Regionales

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Arica y Parinacota, la muestra efectiva fue de 451 alumnos que representan a 13.474 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de la región.

La comuna encuestada en esta versión del estudio es Arica.

CUADRO 24:
Detalles de la muestra para la Región de Arica y Parinacota, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Arica y Parinacota	222	6761	229	6714	451	13.474

CUADRO 25:
Detalles de la muestra para la Región de Arica y Parinacota, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Arica y Parinacota	117	3.355	117	3.616	114	3.287	83	3.107	20	109

El tamaño de la muestra en los cuartos medios (20 alumnos) se debe a que no se logró llegar a ese nivel en los establecimientos municipales y particulares subvencionados, por lo cual los resultados de la región no tienen la representación en esos estratos.

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso significativo respecto al estudio anterior, con una baja de 4,3 puntos porcentuales (8,3% en 2009 frente a 3,6% en 2011).

Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco se concentra en mujeres más que en hombres (4,4% frente a 2,8%). El descenso apreciado en hombres (6,5% para 2009 a 2,8% en 2011) y mujeres (10,1% a 4,4%) no es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen (4,8% frente a 2,4%). No se observaron cambios significativos para los cursos entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 17:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Arica y Parinacota, el uso de alcohol en último mes presenta un descenso significativo desde un 34% en 2009 a un 19,9% en 2011.

Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que es significativamente mayor en hombres (22,3%) que en mujeres (17,5%). El descenso observado en hombres (35,3% para 2009 a 22,3% en 2011) y mujeres (32,8% a 17,5%) es estadísticamente significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 14,2%, mientras que en el grupo de cursos mayores es de 26%. Solamente la variación observada en los cursos mayores respecto al estudio anterior es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 18:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 61,3% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que el 51,7% de los hombres y el 73,5% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa).

Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 62,5% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 61,9% y 60,7%, respectivamente.

GRÁFICO 19:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Arica y Parinacota, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 71,9% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. No se observa diferencia significativa entre los distintos niveles.

Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 80,1%, seguido por los establecimientos subvencionados con 79,9% y municipales con 60,5%.

GRÁFICO 20:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Arica y Parinacota, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana es de 19,7%, variación no significativa de 1,1 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

Al desagregar los resultados se observa que el consumo no difiere significativamente entre hombres y mujeres (17,1% frente a 22,3%). En ambos casos no se advierten variaciones significativas con respecto al 2009.

Por cursos, el consumo es más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencia de 26,9% y 12,9%, respectivamente. Las variaciones observadas respecto al último estudio no son significativas para estos grupos.

GRÁFICO 21:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 2,3%, variación no significativa respecto al 4,7% del estudio anterior.

Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es más del doble que en las mujeres en el 2011 (3,4% frente a 1,3%). Las variaciones observadas en ambos sexos con respecto al estudio anterior no son significativas.

Por cursos, no se aprecian diferencias significativas para el 2011. Se observa un descenso en ambos grupos, no significativo, en relación al estudio del 2009.

GRÁFICO 22:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de un 1,7% en 2009 a un 2,3% en 2011.

Al desagregar el consumo, no se advierten diferencias significativas por sexo ni por curso. Así mismo, ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 23:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos medidas estándar: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con el consumo de alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 47,4% en 2009 a 68%, mientras que para embriaguez pasa de 71,7% a 80,3%.

GRÁFICO 24:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de marihuana presenta un aumento (no significativo) con respecto al estudio anterior (34,4% en 2009 a un 43,9% en 2011), mientras que para el consumo frecuente de cocaína baja de 64,3% a 54,9% (variación no significativa). Ambos indicadores se encuentran por debajo de sus resultados nacionales (58,8% y 48,0%, respectivamente).

GRÁFICO 25:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana varía (cambio no significativo) respecto al último estudio con reportes de 40,1% en 2009 a 45,3% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año cae significativamente de 37,4% en 2009 a 22,9% en 2011.

GRÁFICO 26:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



La facilidad de acceso varía no significativamente para cocaína (16,1% en 2009 a 12,9% en 2011) y para pasta base (16,6% en 2009 a 13,5% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía de 12,9% en 2009 a 7,3% en 2011 para cocaína y pasa de 13,3% a 4,5% en pasta base, siendo esta última variación estadísticamente significativa.

GRÁFICO 27:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Arica y Parinacota, 2009-2011



REGIÓN DE TARAPACÁ

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Tarapacá, la muestra efectiva fue de 578 alumnos que representan a 17.628 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de la región.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Iquique y Alto Hospicio.

CUADRO 26:
Detalles de la muestra para la Región de Tarapacá, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Tarapacá	260	8.792	308	8.430	578	17.628

CUADRO 27:
Detalles de la muestra para la Región de Tarapacá, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Tarapacá	157	4.617	104	3.179	150	4.147	127	3.843	40	1.843

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso respecto al estudio anterior, con una baja no significativa de 4,3 puntos porcentuales (10% en 2009 frente a 5,7% en 2011).

GRÁFICO 28:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Tarapacá, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (8% frente a 3,5%). El descenso observado en mujeres (11,7% para 2009 a 3,5% en 2011) es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen (7,3% frente a 3,6%). No se observaron cambios significativos para ninguno de los cursos entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 29:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Tarapacá, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Tarapacá, el uso de alcohol en último mes presenta una disminución respecto del estudio anterior. La diferencia con el 30,2% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 30:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Tarapacá, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que es significativamente mayor en hombres (29,6%) que en mujeres (19,9%). En mujeres se produce un descenso significativo de más de 10 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 18,3%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a 29,6% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 31:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Tarapacá, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 72,4% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que el 76,5% de los hombres y el 66,9% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia no significativa).

Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 83,6% en colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 80,6% y 67,7%, respectivamente.

GRÁFICO 32:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Tarapacá, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 71,1% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. No se observa diferencia significativa entre los distintos niveles.

Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con 85%, seguido por los establecimientos municipales con 76,3% y subvencionados con 67,9%.

GRÁFICO 33:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Tarapacá, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana mantiene la tendencia al alza observada desde el 2007, alcanzando un 18,5%, con una variación no significativa de 1,5 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 34:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Tarapacá, Chile 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo no difiere significativamente entre hombres y mujeres con 19,1% y 17,9%, respectivamente. En ambos casos hubo un aumento no significativo con respecto a 2009.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2º medio y 4º medio en comparación al de 8º básico a 1º medio, con prevalencia de 22,1% y 13,8%, respectivamente.

GRÁFICO 35:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Tarapacá, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 3,9%, variación no significa respecto al 3,1% del estudio anterior.

GRÁFICO 36:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Tarapacá, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa una prevalencia significativamente más alta en hombres en relación a las mujeres en el 2011, con 6,5% y 1,3%, respectivamente. Las variaciones observadas en ambos sexos con respecto al estudio anterior no son significativas.

Por cursos, no se observa una diferencia estadísticamente significativa. Las variaciones entre los resultados de los estudios del 2009 y 2011 según grupo de cursos no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 37:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Tarapacá, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando del 2,1% en 2009 a 2,9% en 2011.

GRÁFICO 38:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Tarapacá, 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observa una diferencia significativa entre hombres y mujeres con 4,6% y 1,3%, respectivamente.

Por cursos, no se observa una variación significativa entre los niveles menores y mayores, con prevalencias de 3,6% y 2,3%, respectivamente.

GRÁFICO 39:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Tarapacá, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 47% en 2009 a 60,9%, mientras que para embriaguez varía desde 67,7% a 83,1%.

GRÁFICO 40:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Tarapacá, 2005-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de marihuana presenta un aumento significativo respecto del estudio anterior (34,9% en 2009 frente a 43,9% en 2011), mientras que para consumo frecuente de cocaína presenta una disminución no significativa en relación con el estudio anterior (62,2% en 2009 a 55,5% en 2011).

GRÁFICO 41:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Tarapacá, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable con respecto al estudio previo, con reportes de 39,3% en 2009 y 38,3% en 2011 (gráfico 42), mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año disminuye significativamente de 34,3% en 2009 a 24,4% en 2011 (gráfico 43).

GRÁFICO 42:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Tarapacá, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (15,7% en 2009 a 10,8% en 2011) y para pasta base (18,7% en 2009 a 10,6% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía de 10,5% en 2009 a 7,5% en 2011 para cocaína y de 10,7% a 5% en pasta base, siendo esta última variación estadísticamente significativa.

GRÁFICO 43:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Tarapacá, 2001-2011



REGIÓN DE ANTOFAGASTA

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Antofagasta, la muestra efectiva fue de 969 alumnos que representan a 41.070 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Antofagasta y Calama.

CUADRO 28:
Detalles de la muestra para la Región de Antofagasta, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Antofagasta	478	20.463	491	20.607	969	41.070

CUADRO 29:
Detalles de la muestra para la Región de Antofagasta, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Antofagasta	211	8.854	222	9.962	206	8.340	179	7.564	151	6.350

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco se mantuvo estable respecto al estudio anterior, con una baja de 0,1 puntos porcentuales (9,6% en 2009 frente a 9,5% en 2011).

GRÁFICO 44:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Antofagasta, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no varía significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (9,8% frente a 9,2%). El descenso observado en mujeres (10,7% en 2009 a 9,2% en 2011) y el aumento en la prevalencia diaria observada en hombres no son estadísticamente significativos.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen (11,9% frente a 6,7%), a pesar de que la brecha es menor que en 2009. No se observaron cambios significativos para ninguno de los cursos entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 45:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Antofagasta, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Antofagasta, el uso de alcohol en último mes se mantiene estable respecto al estudio anterior. La diferencia con el 32,8% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 46:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Antofagasta, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol no se observa una diferencia significativa entre hombres y mujeres (34,8% frente a 28,4%). En mujeres se produce un descenso no significativo de más de 6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el aumento observado en hombres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 18,3%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a 42,8% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 47:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Antofagasta, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 62,9% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que el 71,2% de los hombres y el 52,3% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 51,5% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 68,5% y 56,1%, respectivamente.

GRÁFICO 48:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Antofagasta, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 72,6% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. No se observa diferencia entre los distintos niveles. Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con el 82,5%, seguido por los establecimientos municipales con 72,4% y particulares subvencionados con 70,3%.

GRÁFICO 49:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Antofagasta, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana mantiene la tendencia al alza observada desde el 2005, alcanzando un 25,5%, con una variación estadísticamente significativa de 8,4 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 50:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Antofagasta, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo no varía significativamente entre hombres y mujeres (26,7% frente a 24,2%). En ambos casos hubo un aumento significativo con respecto a 2009 de 9,2 y 7,2 puntos porcentuales.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 30,9% y 19%, respectivamente (ambos aumentos respecto al 2009 son significativos).

GRÁFICO 51:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Antofagasta, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 5,8%, variación no significativa respecto al 4,3% del estudio anterior.

GRÁFICO 52:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Antofagasta, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es más del doble que en las mujeres en el 2011 (8,5% frente a 3,1%). Las variaciones observadas en ambos sexos con respecto al estudio anterior no son significativas. Al desagregar por curso este resultado, no se observan diferencias entre los cursos menores y mayores, sin embargo se observa un alza en ambos grupos (no significativa) en relación al estudio del 2009.

GRÁFICO 53:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Antofagasta, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de 2,6% en 2009 a 3,9% en 2011.

GRÁFICO 54:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Antofagasta, 2001-2011



Al desagregar el consumo, no se observan diferencias significativas por sexo ni por curso. Asimismo, ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 55:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Antofagasta, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 47,3% en 2009 a 62,1%, mientras que para embriaguez pasa de 69,5% a 76,9%.

GRÁFICO 56:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Antofagasta, 2005-2011



La percepción de riesgo para el consumo frecuente de marihuana y cocaína presenta un comportamiento distinto en el último periodo. Por un lado, la proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de marihuana presenta un aumento (no significativo) con respecto al estudio anterior (36,2% en 2009 a un 38,9% en 2011), mientras que para el consumo frecuente de cocaína baja de 62,3% a 56,1% (variación no significativa). Ambos indicadores se encuentran por debajo de sus respectivos resultados nacionales (58,8% y 48,0%, respectivamente).

GRÁFICO 57:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Antofagasta, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable con respecto al estudio previo, con reportes de 39,9% en 2009 y 41,9% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año pasa de 36,4% en 2009 a 34,3% en 2011 (variación no significativa).

GRÁFICO 58:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Antofagasta, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para pasta base (14,9% en 2009 a 10,1% en 2011) y se mantiene estable para cocaína (13.9% en 2009 a 11,9% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente no varía entre los años 2009 y 2011 para cocaína (10,5%) y pasa de 10,2% a 7,4% en pasta base, siendo esta última una variación no significativa.

GRÁFICO 59:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Antofagasta, 2001-2011



REGIÓN DE ATACAMA

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Atacama, la muestra efectiva fue de 822 alumnos que representan a 12.849 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Copiapó y Vallenar.

CUADRO 30:
Detalles de la muestra para la Región de Atacama, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Atacama	362	6.207	456	6.617	822	12.849

CUADRO 31:
Detalles de la muestra para la Región de Atacama, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Atacama	218	3.660	160	2.798	181	2.371	145	2.315	118	1.706

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta estabilidad respecto al estudio anterior, variando no significativamente 1,3 puntos porcentuales (10,2% en 2009 frente a 8,9% en 2011).

GRÁFICO 60:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Atacama, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (10,2% frente a 7,7%). El descenso observado en mujeres para este indicador es estadísticamente significativo (13,6% para 2009 a 7,7% en 2011), mientras que la variación observada en hombres no lo es.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen (13,8% frente a 4,1%), siendo esta diferencia estadísticamente significativa para el 2011. No se observaron cambios significativos para ninguno de los cursos entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 61:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Atacama, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Atacama, el uso de alcohol en último mes se mantiene estable respecto al estudio anterior. La diferencia con el 34,1% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 62:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Atacama, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que no difiere significativamente entre hombres y mujeres (35% frente a 36,4%). En hombres se produce un aumento no significativo de más de 3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el descenso observado en mujeres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 20,7%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a 51,1% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 63:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Atacama, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declararon consumo de alcohol en el último mes es de 64,1% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que el 68% de los hombres y el 60,4% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia no significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de un 55,9% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 71,9% y 60,7%, respectivamente.

GRÁFICO 64:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Atacama, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 63,0% declaró que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. No se observa una diferencia significativa entre los distintos niveles. Por dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 79,5%, seguido por los establecimientos municipales con 62,6% y particulares subvencionados con 61,4%.

GRÁFICO 65:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Atacama, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana alcanza el 18,6%, mostrando una variación no significativa de 5,1 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 66:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Atacama, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo no difiere significativamente entre hombres y mujeres (16,7% frente a 20,3%). En ambos casos no se observan variaciones significativas con respecto al estudio anterior.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 25,7% y 11,5%, respectivamente (solo el aumento respecto a 2009 en cursos mayores es significativo).

GRÁFICO 67:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Atacama, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 1,5%, variación significativa respecto al 6,2% del estudio anterior. Cabe mencionar que al observar la serie en su totalidad, el 2009 podría considerarse como un valor fuera de rango, lo cual puede deberse a distintos factores, como la composición de la muestra y la cantidad de casos encuestados.

GRÁFICO 68:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Atacama, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es más del doble que en las mujeres en el 2011 (2,1% frente a 0,8%). Las variaciones observadas en ambos sexos con respecto al estudio anterior son significativas.

Por cursos, no se advierten diferencias entre los niveles menores y mayores para el 2011. Solo el descenso observado en los cursos mayores en relación al estudio previo es estadísticamente significativo.

GRÁFICO 69:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Atacama, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de 3,8% en 2009 a 5,3% en 2011.

GRÁFICO 70:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Atacama, 2001-2011



Al desagregar el consumo, no se observan diferencias significativas por sexo ni por curso. Asimismo, ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa, salvo el aumento en los cursos menores (2,1% en 2009 a 5,8% en 2011), el que es estadísticamente significativo.

GRÁFICO 71:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Atacama, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 46,2% en 2009 a 58,2%, mientras que para embriaguez pasa de 66,9% a 79,6%.

GRÁFICO 72:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Atacama, 2005-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína aumenta de un 57,9% a 62,8% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se mantiene la tendencia al alza respecto a los resultados de los dos estudios anteriores, con un aumento significativo del indicador desde el 40,0% en 2009 a un 51,1%. Ambos indicadores se encuentran por sobre sus resultados nacionales (58,8% y 48,0%, respectivamente).

GRÁFICO 73:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Atacama, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable con respecto al estudio previo, con reportes de 32,5% en 2009 y 33,1% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año varía (no significativamente) de 28,3% en 2009 a 26% en 2011.

GRÁFICO 74:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Atacama, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para pasta base (13,6% en 2009 a 4,8% en 2011) y para cocaína (12,6% en 2009 a 6,1% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía desde 13,7% en 2009 a 6,5% en 2011 para cocaína y pasa de 12,6% a 5,8% para pasta base, siendo ambas variaciones significativas.

GRÁFICO 75:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Atacama, 2001-2011



REGIÓN DE COQUIMBO

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Coquimbo, la muestra efectiva fue de 1.162 alumnos que representan a 42.593 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de la región.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son La Serena, Coquimbo y Ovalle.

CUADRO 32:
Detalles de la muestra para la Región de Coquimbo, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Coquimbo	494	20.175	664	22.276	1.162	42.593

CUADRO 33:
Detalles de la muestra para la Región de Coquimbo, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Coquimbo	238	8.728	256	10.306	212	8.902	248	7.599	208	7.059

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso respecto al estudio anterior, cayendo significativamente 5,5 puntos porcentuales (11% en 2009 frente a 6,5% en 2011).

GRÁFICO 76:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Coquimbo, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco es significativamente mayor en hombres que en mujeres (8,2% frente a 4,5%). El descenso observado en hombres (11,4% en 2009 a 4,5% en 2011) es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen, llegando a duplicar el consumo de octavos básicos y primeros medios (4,2% frente a 8,4% en 2011). El descenso observado en los cursos mayores es estadísticamente significativo con respecto al 2009 (14,8% a 8,4%).

GRÁFICO 77:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Coquimbo, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Coquimbo, el uso de alcohol en último mes es de 34,3%. La diferencia con el 36,9% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 78:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Coquimbo, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, no se observa una diferencia significativamente entre hombres y mujeres (31,7% frente a 36,6%). En hombres se produce un descenso no significativo de 7,2 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el aumento observado en mujeres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 26,3%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a un 40,8% (diferencia significativa). De las variaciones de los grupos de cursos registradas con respecto al estudio anterior, solo la de los cursos mayores es significativa.

GRÁFICO 79:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Coquimbo, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 66,4% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que el 77,5% de los hombres y el 57,3% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa). Por dependencia administrativa la prevalencia es de un 53,4% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 74% y 61,9%, respectivamente.

GRÁFICO 80:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Coquimbo, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 63,9% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Al comparar entre cursos mayores y menores se aprecia una diferencia significativa a favor de los cursos mayores (74,2% frente a 44,1%). Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con 81,8%, seguido por los establecimientos municipales con 61% y particulares subvencionados con 64,9%.

GRÁFICO 81:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Coquimbo, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana mantiene la tendencia al alza observada desde el 2007, alcanzando un 18,8%, con una variación no significativa de 3,4 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 82:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Coquimbo, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es significativamente mayor en mujeres que en hombres (22,1% frente a 15,1%). En mujeres hubo un aumento (significativo) con respecto a 2009 (15% en 2009 a 22,1% en 2011).

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2º a 4º medio en comparación al de 8º básico a 1º medio, con prevalencias de 23,6% y 13%, respectivamente (ninguno de los aumentos respecto al 2009 es significativo).

GRÁFICO 83:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Coquimbo, 2009-2011



COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 3,2%, variación no significativa respecto al 3,5% del estudio anterior.

GRÁFICO 84:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Coquimbo, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es significativamente mayor que en mujeres en el 2011 (3,9% frente a 2,6%). Para los hombres hubo un descenso no significativo de 0,6 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior, mientras que para las mujeres la prevalencia tampoco varía significativamente. No se observan diferencias significativas entre cursos menores y mayores (3,5% frente a 3%) ni respecto a los resultados del estudio anterior.

GRÁFICO 85:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Coquimbo, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de 2,9% en 2009 a 3,8% en 2011.

GRÁFICO 86:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Coquimbo, 2001-2011



Al desagregar el consumo, tampoco se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres (3,3% frente a 4,2%) ni entre los cursos menores y mayores (3,5% frente a 4,1%). Ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 87:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Coquimbo, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar la percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 44,7% en 2009 a 57,7%, mientras que para embriaguez varía desde 69% a 78,6%.

GRÁFICO 88:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Coquimbo, 2005-2011



La percepción de riesgo para el consumo frecuente de marihuana y cocaína presenta un comportamiento distinto en el último período. Por un lado, la proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de 62,9% a 57% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se observa un quiebre respecto a los resultados de los dos estudios anteriores, con un aumento significativo del indicador desde el 37,7% en 2009 a 45% en 2011. Ambos indicadores se encuentran por debajo de sus respectivos resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 89:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Coquimbo, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable respecto al estudio previo, con reportes de 38,7% en 2009 y 36,7% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año disminuye significativamente de 31,4% en 2009 a 25% en 2011.

GRÁFICO 90:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Coquimbo, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (13,2% en 2009 a 8,5% en 2011) y para pasta base (14,4% en 2009 a 7,1% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía de 9,4% en 2009 a 5,8% en 2011 para cocaína y pasa de 9,1% a 6,1% en pasta base, siendo ambas variaciones estadísticamente significativas.

GRÁFICO 91:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Coquimbo, 2001-2011



REGIÓN DE VALPARAÍSO

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Valparaíso, la muestra efectiva fue de 4.645 alumnos que representan a 98.959 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Valparaíso, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Los Andes, La Ligua, Cabildo, Quillota, La Calera, Limache, San Antonio y San Felipe.

CUADRO 34:
Detalles de la muestra para la Región de Valparaíso, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Valparaíso	2.257	49.154	2.366	49.418	4.645	98.959

CUADRO 35:
Detalles de la muestra para la Región de Valparaíso, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Valparaíso	973	20.400	967	23.423	989	21.009	926	18.342	790	15.785

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso respecto al estudio anterior, cayendo significativamente 4,4 puntos porcentuales (12,5% en 2009 a 8,1% en 2011).

GRÁFICO 92:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Valparaíso, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco es significativamente mayor en mujeres (10,4%) que en hombres (5,8%) en el 2011. El descenso observado en hombres (11,5% para 2009 a 5,8% en 2011) es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen, llegando a triplicar el consumo de octavos básicos y primeros medios (3,9% frente a 11,4%). Se observa un descenso significativo del consumo de tabaco diario para ambos grupos de cursos entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 93:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Valparaíso, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Valparaíso, el uso de alcohol en último mes es de 40,2%. La diferencia con el 35,7% del estudio anterior es estadísticamente significativa, por lo que debe interpretarse como un aumento del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 94:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Valparaíso, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que el consumo no varía significativamente entre hombres y mujeres (39,8% frente a 40,7%). En mujeres se produce un aumento significativo de 5,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, mientras que en hombres esta variación no es significativa.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 30,7%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a un 47,7% (diferencia significativa). De las variaciones de los grupos de cursos registradas con respecto al estudio anterior, solo la de los cursos menores es significativa.

GRÁFICO 95:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Valparaíso, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 68,9% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que un 70,1% de los hombres y un 67,5% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia no significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 47,1% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 73,6% y 68,6% respectivamente.

GRÁFICO 96:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Valparaíso, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 70,1% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Al comparar entre cursos mayores y menores se aprecia una diferencia significativa a favor de los cursos mayores (73,3% frente a 63,8%). Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos subvencionados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 71,6%, seguido por los establecimientos particulares pagados con 70,4% y municipales con 67,3%.

GRÁFICO 97:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Valparaíso, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana muestra una tendencia al alza y alcanza un 20,8%, con una variación estadísticamente significativa de 5,1 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 98:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Valparaíso, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es de 19,1% y 22,6% para hombres y mujeres respectivamente (diferencia no significativa). En mujeres hubo un aumento significativo con respecto al 2009 (15,7% en 2009 a 22,6% en 2011).

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 15,5% y 25%, respectivamente (ambos aumentos respecto al 2009 son significativos).

GRÁFICO 99:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Valparaíso, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 3,4%, variación significativa respecto al 4,6% del estudio anterior.

GRÁFICO 100:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Valparaíso, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia se observa que el consumo de cocaína total en hombres es más del doble que en las mujeres en el 2011 (4,6% frente a 2,1%). Para los hombres hubo un descenso no significativo de 1,2 puntos porcentuales, mientras que para las mujeres la prevalencia disminuyó en 1,2 puntos porcentuales (variación significativa) en relación al estudio anterior. Por cursos, el consumo es significativamente más alto en los cursos mayores en comparación al resto, con 2,5% y 4,1%, respectivamente. El descenso observado en los menores respecto a 2009 es estadísticamente significativo.

GRÁFICO 101:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Valparaíso, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de un 3,6% en 2009 a un 5% en 2011.

GRÁFICO 102:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Valparaíso, 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres (6,1% frente a 3,9%), no así entre los cursos menores y mayores (4,8% frente a 5,1%). Ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 103:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Valparaíso, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional) con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 46,1% en 2009 a un 57,9%, mientras que para embriaguez pasa de 70,2% a 82,2%.

GRÁFICO 104:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Valparaíso, 2005-2011



La percepción de riesgo para el consumo frecuente de marihuana y cocaína presenta un comportamiento distinto en el último periodo. Por un lado, la proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de un 61,5% a un 59,2% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se mantiene la tendencia al alza respecto a los resultados de los estudios anteriores con un aumento significativo del indicador desde un 38,0% en 2009 a un 48,1%. Ambos indicadores se encuentran sobre sus resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 105:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Valparaíso, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable respecto al estudio previo, con reportes de 39% en 2009 y 41,1% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año disminuye significativamente de 31,7% en 2009 a 27,5% en 2011.

GRÁFICO 106:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Valparaíso, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (16,4% en 2009 a 12% en 2011) y para pasta base (15,5% en 2009 a 10,1% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía de 12% en 2009 a 8,1% en 2011 para cocaína y pasa de 10,2% a 7,4% en pasta base, siendo ambas variaciones estadísticamente significativas.

GRÁFICO 107:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Valparaíso, 2001-2011



REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región Metropolitana, la muestra efectiva fue de 11.299 alumnos que representan a 373.548 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

En esta versión del estudio fueron encuestadas todas las comunas de la región, a excepción de Alhué, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Pirque, San José de Maipo, San Pedro y Tiltil.

CUADRO 36:
Detalles de la muestra para la Región Metropolitana, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Metropolitana	5.531	176.738	5.726	193.795	11.299	373.548

CUADRO 37:
Detalles de la muestra para la Región Metropolitana, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Metropolitana	2.919	92.747	2.455	88.630	2.433	80.738	2.201	73.671	1.291	37.763

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso significativo respecto al estudio anterior, cayendo 4,8 puntos porcentuales (13,9% en 2009 frente a 9,1% en 2011).

GRÁFICO 108:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región Metropolitana, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (8% frente a 9,8%). El descenso observado en ambos sexos respecto al estudio anterior es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen, llegando a duplicar la prevalencia de octavos básicos y primeros medios en 2011 (12,2% frente a 5,7%). Ambos descensos observados en estos grupos son estadísticamente significativos.

GRÁFICO 109:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región Metropolitana, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región Metropolitana el uso de alcohol en último mes es de 35,5%. La diferencia con el 36,8% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 110:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región Metropolitana, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que el consumo es significativamente menor en hombres (33,7%) que en mujeres (37,1%). En hombres se produce un descenso no significativo de 2,9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el descenso observado en mujeres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 24,8%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a 45,6% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 111:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región Metropolitana, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 65,2% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se aprecia que un 66,3% de los hombres y un 64,1% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia no significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 53,5% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 66% y 67,5%, respectivamente.

GRÁFICO 112:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región Metropolitana, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 69,6% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Al comparar entre cursos mayores y menores se aprecia una diferencia significativa a favor de los cursos mayores (75,7% frente a 57,6%). Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 71,7%, seguido por los establecimientos particulares subvencionados con 69,5% y municipales con 68,1%.

GRÁFICO 113:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región Metropolitana, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana muestra una tendencia al alza, llegando a un 22,8%, con una variación significativa de 6,5 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 114:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región Metropolitana, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo no difiere significativamente entre hombres y mujeres (23,6% frente a 22,2%). En ambos casos hubo variaciones significativas con respecto a 2009 de 7 y 6 puntos porcentuales, respectivamente.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 29,8% y 15,4%, respectivamente (ambas variaciones respecto al 2009 son significativas).

GRÁFICO 115:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región Metropolitana, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 5,4%, variación no significativa respecto al 4,9% del estudio anterior.

GRÁFICO 116:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región Metropolitana, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es significativamente mayor que en mujeres en el 2011 (7,3% frente a 3,6%). Para los hombres se aprecia un aumento de 0,9 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior, mientras que para las mujeres la prevalencia aumenta 0,3 puntos porcentuales (ambas variaciones no son significativas).

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en los niveles mayores que en los menores, con prevalencias de 6,1% y 4,6%, respectivamente. Ninguna de estas variaciones es estadísticamente significativa con respecto al estudio anterior.

GRÁFICO 117:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región Metropolitana, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento significativo del consumo de inhalables, pasando de un 3% en 2009 a 4,3% en 2011.

GRÁFICO 118:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región Metropolitana, 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observa que no hay variación significativa entre hombres y mujeres (3,8% frente a 4,7%), asimismo tampoco se aprecia una diferencia significativa entre cursos menores y mayores (4,3% frente a 4,2%). Solo las variaciones observadas en mujeres y cursos mayores respecto al último estudio, son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 119:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región Metropolitana, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar la percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 46,6% en 2009 a 56,9%, mientras que para embriaguez pasa de 70,0% a 78,3%.

GRÁFICO 120:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región Metropolitana, 2005-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de un 60,5% a un 58,6% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se mantiene la tendencia al alza respecto a los resultados de los dos estudios anteriores, con un aumento significativo del indicador desde un 36,5% en 2009 a 44,7%. Ambos indicadores se encuentran por debajo de sus resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 121:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región Metropolitana, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana no varía significativamente respecto al estudio previo, con reportes de 41,5% en 2009 y 43,3% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año disminuye significativamente de 32,1% en 2009 a 28,7% en 2011.

GRÁFICO 122:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región Metropolitana, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (20,5% en 2009 a 15,9% en 2011) y para pasta base (19,7% en 2009 a 12,9% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía desde 12,5% en 2009 a 9% en 2011 para cocaína y pasa de 10,2% a 6,4% para pasta base, siendo ambas variaciones estadísticamente significativas.

GRÁFICO 123:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región Metropolitana, 2001-2011



REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de O'Higgins, la muestra efectiva fue de 2.089 alumnos que representan a 38.975 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión son Rancagua, Coltauco, Machalí, Rengo y San Fernando.

CUADRO 38:
Detalles de la muestra para la Región de O'Higgins, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
O'Higgins	1.051	19.343	1.029	19.153	2.089	38.975

CUADRO 39:
Detalles de la muestra para la Región de O'Higgins, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
O'Higgins	429	8.069	422	10.169	481	6.824	426	8.367	331	5.546

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso significativo respecto al estudio anterior, cayendo 3,9 puntos porcentuales (11,3% en 2009 frente a 7,4% en 2011).

GRÁFICO 124:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de O'Higgins, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (6,6% frente a 8,2%). Asimismo, el descenso observado en ambos sexos respecto al estudio anterior tampoco es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen en comparación a los cursos menores (8° básico a 1° medio), sin ser esta diferencia estadísticamente significativa (9% frente a 5,5% en 2011). Solo el descenso observado en los cursos mayores es estadísticamente significativo con respecto al 2009 (14,6% a 9%).

GRÁFICO 125:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de O'Higgins, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de O'Higgins, el uso de alcohol en último mes es de 34,1%. La diferencia con el 34,9% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 126:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de O'Higgins, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que no varía significativamente entre hombres y mujeres (34,6% frente a 33,1%). En hombres se produce un descenso no significativo de 2,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el aumento observado en mujeres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 22%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a un 44,8%. En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 127:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de O'Higgins, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 56,2% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se aprecia que un 67,1% de los hombres y un 43% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 62,9% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 50,3% y 58,3%, respectivamente.

GRÁFICO 128:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de O'Higgins, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 59,8% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Al comparar entre cursos mayores y menores se aprecia una diferencia significativa a favor de los cursos mayores (65,3% frente a 46,9%). Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 69,4%, seguido por los establecimientos subvencionados con 66,7% y municipales con 46,3%.

GRÁFICO 129:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de O'Higgins, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana muestra un alza no significativa de 1,2 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior, llegando a un 14,3%.

GRÁFICO 130:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de O'Higgins, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo no difiere significativamente entre hombres y mujeres (15,7% frente a 11,7%). En ambos casos no se observan variaciones significativas con respecto a 2009.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 17,1% y 11,2%, respectivamente (ninguna de las variaciones respecto al 2009 es significativa).

GRÁFICO 131:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de O'Higgins, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 2,9%, variación no significativa respecto al 3,9% del estudio anterior.

GRÁFICO 132:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de O'Higgins, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total se observa que en hombres es significativamente mayor que en mujeres en el 2011 (3% frente a 1,6%). Para los hombres se aprecia un descenso de 2,2 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior, mientras que para las mujeres la prevalencia aumenta 0,9 puntos porcentuales (ambas variaciones no son estadísticamente significativas). Por cursos, el consumo no difiere significativamente entre los cursos mayores en comparación a los menores (3,6% frente a 2,2%). Solo la variación observada respecto al estudio anterior en los cursos menores es significativa (4,6% a 2,2%).

GRÁFICO 133:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de O'Higgins, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de 2,2% en 2009 a 3,3% en 2011.

GRÁFICO 134:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de O'Higgins, 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observa que en los hombres es significativamente mayor que en las mujeres (3,6% frente a 1,7%). Por otro lado, el consumo no difiere significativamente entre los cursos mayores y menores (3,4% frente a 3,1%). Ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 135:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de O'Higgins, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional) con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 43,5% en 2009 a 59,6%, mientras que para embriaguez varía desde 69,6% a 83,4%.

GRÁFICO 136:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de O'Higgins, 2005-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de un 60,7% a un 58,8% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se observa un quiebre respecto a los resultados de los dos estudios anteriores con un aumento significativo del indicador, pasando de un 39,8% en 2009 a un 51,8%. Ambos indicadores son similares a sus resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 137:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de O'Higgins, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable con respecto al estudio previo, con reportes de 35,3% en 2009 y 33,2% en 2011, asimismo la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año varía (no significativamente) de 27,3% en 2009 a 23,9% en 2011.

GRÁFICO 138:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de O'Higgins, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (13,4% en 2009 a 8,6% en 2011) y para pasta base (13,4% en 2009 a 8,2% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía desde 9,3% en 2009 a 7,1% en 2011 para cocaína y pasa de 8,5% a 4,5% para pasta base, siendo solo esta última variación estadísticamente significativa.

GRÁFICO 139:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de O'Higgins, 2001-2011



REGIÓN DEL MAULE

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región del Maule, la muestra efectiva fue de 2.394 alumnos que representan a 44.904 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Talca, Constitución, Cauquenes, Curicó, Linares y Parral.

CUADRO 40:
Detalles de la muestra para la Región del Maule, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Maule	1.155	22.544	1.234	22.330	2.394	44.904

CUADRO 41:
Detalles de la muestra para la Región del Maule, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Maule	554	10.603	519	9.177	443	8.685	474	8.296	404	8.142

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso no significativo respecto al estudio anterior, cayendo 1,4 puntos porcentuales (10% en 2009 frente a 8,6% en 2011).

GRÁFICO 140:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región del Maule, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (8,4% frente a 8,8%). Los descensos observados en mujeres (10,3% para 2009 a 8,8% en 2011) y en hombres no son estadísticamente significativos.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen (6% frente a 10,7%), a pesar de que la brecha observada en el presente estudio es menor entre los cursos. La diferencia observada entre ellos es estadísticamente significativa. No se observaron cambios significativos para ninguno de los cursos entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 141:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región del Maule, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región del Maule, el uso de alcohol en último mes presenta una variación de 3,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior. La diferencia con el 32,3% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 142:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región del Maule, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que el consumo es significativamente mayor en hombres (38,9%) que en mujeres (31,9%). En hombres se produce un aumento significativo de 6,7 puntos porcentuales respecto al estudio anterior. En mujeres se produce un descenso no significativo de 0,6 puntos porcentuales.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 22,9%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a un 45,3% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 143:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región del Maule, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declararon consumo de alcohol en el último mes es de 66,1% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se aprecia que un 70,9% de los hombres y un 59,9% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 56,2% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 69,8% y 65,5%, respectivamente.

GRÁFICO 144:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región del Maule, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 69,5% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Se observa una diferencia significativa de 14,8 puntos porcentuales entre los distintos niveles, además, por dependencia administrativa los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 77,1%, seguido por los establecimientos particulares subvencionados con 70,0% y municipales con 66,5%.

GRÁFICO 145:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región del Maule, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana mantiene la tendencia al alza observada desde el 2007, alcanzando un 14,4%, con una variación estadísticamente significativa de 3,7 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 146:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región del Maule, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es de 16,9% y 11,8% para hombres y mujeres (diferencia significativa). En hombres y mujeres se registran aumentos (no significativos) respecto al 2009.

Por cursos, se observa un aumento significativo en el consumo de los cursos menores (6,2% en 2009 a 11,6% en 2011), mientras que el consumo de 2º a 4º medio permanece estable.

GRÁFICO 147:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región del Maule, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 3,3%, variación no significativa respecto al 4,8% del estudio anterior.

GRÁFICO 148:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región del Maule, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres el consumo es más de cinco veces mayor al de las mujeres, con 5,4% y 1% (diferencia significativa), respectivamente. La variación observada respecto al estudio anterior en mujeres de 2,5 puntos porcentuales es estadísticamente significativa. Al desagregar por cursos, no se observan diferencias entre los niveles menores y mayores.

GRÁFICO 149:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región del Maule, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un descenso no significativo del consumo de inhalables desde 3,1% en 2009 a 2,2% en 2011.

GRÁFICO 150:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región del Maule, 2001-2011



Al desagregar el consumo, no se observan diferencias significativas respecto al estudio anterior. Por cursos, se observa una diferencia significativa entre cursos menores y mayores para el 2011 (3,2% frente a 1,5%), mientras que respecto al estudio anterior, se registra una variación significativa a la baja de 1,8 puntos porcentuales en los cursos mayores (3,3% en 2009 a 1,5% en 2011).

GRÁFICO 151:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región del Maule, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 41,6% en 2009 a 54,8%, mientras que para embriaguez pasa de 64,1% a 82,9%.

GRÁFICO 152:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región del Maule, 2005-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de un 54,9% a un 62,1% (variación significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se observa un quiebre respecto a los resultados de los dos estudios anteriores, con un aumento significativo del indicador desde un 39,9% en 2009 a un 57,5%. Ambos indicadores se encuentran cercanos de sus resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 153:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región del Maule, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable con respecto al estudio previo, con reportes de 30,4% en 2009 y 31,2% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año disminuye significativamente de 26% en 2009 a 19,1% en 2011.

GRÁFICO 154:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región del Maule, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (14,5% en 2009 a 10,7% en 2011) y para pasta base (13,7% en 2009 a 7,9% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía de 13,5% en 2009 a 8,9% en 2011 para cocaína y pasa de 12,8% a 7,6% para pasta base, siendo ambas variaciones estadísticamente significativas.

GRÁFICO 155:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región del Maule, 2001-2011



REGIÓN DEL BIOBÍO

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región del Biobío, la muestra efectiva fue de 4.333 alumnos que representan a 93.702 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Concepción, Coronel, Chiguayante, Lota, Penco, San Pedro, Talcahuano, Tomé, Hualpén, Curanilahue, Los Ángeles y Chillán.

CUADRO 42:
Detalles de la muestra para la Región del Biobío, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Biobío	2.220	43.764	2.091	47.218	4.333	93.702

CUADRO 43:
Detalles de la muestra para la Región del Biobío, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Biobío	1.111	21.076	1.031	20.776	926	20.643	829	20.425	436	10.782

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso respecto al estudio anterior, cayendo significativamente 5,5 puntos porcentuales (11,6% en 2009 frente a 6,1% en 2011).

GRÁFICO 156:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región del Biobío, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no varía significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (6,5% frente a 5,9%), el descenso observado tanto en mujeres (11,5% para 2009 a 5,9% en 2011) como en hombres (11,7% para 2009 a 6,5% en 2011) es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen, llegando a triplicar el consumo de octavos básicos y primeros medios (2,5% frente a 9,1% en 2011). Ambos descensos observados por cursos con respecto al 2009 son estadísticamente significativos.

GRÁFICO 157:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región del Biobío, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región del Biobío, el uso de alcohol en último mes se mantiene estable respecto al estudio anterior. La diferencia con el 32,3% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 158:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región del Biobío, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que el consumo es significativamente mayor en hombres (35,5%) que en mujeres (29,8%). En mujeres se produce un descenso no significativo de 1,6 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el aumento observado en hombres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 22,7%, mientras que en el grupo de cursos mayores es de 39,2% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas con respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 159:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región del Biobío, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declararon consumo de alcohol en el último mes es de 59% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que un 65% de los hombres y un 52,9% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa).

Por dependencia administrativa, la prevalencia es de un 53,7% en colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 61,7% y 58,3%, respectivamente.

GRÁFICO 160:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región del Biobío, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 70% declaró que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Al comparar entre cursos mayores y menores se aprecia una diferencia significativa a favor de los cursos mayores (74,6% frente a 60,3%). Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 82%, seguido por los establecimientos subvencionados con 70% y municipales con 66,8%.

GRÁFICO 161:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región del Biobío, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana muestra una tendencia al alza, llegando a 13%, con una variación no significativa de 1,6 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 162:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región del Biobío, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es de 16,8% y 9,9% para hombres y mujeres respectivamente (diferencia significativa). En el caso de los hombres, su consumo aumenta significativamente con respecto a 2009 (12,8% en 2009 a 16,8% en 2011).

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2º a 4º medio en comparación al de 8º básico a 1º medio, con prevalencias de 16,6% y 8,6%, respectivamente (ambos aumentos respecto al 2009 no son significativos).

GRÁFICO 163:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región del Biobío, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 2,8%, variación significativa respecto al 4% del estudio anterior.

GRÁFICO 164:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región del Biobío, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es más del doble que en las mujeres en el 2011 (4,2% frente a 1,5%). Para los hombres hubo un descenso no significativo de 0,8 puntos porcentuales, mientras que para las mujeres la prevalencia disminuyó en 1,3 puntos porcentuales (variación significativa). Al desagregar por curso este resultado, no se observan diferencias significativas entre los cursos menores y mayores. El descenso observado en estos últimos respecto a 2009 (4,2%) es estadísticamente significativo.

GRÁFICO 165:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región del Biobío, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de un 2,2% en 2009 a 2,9% en 2011.

GRÁFICO 166:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región del Biobío, 2001-2011



Al desagregar el consumo, no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres (3,3% frente a 2,7%), pero sí entre cursos, donde el consumo de los menores es significativamente más alto que el de los mayores (3,7% frente a 2,2%). Ninguna de las variaciones observadas respecto al estudio pasado es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 167:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región del Biobío, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 45,3% en 2009 a 56,5%, mientras que para embriaguez pasa de 68,8% a 80,7%.

GRÁFICO 168:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región del Biobío, 2005-2011



La percepción de riesgo para el consumo frecuente de marihuana y cocaína presenta un comportamiento distinto en el último período. Por un lado, la proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de un 61,2% a un 59,6% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se observa un quiebre respecto a los resultados de los 2 estudios anteriores con un aumento significativo desde un 42,4% en 2009 a un 55,7%. Ambos indicadores se encuentran sobre sus medias nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 169:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región del Biobío, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable respecto al estudio previo, con reportes de 33,5% en 2009 y 31,8% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año disminuye significativamente de 25,6% en 2009 a 17,1% en 2011.

GRÁFICO 170:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región del Biobío, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (14,6% en 2009 a 9,3% en 2011) y para pasta base (16,1% en 2009 a 10,7% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía de 10,8% en 2009 a 5,4% en 2011 para cocaína y de 10,9% a 5,6% en pasta base, siendo ambas variaciones estadísticamente significativas.

GRÁFICO 171:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región del Biobío, 2001-2011



REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de la Araucanía, la muestra efectiva fue de 1.891 alumnos, que representan a 38.237 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Temuco, Padre Las Casas, Pitrufquén, Villarrica y Angol.

CUADRO 44:
Detalles de la muestra para la Región de la Araucanía, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Araucanía	1.037	19.133	849	19.085	1891	38.237

CUADRO 45:
Detalles de la muestra para la Región de la Araucanía, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Araucanía	415	6.942	393	8.370	405	8.340	342	7.799	336	6.785

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso respecto al estudio anterior, cayendo significativamente 5,4 puntos porcentuales (12,7% en 2009 frente a 7,3% en 2011).

GRÁFICO 172:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de la Araucanía, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no varía significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (7,5% frente a 7,1%). El descenso observado en mujeres respecto al estudio anterior (13,8% a 7,1%) es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen (10,4% frente a 2,7%). El descenso observado en ambos cursos es estadísticamente significativo entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 173:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de la Araucanía, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de la Araucanía, el uso de alcohol en último mes es 32,4%. La diferencia con el 32,8% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 174:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de la Araucanía, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que no difiere significativamente entre hombres (33,1%) y mujeres (31,7%). En hombres se produce un descenso no significativo de 5,2 puntos porcentuales respecto del estudio anterior, asimismo el aumento observado en mujeres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 17,4%, mientras que en el grupo de cursos mayores es de 42,4% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 175:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de la Araucanía, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 59,4% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que un 71,3% de los hombres y un 47,2% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa).

Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 70,9% de los estudiantes en colegios municipales, mientras que en los particulares pagados y subvencionados es de 59,5% y 54,2%, respectivamente.

GRÁFICO 176:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de la Araucanía, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 59,8% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Se observa una diferencia significativa entre los distintos niveles.

Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con 87,8%, seguido por los establecimientos subvencionados con 67,9% y municipales con 66,2%.

GRÁFICO 177:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de la Araucanía, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana presenta una variación no significativa respecto al año previo, alcanzando un 12%.

GRÁFICO 178:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de la Araucanía, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es de 13,7% y 10,3% para hombres y mujeres, respectivamente (diferencia significativa). En ambos casos el descenso no es significativo respecto del 2009.

Por cursos, el consumo no varía significativamente entre el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 13,7% y 9,5%, respectivamente. Ambas variaciones respecto al 2009 son significativas.

GRÁFICO 179:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de la Araucanía, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 7%, variación no significativa respecto al 4,3% del estudio anterior.

GRÁFICO 180:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de la Araucanía, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es casi el doble que en las mujeres en el 2011 (9,1% frente a 4,9%). Las variaciones observadas en ambos sexos con respecto al estudio anterior no son significativas.

Por cursos, no se aprecian diferencias significativas para el 2011. El alza observada en los cursos menores (8°s básicos a 1°s medios) es significativa respecto al estudio anterior (3% a 6,6%).

GRÁFICO 181:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de la Araucanía, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de un 3,5% en 2009 a 4% en 2011.

GRÁFICO 182:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de la Araucanía, 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observa una diferencia estadísticamente significativa por sexo (5,2% y 2,7% para hombres y mujeres, respectivamente), no así por cursos. Ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 183:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de la Araucanía, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar la percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 42,7% en 2009 a 58,4%, mientras que para embriaguez varía desde 66,9% a 82%.

GRÁFICO 184:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de la Araucanía, 2005-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de marihuana presenta un aumento significativo con respecto al estudio anterior (37,9% en 2009 y 53,7% en 2011), a su vez, el consumo frecuente de cocaína no varía significativamente pasando de un 53,7% a un 57,5%. El indicador de consumo de cocaína frecuente se encuentra cercano al resultado nacional (58,8%), mientras que el de marihuana frecuente se encuentra sobre este (48%).

GRÁFICO 185:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de la Araucanía, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable respecto del estudio previo, con reportes de 35,3% en 2009 y 34,7% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año varía (no significativamente) de 29,1% en 2009 a 23,7% en 2011.

GRÁFICO 186:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de la Araucanía, 2001-2011



La facilidad de acceso no varía significativamente para pasta base (13,2% en 2009 a 11,9% en 2011) y tampoco para cocaína (14,2% en 2009 a 13,8% en 2011). La oferta reciente varía desde 11,5% en 2009 a 12,2% en 2011 para cocaína y pasa de 10,3% a 11% para pasta base, siendo ambas variaciones no significativas.

GRÁFICO 187:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de la Araucanía, 2001-2011



REGIÓN DE LOS RÍOS

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Los Ríos, la muestra efectiva fue de 850 alumnos que representan a 12.114 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Valdivia y La Unión.

CUADRO 46:
Detalles de la muestra para la Región de Los Ríos, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Los Ríos	489	6.573	361	5.541	850	12.114

CUADRO 47:
Detalles de la muestra para la Región de Los Ríos, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Los Ríos	176	3.090	167	2.212	207	1.932	172	3.161	128	1.718

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso significativo respecto al estudio anterior, cayendo 4,2 puntos porcentuales (11,9% en 2009 frente a 7,7% en 2011).

Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (6,5% frente a 9,2%). El descenso observado en hombres (12,4% para 2009 a 6,5% en 2011) es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen, llegando a más que duplicar el consumo de octavos básicos y primeros medios en 2011 (10,3% frente a 4,4%). Ninguno de los descensos observados en estos grupos es estadísticamente significativo respecto al estudio previo.

GRÁFICO 188:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Los Ríos, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Los Ríos, el uso de alcohol en último mes es de 36,8%. La diferencia con el 31,2% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como un aumento del consumo de esta sustancia en la región.

Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que es significativamente mayor en mujeres (43,1%) que en hombres (31,5%). En mujeres se produce un aumento no significativo de 9 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el aumento observado en hombres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 22,1%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a un 48,3% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 189:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Los Ríos, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 59,9% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se aprecia que un 61,4% de los hombres y un 58,6% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia no significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 49,6% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 61,3% y 60,5%, respectivamente.

GRÁFICO 190:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Los Ríos, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 70,4% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Al comparar entre cursos mayores y menores se aprecia una diferencia significativa a favor de los cursos mayores (74,4% frente a 59,2%). Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 82,6%, seguido por los establecimientos particulares subvencionados con 74% y municipales con 64,1%.

GRÁFICO 191:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Los Ríos, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana muestra un aumento no significativo respecto al estudio anterior, llegando a 12,8%, con una variación de 2,2 puntos porcentuales.

Al desagregar los resultados, se observa que el consumo no varía significativamente entre hombres y mujeres (9,4% frente a 16,8%). En mujeres hubo un aumento no significativo con respecto a 2009 (11,8% a 16,8%).

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 16,3% y 8,4%, respectivamente (ninguna de las variaciones respecto al 2009 es significativa).

GRÁFICO 192:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Los Ríos, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 1,6%, variación significativa respecto al 4,6% del estudio anterior.

Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que no varía significativamente entre hombres y mujeres (1,8% frente a 1,3%). Para los hombres se aprecia un descenso significativo de 4,2 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior, mientras que para las mujeres la prevalencia no varía significativamente.

Por cursos, el consumo no difiere significativamente entre los menores y mayores, 1,5% y 1,6%, respectivamente. Solo la variación observada respecto al estudio anterior en 2° a 4° medio es estadísticamente significativa (4,9% a 1,6%).

GRÁFICO 193:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Los Ríos, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de un 3,5% en 2009 a un 4,6% en 2011.

Al desagregar los resultados, se observa que el consumo en las mujeres es significativamente mayor que el de los hombres (8,3% frente a 1,5%). Por otro lado, no se observa una diferencia significativa entre cursos mayores y menores (4,6% frente a 4,7%). Ninguna de las variaciones observadas respecto al estudio pasado es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 194:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Los Ríos, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar la percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional) con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 46,9% en 2009 a 56,9%, mientras que para embriaguez pasa de 68,1% a 80,4%.

GRÁFICO 195:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Los Ríos, 2009-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de un 63,4% a un 61,6% (variación no significativa), mientras que el consumo frecuente de marihuana aumenta de 43,4% en 2009 a 53,5%. Ambos indicadores se encuentran por sobre sus resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 196:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Los Ríos, 2009-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana no varía significativamente respecto al estudio previo, con reportes de 35,1% en 2009 y 27,2% en 2011, asimismo la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año no varía significativamente, pasando de 28,4% en 2009 a 15,3% en 2011.

GRÁFICO 197:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Los Ríos, 2009-2011



La facilidad de acceso para cocaína se mantiene estable en términos estadísticos (15,2% en 2009 a 9,6% en 2011) y disminuye significativamente para pasta base (15,4% en 2009 a 5,6% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía desde 11,6% en 2009 a 4,2% en 2011 para cocaína y pasa de 11,7% a 3,4% en pasta base, siendo ambas variaciones estadísticamente significativas.

GRÁFICO 198:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Los Ríos, 2009-2011



REGIÓN DE LOS LAGOS

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Los Lagos, la muestra efectiva fue de 1.066 alumnos que representan a 25.059 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Puerto Montt, Castro, Ancud y Osorno.

CUADRO 48:
Detalles de la muestra para la Región de Los Lagos, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Los Lagos	516	11.881	548	13.120	1.066	25.059

CUADRO 49:
Detalles de la muestra para la Región de Los Lagos, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Los Lagos	366	7.708	203	6.385	168	4.819	197	4.351	132	1.796

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso significativo respecto al estudio anterior, cayendo 6,8 puntos porcentuales (14,6% en 2009 frente a 7,8% en 2011).

GRÁFICO 199:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Los Lagos, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco no difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (8,6% frente a 7,1%). El descenso observado en ambos sexos respecto al estudio anterior es estadísticamente significativo.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen, llegando a duplicar el consumo de octavos básicos y primeros medios (11,4% frente a 4,9% en 2011). Solo el descenso observado en los cursos mayores es estadísticamente significativo con respecto al 2009 (20,4% a 11,4%).

GRÁFICO 200:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Los Lagos, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Los Lagos, el uso de alcohol en último mes es de 33,4%. La diferencia con el 35,8% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 201:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Los Lagos, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que no difiere significativamente entre hombres y mujeres (36,8% frente a 30,2%). En mujeres se produce un descenso no significativo de 3 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo el descenso observado en hombres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 24,5%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a 44,8% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 202:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Los Lagos, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 65,3% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se aprecia que un 70,5% de los hombres y un 60,1% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia no significativa). Por dependencia administrativa, la prevalencia es de un 60,6% en los colegios particulares pagados, mientras que en los municipales y subvencionados es de 71% y 63,3%, respectivamente.

GRÁFICO 203:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Los Lagos, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 70,5% declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Al comparar entre cursos mayores y menores se aprecia una diferencia significativa a favor de los cursos mayores (80% frente a 57,1%). Según dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 81,2%, seguido por los establecimientos municipales con 70,2% y particulares subvencionados con 69%.

GRÁFICO 204:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Los Lagos, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana muestra estabilidad, llegando a un 14,3%, con una variación no significativa de 0,8 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 205:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Los Lagos, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es significativamente mayor en hombres que en mujeres (18,7% frente a 10,5%). En ambos casos hubo variaciones no significativas con respecto a 2009 de 2,3 y 3,7 puntos porcentuales.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con prevalencias de 20% y 9,9%, respectivamente (ninguna de las variaciones respecto al 2009 es significativa).

GRÁFICO 206:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Los Lagos, 2009-2011.



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 5,7%, variación no significativa respecto al 2,8% del estudio anterior.

GRÁFICO 207:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Los Lagos, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres es significativamente mayor que en mujeres en el 2011 (9,2% frente a 2,6%). Para los hombres se aprecia un aumento de 5,1 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior, mientras que para las mujeres la prevalencia aumenta 0,8 puntos porcentuales (ambas variaciones no son significativas). Por cursos, el consumo es significativamente más alto en los niveles mayores que en los menores, 9% y 3,2%, respectivamente. Ninguna de estas variaciones es estadísticamente significativa con respecto al estudio anterior.

GRÁFICO 208:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Los Lagos, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de 2,3% en 2009 a 3,9% en 2011.

GRÁFICO 209:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Los Lagos, 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observa que en los hombres es significativamente mayor que en las mujeres (5,0% frente a 2,9%), asimismo el consumo de los cursos menores es significativamente más alto que el de los cursos mayores (2,1% frente a 6,2%). Ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 210:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Los Lagos, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar la percepción de riesgo: percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 46,2% en 2009 a 57,6%, mientras que para embriaguez pasa de 67,9% a 78,8%.

GRÁFICO 211:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Los Lagos, 2005-2011



La proporción de estudiantes que declara riesgoso el consumo frecuente de cocaína varía de un 59,5% a un 61,5% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se observa un quiebre respecto a los resultados de los tres estudios anteriores con un aumento significativo del indicador desde un 37,7% en 2009 a un 55,5%. Ambos indicadores se encuentran por sobre sus resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 212:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Los Lagos, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana cae significativamente respecto del estudio previo, con reportes de 35,3% en 2009 y 24,8% en 2011. Asimismo la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año disminuye significativamente de 29,6% en 2009 a 14,4% en 2011.

GRÁFICO 213:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Los Lagos, 2001-2011



La facilidad de acceso disminuye significativamente para cocaína (11,2% en 2009 a 8,1% en 2011) y para pasta base (10,1% en 2009 a 5,3% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía desde 9% en 2009 a 3,7% en 2011 para cocaína y pasa de 8,1% a 2,8% para pasta base, siendo ambas variaciones estadísticamente significativas.

GRÁFICO 214:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Los Lagos, 2001-2011



REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Aysén, la muestra efectiva fue de 506 alumnos que representan a 5.863 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales y particulares subvencionados (no se registran establecimientos particulares pagados en marco muestral del estudio en la región).

Las comunas encuestadas en esta versión del estudio son Coyhaique y Puerto Aysén.

CUADRO 50:
Detalles de la muestra para la Región de Aysén, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Aysén	231	2.773	273	3.039	506	5.863

CUADRO 51:
Detalles de la muestra para la Región de Aysén, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Aysén	88	1.237	98	1.471	120	1.228	104	1.006	96	921

CONSUMO DE TABACO

A nivel nacional se observa una disminución significativa del uso diario de tabaco entre los escolares de la región. El consumo diario de tabaco presenta un descenso no significativo respecto al estudio anterior, cayendo 4,8 puntos porcentuales (15,5% en 2009 frente a 10,7% en 2011).

GRÁFICO 215:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Aysén, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco difiere significativamente entre hombres y mujeres para el 2011 (17,7% frente a 4,5%). El descenso observado en mujeres para este indicador es estadísticamente significativo (16% para 2009 a 4,5% en 2011).

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen (15,5% frente a 5,2%). Solo la variación observada en los cursos mayores es estadísticamente significativa (23,1% a 15,5%) entre los años 2009 y 2011.

GRÁFICO 216:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Aysén, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Aysén, el uso de alcohol en último mes se mantiene estable respecto al estudio anterior. La diferencia con el 36,4% del estudio anterior no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 217:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Aysén, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que el consumo es mayor en hombres (36,2%) que en mujeres (35,8%), sin embargo esta diferencia no es estadísticamente significativa. En mujeres se produce una variación no significativa de 4,4 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 20,7%, mientras que en el grupo de cursos mayores llega a 48,5% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos se registran variaciones no significativas respecto al estudio anterior.

GRÁFICO 218:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Aysén, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declaran consumo de alcohol en el último mes es de 56,6% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que un 75,6% de los hombres y un 38,4% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez (diferencia significativa).

Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 69,3% de los estudiantes en colegios municipales, mientras que en los subvencionados es de 51,6%.

GRÁFICO 219:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Aysén, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 68,4% declaró que les sería fácil o muy fácil comprar alcohol. Se observa una diferencia significativa entre los grupos de cursos de 2° a 4° medio y de 8° básico a 1° medio con (73,2% frente a 55,4%), respectivamente. Por dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos municipales son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 74,8%, (frente al 66% registrado en los establecimientos subvencionados).

GRÁFICO 220:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Aysén, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana confirma la tendencia al alza observada desde el 2005, alcanzando un 17,2% con una variación no significativa de 4,8 puntos porcentuales respecto del estudio anterior.

GRÁFICO 221:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Aysén, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es significativamente mayor en hombres, con un 22,9%, en relación a las mujeres, que presentan una prevalencia de 12,3%. En ambos casos hubo un aumento (no significativo) con respecto a 2009 de 8,1 y 2,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2° a 4° medio en comparación al de 8° básico a 1° medio, con 23,7% y 9,7%, respectivamente.

GRÁFICO 222:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Aysén, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 1,3%, al igual que en el estudio previo.

GRÁFICO 223:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Aysén, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que no difiere significativamente entre hombres y mujeres en el 2011, con prevalencias de un 1,1% y 0,6%, respectivamente. Las variaciones observadas en ambos sexos con respecto al estudio anterior no son significativas.

Al desagregar por curso este resultado, no se observan diferencias significativas, siendo más alto el consumo en los cursos menores en comparación al resto, con 1,6% y 0,9%, respectivamente.

GRÁFICO 224:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Aysén, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un aumento no significativo del consumo de inhalables, pasando de 4,5% en 2009 a 7% en 2011.

GRÁFICO 225:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Aysén, Chile 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres (9,3% frente a 4,2%, respectivamente), no así por cursos. Ninguna de las variaciones observadas respecto al último estudio es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 226:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Aysén, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar la percepción de riesgo: Percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 37,7% en 2009 a 54,8%, mientras que para embriaguez varía desde 63,7% a 81,7%.

GRÁFICO 227:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Aysén, 2005-2011



La percepción de riesgo para el consumo frecuente de marihuana presenta un aumento significativo de un 39,1% en 2009 a un 54,7% en 2011, no así para el consumo frecuente de cocaína.

GRÁFICO 228:
Evolución de la percepción de gran riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Aysén, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable en el último período con reportes de 25,1% en 2009 y 27,6% en 2011, asimismo la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año varía no significativamente de 25,9% en 2009 a 23,5% en 2011.

GRÁFICO 229:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Aysén, 2001-2011



La facilidad de acceso no varía significativamente para cocaína (5,7% en 2009 a 6,7% en 2011) ni tampoco para pasta base (7,3% en 2009 a 4,4% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía desde 6,7% en 2009 a 4,4% en 2011 para cocaína y pasa de 8,3% a 3,5% en pasta base, siendo solo esta última variación estadísticamente significativa.

GRÁFICO 230:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Aysén, 2001-2011



REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

MUESTRA Y POBLACIÓN REPRESENTADA

Para la región de Magallanes, la muestra efectiva fue de 454 alumnos que representan a 4.911 alumnos de 8° básico a 4° medio de colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de la región.

La comuna encuestada en la región fue Punta Arenas.

CUADRO 52:
Detalles de la muestra para la Región de Magallanes, por sexo

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Magallanes	267	2.728	187	2.182	454	4.911

CUADRO 53:
Detalles de la muestra para la Región de Magallanes, por curso

Región	8° Básico		1° Medio		2° Medio		3° Medio		4° Medio	
	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada	Muestra	Población representada
Magallanes	119	1.892	92	923	90	856	94	812	59	429

La diferencia en el tamaño de la muestra en 8° básico, respecto de los cursos de enseñanza media se debe a que no se logró llegar a esos niveles en los establecimientos municipales, por lo que los resultados de la región no tienen la representación en esos estratos

CONSUMO DE TABACO

Entre los escolares de la región, el consumo diario de tabaco presenta un descenso significativo respecto al estudio anterior, cayendo 8,8 puntos porcentuales (16,3% en 2009 frente a 7,5% en 2011).

GRÁFICO 231:
Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Región de Magallanes, 2003-2011



Al desagregar la prevalencia, se observa que el consumo de tabaco por parte de los hombres es mayor que el de mujeres para el 2011 (8,7% frente a 5,9%). El descenso observado en mujeres para este indicador es estadísticamente significativo (20,4% para 2009 a 5,9% en 2011), mientras que el descenso observado en hombres no lo es.

En línea con el estudio anterior, se mantiene la tendencia de que son los alumnos provenientes de cursos mayores (2° a 4° medio) quienes más consumen. En el presente estudio se realizaron 211 encuestas entre 8° básico y 1° medio, de estas encuestas, 33 estudiantes reportaron consumo mensual de tabaco (prevalencia mes de 17,4% expandiendo a la población), de estos 33 casos solo uno reportó consumo diario de tabaco (20 o más días en el último mes). Cabe mencionar que la dispersión de los resultados de la región es

alta y que los reportes del 2011 pueden estar subestimando el resultado, especialmente cuando se analiza en relación a la tendencia histórica.

GRÁFICO 232:
Evolución de la prevalencia de consumo tabaco diario, según sexo y curso. Región de Magallanes, 2009-2011



CONSUMO DE ALCOHOL

Entre los escolares de la región de Magallanes, el uso de alcohol en último mes se mantiene estable respecto al estudio anterior. La diferencia con el 32,4% observado el 2009 no es estadísticamente significativa, por lo que no debe interpretarse como una disminución del consumo de esta sustancia en la región.

GRÁFICO 233:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Región de Magallanes, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia mes de consumo de alcohol, se observa que por sexo el consumo de alcohol es significativamente mayor en mujeres (45,3%) que en hombres (26,1%). En mujeres se produce un aumento (no significativo) de más de 10 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, asimismo, el descenso observado en hombres tampoco es significativo.

Por cursos, el grupo entre 8° básico y 1° medio registra una prevalencia de 20,7%, mientras que en el grupo de cursos mayores es de 53,5% (diferencia significativa). En ambos grupos de cursos las variaciones registradas respecto al estudio anterior no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 234:
Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo y curso. Región de Magallanes, 2009-2011



La prevalencia de consumo intenso (5 o más tragos en una sola ocasión durante los últimos 30 días) entre quienes declararon consumo de alcohol en el último mes es de 56,7% en la región. Al desagregar esta variable por sexo, se puede apreciar que un 64,5% de los hombres y un 51% de las mujeres han tenido a lo menos un episodio de embriaguez. Por dependencia administrativa, la prevalencia es de 65,3% en colegios subvencionados, mientras que en los particulares pagados es de 58,3%.

GRÁFICO 235:
Proporción de individuos que declara haber bebido 5 o más tragos en una sola ocasión durante el último mes, según sexo y dependencia administrativa. Región de Magallanes, 2011



De los estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, el 65,9% declaró que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol. No se observó diferencia entre los distintos niveles, sin embargo, por dependencia administrativa, los consumidores de alcohol de establecimientos particulares pagados son los que declaran la mayor facilidad para comprarlo, con un 81,4%, seguido por los particulares subvencionados con 69%.

GRÁFICO 236:
Proporción de consumidores de último mes de alcohol que declara que le sería fácil comprar alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Magallanes, 2011



CONSUMO DE MARIHUANA

En la región, la prevalencia de último año de consumo de marihuana confirma la tendencia al alza observada desde el 2007, con una variación de 3,2 puntos porcentuales respecto del estudio anterior, cuando el uso de esta droga en la región marcó 14,5% (variación no significativa).

GRÁFICO 237:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Región de Magallanes, 2001-2011



Al desagregar los resultados, se observa que el consumo es de 18,2% y 17,2% para hombres y mujeres, respectivamente. En ambos casos hubo una variación (no significativa) con respecto a 2009 de 1,8 y 4,4 puntos porcentuales.

Por cursos, el consumo es significativamente más alto en el grupo de 2º a 4º medio en comparación al de 8º básico a 1º medio, con prevalencias de 28,9% y 9,5%, respectivamente. El aumento observado en los cursos mayores, respecto al estudio anterior, es estadísticamente significativo.

GRÁFICO 238:
Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo y curso. Región de Magallanes, 2009-2011



CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

La prevalencia de consumo de último año para cocaína total en la región llega a 3,8%, variación no significativa respecto al 3,4% del estudio anterior.

GRÁFICO 239:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar. Región de Magallanes, 2001-2011



Al desagregar la prevalencia de consumo de cocaína total, se observa que en hombres está equiparado con el consumo de mujeres (3,9% frente a 3,8%). Las variaciones observadas en ambos sexos con respecto al estudio anterior no son significativas. Al desagregar por nivel este resultado, no se aprecian diferencias entre los cursos menores y mayores. Las alzas en ambos grupos en relación al estudio del 2009 no son estadísticamente significativas.

GRÁFICO 240:
Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total, según sexo y curso. Región de Magallanes, 2009-2011



CONSUMO DE INHALABLES

En la región se observa un descenso no significativo del consumo de inhalables, pasando de un 6,2% en 2009 a un 5,4% en 2011.

GRÁFICO 241:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Región de Magallanes, 2001-2011



Al desagregar el consumo, se observa un patrón distinto al descrito para cocaína total, en donde el consumo en mujeres es mayor al de los hombres (6,6% frente a 4,4%) y que el consumo de los cursos mayores es significativamente más alto que el de los cursos menores (9,4% frente a 2,4%). Ninguna de las variaciones observadas en relación al 2009 es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 242:
Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo y curso. Región de Magallanes, 2009-2011



PERCEPCIÓN DE RIESGO

En el caso de alcohol existen dos indicadores para caracterizar la percepción de riesgo: Percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente (uno o dos tragos todos o casi todos los días) y percepción de riesgo de embriagarse con alcohol. El comportamiento de estos indicadores es al alza en la región (al igual que la tendencia nacional), con una variación significativa respecto al estudio anterior. La percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente aumenta desde un 45% en 2009 a 61,3%, mientras que para embriaguez varía (significativamente) desde 64,9% a 79,4%.

GRÁFICO 243:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Región de Magallanes, 2005-2011



El mismo indicador de percepción de riesgo para el consumo frecuente de marihuana y cocaína presenta un comportamiento similar en el último período. La proporción de estudiantes que declaran riesgoso el consumo frecuente de cocaína sube de un 53,2% a un 60,8% (variación no significativa), mientras que para el consumo frecuente de marihuana se registra un aumento de 16,2 puntos porcentuales en relación al estudio anterior (variación significativa). Ambos indicadores se encuentran por sobre de sus resultados nacionales (58,8% y 48%, respectivamente).

GRÁFICO 244:
Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana y cocaína frecuentemente. Región de Magallanes, 2001-2011



DISPONIBILIDAD Y ACCESO

La proporción de personas que declara que le sería fácil conseguir marihuana se mantiene estable en el último periodo con reportes de 27,9% en 2009 y 23,7% en 2011, mientras que la proporción de individuos que declara haber recibido ofrecimiento de marihuana en el último año pasa de 25% en 2009 a 18,9% en 2011 (variación no significativa).

GRÁFICO 245:
Evolución de facilidad de acceso de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Magallanes, 2001-2011



La facilidad de acceso se mantiene estable para cocaína (9,4% en 2009 a 7,2% en 2011) y para pasta base (8,4% en 2009 a 6,7% en 2011). Por otro lado, la oferta reciente varía de 10,2% en 2009 a 6,3% en 2011 para cocaína y de 7,6% a 5,3% en pasta base. Ninguna de estas variaciones es estadísticamente significativa.

GRÁFICO 246:
Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Magallanes, 2001-2011



ANEXO I

Cuadros Estadísticos con Información Complementaria

Anexo I: Cuadros Estadísticos con Información Complementaria
Prevalencias de Consumo de Sustancias

TABLAS DE RESULTADOS GENERALES SERIE SENDA 2001-2003-2005-2007-2009-2011

Las tablas que dan cuenta de las realidades regionales deben ser interpretadas con cautela. La desagregación de la muestra por sexo, curso y dependencia administrativa reduce significativamente la cantidad de observaciones disponibles por región restando precisión a la estimaciones observadas.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

Prevalencias de consumo de tabaco y alcohol
Prevalencias de consumo de marihuana
Prevalencias de consumo de pasta base, cocaína y cocaína total
Prevalencias de consumo de otras drogas como inhalables, estimulantes, éxtasis, alucinógenos

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALCOHOL

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Alcohol vida											
2001	77,6	77,0	78,1	58,0	73,7	82,5	88,2	90,4	73,3	79,1	85,4
2003	78,6	78,0	79,1	62,0	74,2	83,6	88,6	91,5	74,8	79,9	85,6
2005	73,1	71,6	74,7	49,7	68,4	79,5	85,0	89,4	68,0	74,7	83,2
2007	77,1	75,6	78,6	57,1	71,6	82,2	87,6	90,4	73,1	78,5	84,1
2009	75,0	73,5	76,9	54,7	69,0	80,6	85,3	89,3	71,7	75,9	81,3
2011	78,9*	77,3*	80,2*	62,7*	75,7*	84,9*	87,9*	90,8	74,1*	80,4*	86,2*
Alcohol año											
2001	61,5	60,2	62,9	41,0	56,5	65,7	73,0	77,3	55,6	63,8	72,6
2003	60,4	58,8	61,9	41,2	53,7	65,6	73,7	77,0	55,3	61,9	70,9
2005	59,8	57,7	61,8	35,7	54,3	66,2	72,0	77,5	54,0	61,7	71,0
2007	58,6	56,1	61,0	37,1	51,4	63,0	71,1	74,6	52,9	60,6	68,4
2009	57,0	54,9	59,5	36,1	49,9	61,4	68,3	73,9	52,5	58,2	65,6
2011	59,3*	57,9*	60,7	40,4*	55,4*	66,1*	69,0	75,1	53,5	60,4*	73,3*
Alcohol mes											
2001	38,9	40,3	37,5	20,9	32,8	41,2	49,9	55,4	33,7	40,4	49,4
2003	38,7	39,1	38,4	21,2	31,5	42,5	50,8	57,0	34,1	39,8	48,8
2005	43,3	43,2	43,5	21,4	36,8	47,8	55,6	62,3	38,2	44,7	54,2
2007	38,1	37,9	38,4	18,7	30,1	41,1	50,3	55,0	33,7	39,2	47,7
2009	35,5	35,6	35,5	17,6	28,1	37,7	45,7	52,8	32,9	35,5	42,7
2011	34,7	34,6	34,9	18,7	29,4	38,6	44,7	52,5	31,6	35,1	44,1

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE TABACO

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Tabaco vida											
2001	77,8	74,9	80,6	65,2	75,9	81,3	84,1	85,6	77,6	78,0	77,7
2003	75,5	73,1	77,9	63,4	73,1	79,3	82,6	84,0	75,7	75,3	75,8
2005	69,8	66,3	73,2	54,3	66,6	74,1	77,2	80,8	68,8	70,1	71,5
2007	71,4	68,4	74,2	55,5	67,6	75,0	79,8	81,3	71,2	71,9	70,1
2009	68,2	65,2	71,4	51,2	64,3	72,6	76,4	79,3	68,9	67,6	68,4
2011**	57,2	53,9	60,3	40,9	53,6	62,9	67,1	69,8	58,6	56,8	55,6
Tabaco año											
2001	55,9	51,7	59,9	42,5	54,3	59,0	62,4	64,5	54,4	56,2	59,1
2003	51,6	48,1	55,0	39,0	48,2	55,1	60,0	61,2	50,2	51,7	55,2
2005	53,0	48,6	57,4	37,7	51,2	58,2	59,6	61,7	51,4	53,9	55,1
2007	48,8	45,0	52,6	34,1	45,3	51,7	57,2	58,2	47,4	49,8	49,7
2009	46,3	42,5	50,2	32,0	43,4	49,2	53,8	55,4	46,2	45,7	48,2
2011**	38,5	35,4	41,5	25,7	37,4	43,3	43,8	47,8	38,0	38,1	42,5
Tabaco mes											
2001	42,0	39,1	44,9	26,4	38,2	45,6	51,0	53,4	40,9	42,1	44,9
2003	38,2	35,4	40,9	24,1	33,2	41,8	47,5	51,0	36,9	38,4	41,1
2005	41,3	38,4	44,3	26,0	38,3	45,7	49,1	51,5	40,7	41,7	42,1
2007	35,4	32,7	38,0	20,7	30,9	38,0	44,2	45,7	34,8	35,7	35,8
2009	33,1	30,6	35,6	18,7	29,3	36,3	40,5	43,3	33,6	32,2	34,8
2011**	25,9	23,5	28,2	13,7	23,0	29,8	31,8	38,0	25,9	25,6	27,7
Tabaco diario											
2003	15,8	14,8	16,7	5,3	11,3	18,4	23,0	26,6	15,2	15,5	18,3
2005	15,3	14,2	16,5	4,7	11,4	17,8	21,6	24,8	14,7	15,3	17,1
2007	13,6	12,5	14,7	3,8	10,2	15,0	19,7	21,3	13,4	13,6	14,3
2009	12,7	11,6	13,9	4,3	9,8	14,1	17,9	19,4	13,2	12,2	13,1
2011**	8,1	7,5	8,7	2,7	7,0	9,3	11,2	13,8	8,6	7,8	9,2

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE MARIHUANA

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Marihuana vida											
2001	24,4	26,9	22,0	9,6	18,5	27,1	33,9	38,1	24,8	24,4	23,6
2003	22,2	24,6	19,8	8,8	15,9	25,3	31,1	37,6	22,7	21,6	22,4
2005	19,4	21,1	17,7	6,6	13,1	20,7	27,9	34,5	19,9	18,9	19,6
2007	25,2	27,2	23,3	10,0	19,8	27,0	34,3	38,3	25,9	24,7	25,2
2009	25,3	27,0	23,8	11,3	19,2	27,1	34,0	38,7	27,3	24,2	24,1
2011	26,5	28,1	25,0	14,4*	21,8	30,5*	35,3	37,1	28,7	26,4*	18,6*
Marihuana año											
2001	14,8	16,2	13,5	5,5	11,1	17,0	20,9	22,5	14,4	15,0	15,4
2003	13,0	14,3	11,7	4,9	9,1	15,2	18,7	21,6	13,0	12,5	14,3
2005	14,7	16,1	13,4	4,8	9,9	16,2	21,2	25,8	15,0	14,3	15,3
2007	15,6	16,7	14,5	5,3	12,1	17,2	21,7	23,6	15,3	15,6	16,2
2009	15,1	15,7	14,5	6,5	11,6	16,7	20,4	22,1	15,9	14,5	14,8
2011	19,5*	20,2*	18,9*	10,5*	16,8*	23,4*	26,2*	24,3	20,7*	19,6*	14,6
Marihuana mes											
2001	7,9	9,1	6,6	2,7	5,9	9,1	11,0	12,0	8,0	7,9	7,6
2003	6,8	7,9	5,6	2,6	5,2	7,8	9,5	10,9	7,1	6,4	6,9
2005	6,2	7,1	5,3	2,1	4,5	7,1	8,9	10,0	6,6	5,8	6,4
2007	8,3	9,4	7,3	2,9	6,7	9,5	11,2	12,1	8,6	8,0	8,5
2009	7,7	8,4	7,0	3,5	6,4	8,6	10,3	10,7	8,7	7,2	7,0
2011	11,2*	11,4*	10,9*	6,0*	9,9*	14,3*	14,4*	12,9	12,4*	11,2*	6,0

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior
** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CLORHIDRATO DE COCAÏNA

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Cocaína vida											
2001	6,2	8,3	4,2	3,0	4,8	6,5	8,4	9,7	6,5	6,5	5,0
2003	5,9	7,9	4,0	3,2	4,5	6,4	7,2	10,2	6,3	6,1	4,8
2005	4,7	6,0	3,3	3,6	4,5	4,7	5,3	5,7	5,6	4,2	3,2
2007	6,1	8,1	4,2	3,8	5,7	6,0	7,3	8,5	6,9	5,7	5,4
2009	6,7	8,8	4,6	4,7	5,8	7,0	8,1	8,5	8,1	6,1	5,2
2011	5,9*	7,6*	4,1	4,9	4,0*	7,2	6,5*	8,0	7,5	5,5	3,0*
Cocaína año											
2001	3,2	4,4	2,1	1,3	2,2	3,6	4,5	5,3	3,2	3,4	2,8
2003	3,1	4,2	1,9	1,6	2,1	3,3	3,8	5,6	3,1	3,2	2,7
2005	2,8	3,8	1,9	1,8	2,6	2,9	3,4	3,9	3,4	2,6	2,1
2007	3,1	4,1	2,0	1,7	2,9	3,0	3,6	4,3	3,4	2,8	2,9
2009	3,4	4,5	2,4	2,4	3,1	3,5	4,1	4,3	4,1	3,0	2,8
2011	3,2	4,5	2,0	2,7	2,7	4,1	3,7	3,0*	4,0	3,1	1,7*
Cocaína mes											
2001	1,4	2,0	0,9	0,6	1,0	1,7	1,7	2,3	1,4	1,5	1,2
2003	1,5	2,1	0,9	0,9	1,1	1,6	1,8	2,5	1,6	1,4	1,3
2005	1,2	1,6	0,8	0,8	1,2	1,2	1,5	1,7	1,6	1,0	0,6
2007	1,5	2,0	0,9	0,8	1,5	1,4	1,8	2,0	1,7	1,3	1,3
2009	1,7	2,2	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	1,9	2,1	1,5	1,4
2011	1,5	2,2	0,9*	1,4	1,1	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5	0,9

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE PASTA BASE

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Pasta base vida											
2001	4,9	6,6	3,2	2,9	4,6	5,3	6,2	6,0	5,8	4,5	3,3
2003	5,3	7,2	3,5	3,5	4,6	5,6	6,0	7,8	6,3	4,7	4,0
2005	3,7	4,9	2,6	2,3	3,6	4,1	4,2	4,8	5,0	3,0	2,2
2007	5,5	7,0	4,1	4,1	5,5	5,5	5,8	7,0	6,8	4,6	4,7
2009	5,3	6,9	3,8	4,1	5,5	5,8	5,6	5,8	7,1	4,3	4,2
2011	4,1*	5,2*	2,9*	4,0	3,5*	4,6	4,3	3,9*	6,0	3,4*	1,9*
Pasta base año											
2001	2,3	3,1	1,5	1,3	2,1	2,6	2,8	2,9	2,7	2,1	1,5
2003	2,5	3,5	1,6	1,5	2,2	2,8	2,8	3,8	2,9	2,3	1,9
2005	2,5	3,4	1,7	1,7	2,5	2,8	2,9	2,9	3,4	2,1	1,6
2007	2,6	3,5	1,7	1,7	2,6	2,8	2,6	3,3	3,3	2,1	2,3
2009	2,6	3,4	1,9	2,1	2,8	3,1	2,4	2,7	3,7	2,0	2,0
2011	2,2*	3,1	1,3*	2,4	2,0	2,5	2,0	2,2	3,2	1,9	1,2*
Pasta base mes											
2001	1,0	1,5	0,6	0,5	1,0	1,3	1,1	1,4	1,3	0,9	0,7
2003	1,2	1,7	0,7	0,8	1,0	1,4	1,4	1,8	1,4	1,1	1,0
2005	1,1	1,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,4	1,2	1,5	0,9	0,8
2007	1,2	1,8	0,7	0,9	1,3	1,4	1,1	1,5	1,6	0,9	1,3
2009	1,3	1,7	0,9	1,2	1,4	1,5	1,1	1,3	1,9	1,0	1,0
2011	1,2	1,6	0,8	1,3	1,1	1,3	1,0	1,2	1,7	1,0	0,7

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA TOTAL (COCAÍNA + PASTA BASE)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Cocaína total vida											
2001	7,7	10,2	5,3	3,8	6,3	8,1	10,3	11,4	8,4	7,7	6,0
2003	7,6	10,0	5,3	4,2	6,0	8,3	9,2	12,4	8,4	7,4	6,0
2005	6,6	8,5	4,7	4,5	6,3	6,8	7,6	8,4	8,3	5,8	4,4
2007	8,0	10,2	5,8	5,0	7,4	8,0	9,3	10,9	9,2	7,3	6,8
2009	8,2	10,7	5,8	5,7	7,5	8,7	9,7	10,3	10,2	7,2	6,6
2011	7,4*	9,2*	5,5	6,2	5,5*	8,8	8,3	9,2	9,5	6,8	3,7*
Cocaína total año											
2001	4,2	5,6	2,8	1,9	3,3	4,7	5,5	6,4	4,4	4,3	3,4
2003	4,1	5,6	2,7	2,1	3,2	4,6	5,0	6,9	4,3	4,2	3,4
2005	4,2	5,5	2,9	2,6	3,9	4,4	4,9	5,5	5,2	3,6	2,9
2007	4,3	5,8	2,8	2,4	4,1	4,4	4,9	5,9	5,0	3,8	3,8
2009	4,5	5,8	3,1	3,1	4,1	5,0	5,2	5,2	5,7	3,8	3,6
2011	4,4	6,1	2,8	4,1*	3,7	5,3	4,8	4,1	5,7	4,1	2,2*
Cocaína total mes											
2001	2,0	2,7	1,2	0,9	1,6	2,4	2,3	2,9	2,1	2,0	1,5
2003	2,1	2,9	1,2	1,3	1,6	2,3	2,4	3,3	2,3	1,9	1,8
2005	2,0	2,7	1,3	1,3	2,0	2,1	2,4	2,4	2,7	1,6	1,2
2007	2,2	3,0	1,3	1,2	2,2	2,2	2,4	2,9	2,7	1,8	1,9
2009	2,3	3,0	1,6	1,9	2,2	2,4	2,6	2,5	3,0	1,9	1,8
2011	2,3	3,2	1,3	2,1	1,8	2,6	2,5	2,3	2,9	2,1	1,2

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE INHALABLES

Inhalables como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers o pinturas

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Inhalables vida											
2001º	4,5	5,9	3,1	2,9	4,0	5,0	5,5	5,6	4,6	4,3	4,7
2003	8,2	9,5	6,9	6,4	8,1	9,1	8,7	9,0	9,0	7,5	7,6
2005	5,9	6,5	5,4	4,3	6,1	6,7	6,6	6,3	6,7	5,3	5,5
2007	8,0	8,6	7,5	7,4	8,5	8,0	8,2	7,8	8,3	7,9	7,8
2009	8,7	8,8	8,6	8,1	9,0	9,4	8,7	7,9	8,9	8,6	8,0
2011	7,9*	8,2	7,7	7,2	8,0	9,3	7,6	7,6	8,6	7,7*	7,1
Inhalables año											
2001º	1,9	2,5	1,3	1,2	1,8	2,2	2,3	2,1	1,9	1,7	2,1
2003	3,2	3,6	2,8	2,9	3,2	3,7	3,1	2,9	3,6	2,9	2,8
2005	2,8	3,1	2,6	2,4	3,2	3,3	2,9	2,2	3,3	2,5	2,6
2007	3,1	3,2	3,0	3,0	3,8	3,2	2,8	2,5	3,2	3,0	3,2
2009	3,0	2,9	3,0	3,1	3,4	3,1	2,8	2,3	3,2	2,8	2,9
2011	4,0*	4,0*	3,9*	4,1*	4,1	4,2	3,5	3,7	4,5*	3,7*	4,0
Inhalables mes											
2001º	0,7	1,0	0,5	0,4	0,8	1,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7
2003	1,4	1,6	1,2	1,5	1,4	1,4	1,2	1,3	1,6	1,2	1,1
2005	1,1	1,2	0,9	0,9	1,3	1,2	1,1	0,8	1,3	1,0	1,0
2007	1,3	1,3	1,2	1,2	1,6	1,2	1,1	1,0	1,3	1,2	1,3
2009	1,3	1,4	1,2	1,4	1,6	1,3	1,1	0,9	1,4	1,2	1,3
2011	1,7*	1,7	1,8*	2,3*	1,7	1,7	1,6	1,3	1,8	1,7*	1,6

º En cuestionario 2001 dice "solventes", por lo que no se puede comparar con restantes cuestionarios

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE MDMA–ÉXTASIS

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Éxtasis vida											
2001	2,6	3,6	1,7	2,3	2,9	2,8	2,7	2,4	3	2,4	2,1
2003	3,4	4,5	2,2	3,1	3,3	3,5	3,3	3,9	3,8	3,1	2,9
2005	3,9	4,9	2,9	3,1	4,6	4,2	3,8	3,6	4,7	3,4	2,9
2007	3,8	5	2,6	3,4	4,1	3,7	3,8	3,9	4,4	3,3	3,6
2009	3,7	4,6	2,8	3	3,8	3,8	4	3,7	4,6	3,2	2,9
2011	2,2*	2,8*	1,7*	2,2*	2,2*	2,2*	2,3*	2,4*	3*	1,9*	1,7*
Éxtasis año											
2001	1,1	1,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,2	1,1	1,3	0,9	0,9
2003	1,4	1,9	0,8	1,2	1,3	1,4	1,3	1,7	1,5	1,3	1,3
2005	1,9	2,4	1,4	1,5	2,4	2	1,7	1,6	2,3	1,6	1,5
2007	1,6	2,2	1,1	1,5	2	1,6	1,5	1,6	1,9	1,3	1,9
2009	1,7	2,2	1,2	1,5	1,9	1,8	1,7	1,6	2,2	1,4	1,3
2011	1,3*	1,5*	1	1,3	1,2*	1,2*	1,1*	1,4	1,5*	1,1*	1
Éxtasis mes											
2001	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4
2003	0,6	0,9	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6
2005	0,8	1	0,5	0,6	1	0,8	0,7	0,7	1	0,6	0,6
2007	0,7	1	0,4	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,9	0,5	0,6
2009	0,8	1,1	0,6	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6
2011	0,4*	0,5*	0,3*	0,5*	0,4*	0,3*	0,3*	0,3*	0,5*	0,3*	0,5

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ESTIMULANTES

Estimulantes sin prescripción médica, como anfetaminas (ritalín) o metanfetaminas (cidrín)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Estimulantes vida											
2001°	5,6	7,0	4,2	3,8	5,4	6,2	6,7	6,3	5,4	5,2	6,9
2003	5,9	7,0	4,8	3,9	5,3	6,8	6,7	7,8	6,2	5,5	6,2
2005	4,5	5,1	3,8	2,7	4,6	5,0	5,1	5,3	5,1	4,0	4,3
2007	5,6	6,2	4,9	4,5	5,4	5,1	6,5	6,4	5,8	5,4	5,4
2009	5,2	5,8	4,5	4,0	5,1	5,6	5,7	5,5	5,9	4,8	4,4
2011	2,6	2,8	2,4	2,5	2,6	2,3	3,0	2,7	3,1	2,5	1,6
Estimulantes año											
2001°	2,2	2,6	1,7	1,4	2,1	2,6	2,7	2,4	2,2	1,9	2,7
2003	2,3	2,8	1,9	1,4	2,1	2,7	2,5	3,1	2,4	2,2	2,3
2005	2,5	2,8	2,2	1,6	2,8	2,9	2,5	2,6	2,8	2,3	2,1
2007	2,4	2,7	2,0	1,9	2,4	2,2	2,8	2,6	2,6	2,1	2,5
2009	1,8	2,1	1,6	1,5	2,0	2,0	1,9	1,9	2,2	1,6	1,7
2011	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,2	1,6	1,4	1,6	1,3	0,9
Estimulantes mes											
2001°	0,9	1,2	0,7	0,7	0,9	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	1,2
2003	1,0	1,2	0,7	0,7	0,9	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,9
2005	1,0	1,2	0,8	0,7	1,2	1,1	1,1	0,9	1,2	0,9	0,9
2007	1,0	1,2	0,8	0,9	1,1	0,7	1,2	0,8	1,1	0,8	1,0
2009	0,9	1,0	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,1	0,7	0,8
2011	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4

° En cuestionario 2001 dice "anfetaminas". En año 2011 se excluye mentanfetaminas

° Por cambio de frase en la pregunta respecto a 2009 no se realiza análisis de significancia estadística entre 2009 y 2011

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS

Alucinógenos como LSD u otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Alucinógenos vida											
2005	3,6	4,7	2,5	2,9	4,1	3,8	3,9	3,3	4,5	3,0	2,7
2007	3,6	4,7	2,5	3,2	3,8	3,3	3,9	4,0	4,1	3,1	3,8
2009	3,5	4,4	2,5	3,0	3,6	3,6	3,6	3,7	4,4	2,9	2,9
2011	3,7	4,2	3,2	2,6	3,1	4,0	4,5	4,8	4,1	3,5	3,1
Alucinógenos año											
2005	1,7	2,2	1,1	1,3	2,0	1,9	1,6	1,4	2,1	1,3	1,3
2007	1,5	2,1	1,0	1,3	1,8	1,4	1,5	1,7	1,9	1,2	1,7
2009	1,4	1,8	0,9	1,1	1,5	1,4	1,4	1,4	1,8	1,2	1,1
2011	2,2	2,4	2,0	1,7	2,0	2,6	2,4	2,3	2,7	2,0	1,9
Alucinógenos mes											
2005	0,7	0,9	0,4	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,5	0,5
2007	0,7	0,9	0,4	0,6	0,8	0,5	0,7	0,6	0,9	0,5	0,5
2009	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,9	0,5	0,4
2011	1,0	1,1	0,8	0,9	0,9	1,1	0,8	1,1	1,1	0,9	0,7

° En cuestionario 2003 solo prevalencia de vida. Falta la pregunta en cuestionario 2001. En cuestionario 2011 se preguntó por separado alucinógenos naturales y sintéticos

° Por cambio de la pregunta respecto a 2009, no se realiza análisis de significancia estadística entre 2009 y 2011

Anexo I: Cuadros Estadísticos con Información Complementaria
Variables Relacionadas con Uso de Sustancias

VARIABLES RELACIONADAS CON USO DE SUSTANCIAS

Precocidad
Promedio de edad de inicio
Intensidad y abuso
Policonsumo de drogas
Percepción de riesgo y aprobación
Actitudes básicas de prevención
Problemas relacionados con el uso de sustancias
Facilidad de acceso
Oferta actual y reciente de drogas
Lugar y origen de oferta de marihuana
Drogas en el entorno escolar y amigos
Drogas en el entorno del hogar
Actitud parental frente al uso de alcohol y drogas

PRECOCIDAD: PROPORCIÓN QUE DECLARA HABER PROBADO POR PRIMERA VEZ ANTES DE LOS 15 AÑOS

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Tabaco											
2001	80,3	78,9	81,6	98,4	92,4	82	69,8	60,7	78,8	81,7	81
2003	82,2	81,2	83,1	98,5	93,1	82,8	71,4	63,1	81,4	83,1	82,5
2005	79,4	78,3	80,4	98,4	93,3	80,2	68,6	58,4	79	80,2	78,3
2007	77,7	76,1	79,1	98,9	92,9	80,3	65,6	55,8	77	78,5	76,8
2009	77	75,2	78,6	98,3	92,9	78,9	65,3	55,6	76,2	77,9	76,4
2011	73,5*	72,8	74,7*	96,4*	88,2*	75,8*	60,3*	45,8*	74,9	73,5*	67,5*
Alcohol											
2001	67,4	67,4	67,4	96,8	87	69,5	53	39,9	64	69,7	70,2
2003	70,5	71	70,1	97,9	88,5	71,6	54,4	43,1	69	71,3	72,1
2005	69,1	68,9	69,3	97,8	90,7	71,1	54	40,9	66,8	70,2	71,3
2007	68,5	68,4	68,5	98,3	88,8	71,8	53,6	40,5	66,7	70	68
2009	68,3	68,2	68,3	98	91	71,3	52,4	40,5	66,7	69,2	68,9
2011	66,2*	66,7	66,1	96,4*	84,6*	65*	46,4*	37,4	66,1	66,7	63,2*
Inhalables											
2005	71,5	72,4	70,7	98	92,7	68,8	57,6	51,8	75,2	71,7	59
2007	67,4	64,1	70,7	97,4	86,5	67,3	43,2	44,1	68,2	68,2	62,6
2009	64,4	63,4	65,5	96,8	89,2	61,8	43,1	33,6	64	64,2	65,9
2011	65,6	61,6	69,4	96,6	79,8*	58,1	46,5	43,7	68	64,3	67,6

° Porcentajes sobre muestra total, quienes reportan edad inicio mayor a 8 años y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PRECOCIDAD: PROPORCIÓN QUE DECLARA HABER PROBADO POR PRIMERA VEZ ANTES DE LOS 15 AÑOS

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Marihuana											
2001	44,8	44,7	44,9	90,6	74,6	50,3	33,7	22,7	45,3	46,6	39,8
2003	46,4	47,6	45,1	93,5	76,1	51,1	33	25,1	49,8	45,9	38,9
2005	41,4	41,3	41,6	92	74,8	46	28,7	21,2	43,5	41,2	36,5
2007	41,2	41,2	41,2	93,6	75,5	44,9	25,8	20,2	43,6	40,9	35,5
2009	46,1	47,5	44,6	92,6	80,3	52,5	32,8	21,1	47,3	46	43,1
2011	46,8	48,5	45,2	91,7	70,2*	47,1	32,9	21,2	54,1*	44,8	28*
Cocaína											
2003	34,6	33,6	36,6	93,6	67,9	38,5	19	13,1	38,7	31	32,8
2005											
2007	38,2	36,4	41,6	92,5	71,6	38	25	15,5	40,3	36,9	36,2
2009	42,5	41,1	45,3	90,7	73,8	49,6	26,5	14,6	47,5	38,3	42,4
2011	39,2	35,4	46,5	85,1	63,4	41,3	18,9	15	48,7	33,8	45
Pasta base											
2003	44,5	43,9	45,7	93,1	66,9	47,1	29,9	22,3	44,8	43,5	46,3
2005											
2007	45,1	43,5	48,1	92,4	72,9	39,8	29,7	24,4	47,4	43,2	42,1
2009	49,1	48,7	50,3	95,5	72,9	47,8	32,6	23,8	48,1	50,1	49,9
2011	57,1*	51	64,8*	91,1	71,3	50,7	38,9	34,2	59,2	56,2	40,9

° Porcentajes sobre muestra total, quienes reportan edad inicio mayor o igual a 8 años y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

PROMEDIO DE EDAD DE INICIO

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Tabaco											
2001	13	13	13	11,9	12,6	13	13,5	13,9	13	12,9	13
2003	12,9	12,9	12,9	11,8	12,5	12,9	13,4	13,8	12,9	12,9	13
2005	13	13	13	11,9	12,6	13,1	13,5	13,9	13	13	13,2
2007	13,1	13,1	13,1	11,9	12,6	13,1	13,6	14	13,1	13,1	13,3
2009	13,2	13,3	13,2	12	12,7	13,2	13,7	14,1	13,2	13,2	13,3
2011	13,4*	13,4*	13,4*	12,3*	13*	13,3*	13,9*	14,6*	13,3	13,4*	13,8*
Alcohol											
2001	13,7	13,6	13,7	12,2	13,1	13,6	14,2	14,7	13,8	13,6	13,6
2003	13,5	13,5	13,6	12,1	13	13,6	14,1	14,6	13,5	13,5	13,6
2005	13,6	13,5	13,6	12,1	12,9	13,6	14,1	14,7	13,6	13,6	13,6
2007	13,6	13,6	13,6	12,1	13	13,6	14,1	14,6	13,6	13,5	13,7
2009	13,7	13,6	13,7	12,2	13	13,6	14,2	14,7	13,7	13,6	13,7
2011	13,7	13,6	13,7	12,2	13,2*	13,8*	14,4*	14,9*	13,7	13,7	13,9*
Inhalables											
2005	13,3	13,3	13,3	11,7	12,8	13,2	13,8	14,2	13,2	13,2	13,8
2007	13,5	13,6	13,4	12	12,9	13,6	14,4	14,6	13,5	13,5	13,6
2009	13,6	13,5	13,7	12,1	13	13,7	14,3	14,8	13,6	13,7	13,4
2011	13,5	13,6	13,5	12,3	12,8	13,8	14,3	14,8	13,6	13,5	13,4

° Porcentajes sobre muestra total, quienes reportan edad inicio mayor o igual a 8 años y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PROMEDIO DE EDAD DE INICIO

¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna de estas sustancias? En alcohol y cigarrillos no consideres cuando te dieron a probar siendo niño.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Marihuana											
2001	14,6	14,6	14,7	13	13,8	14,3	14,9	15,5	14,6	14,6	14,8
2003	14,5	14,5	14,6	12,8	13,6	14,3	14,9	15,4	14,4	14,5	14,8
2005	14,7	14,7	14,7	12,9	13,8	14,4	15	15,6	14,7	14,7	14,9
2007	14,7	14,7	14,7	12,9	13,7	14,5	15,1	15,6	14,6	14,7	14,9
2009	14,5	14,5	14,6	12,8	13,6	14,2	14,9	15,4	14,5	14,5	14,6
2011	14,5	14,5	14,6	13	13,8*	14,4*	15	15,6	14,3*	14,6	15,2*
Cocaína											
2003	15	15	14,9	12,7	13,8	14,5	15,4	16	14,8	15	15,1
2005											
2007	14,7	14,8	14,6	12,5	13,6	14,6	15,1	15,7	14,6	14,8	14,8
2009	14,5	14,5	14,5	12,6	13,3	14,2	15	15,7	14,2	14,8	14,5
2011	14,7	14,6	14,6	12,8	14*	14,4	15,2	15,9	14,2	14,9	14,3
Pasta base											
2003	14,6	14,6	14,6	12,8	13,8	14,3	15,1	15,6	14,6	14,6	14,5
2005											
2007	14,5	14,5	14,4	12,8	13,5	14,5	14,9	15,5	14,4	14,6	14,4
2009	14,2	14,1	14,3	12,5	13,2	14,1	14,8	15,3	14,1	14,2	14
2011	13,7	13,7	13,6*	12	13	13,7	15	14,4	13,3	13,9	14,5

° Porcentajes sobre muestra total, quienes reportan edad inicio mayor o igual a 8 años y quienes declaran haber probado alguna vez en la vida

INTENSIDAD DE USO DE MARIHUANA SEGÚN DECLARACIONES DE NÚMERO DE VECES: PROPORCIÓN QUE DECLARA UNA O DOS VECES

¿Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Una o dos veces en la vida											
2003	30,5	28,6	32,8	39,5	34,4	31,2	28,5	26,8	30,1	31,2	30
2005	35,4	33,4	37,8	42,7	38	35,4	34,2	33,5	33,4	37,5	35,2
2007	33,2	30,6	36	43,5	36,3	34,7	30,8	29,9	33,4	33,5	31,6
2009	34,3	32,8	36	42,4	36,4	34,9	32,4	32,1	32,3	35,3	37,3
2011	32,2	31,7	32,9	42,8	35,1	27,6*	32,6	28,9	31,3	32,4	35,8
Una o dos veces en el último año											
2003	29,2	26,8	32,2	34,5	27,9	29,5	29,6	28	29	29	30,5
2005	41,2	38,8	44,1	44,2	41,4	41,3	40,8	40,7	38,6	44	40,9
2007	34,9	32,4	37,6	39,8	35,8	34,8	33,5	34,7	33,8	35,8	34,6
2009	36,1	32,8	39,6	38,6	37,9	35,5	33,1	37,7	32,1	37,5	42,9
2011	32,7*	30,8	34,9*	48,3*	31,2*	29,7*	33,2	28,3*	30,9	33*	39,2
Una o dos veces en el último mes											
2003	34,4	30,9	39,3	37,9	33,4	35,2	35,8	32	31,7	36,8	36,3
2005	42,7	39,5	46,9	39,3	46,7	41,8	40,3	44,3	40,4	45,1	43
2007	39,6	37	43	40,1	38,6	39,9	41,5	37,9	36,9	41,9	39,8
2009	41,3	37,7	45,4	45,3	39,2	40,5	40,6	43	38,6	43,2	43,3
2011	40,1	35,8	44,8	42,3	38,4	42,8	39	37,8	31,6*	43,8	50,7

° Porcentaje sobre quienes declaran consumo

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

INTENSIDAD DE USO DE MARIHUANA SEGÚN DECLARACIONES DE NÚMERO DE VECES: PROPORCIÓN QUE DECLARA 10 O MÁS VECES
¿Cuántas veces has consumido marihuana en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
10 o más veces en la vida											
2003	41,5	43,2	39,4	29,7	37	40,3	43,7	46,7	42	40,3	42,8
2005	38,7	41,5	35,5	31,4	37,4	38,5	39,1	41	40,6	36,5	39,8
2007	40,3	44,1	36	30,9	38,5	39,9	41	43,2	40,9	39,4	41,2
2009	38,9	41,5	36,1	31,4	36,4	39,9	40,1	40,7	41	38,2	34,9
2011	36,4*	37,8*	34,7	28,2	36,7	34,5	40,2	37,7	39,3	35,4	30,1
10 o más veces en el último año											
2003	36	40,6	30,5	23,7	34,8	34,5	37,9	40	37,3	34,6	35,9
2005	30,3	33,7	26,2	26,7	28,4	31,2	30,7	31	32,5	27,7	31,1
2007	35,3	39,2	31	29,4	34,6	35,8	35,5	36,7	36,5	34,2	36
2009	34,6	38,6	30,5	29,6	34,6	35,7	35,3	34,5	37,9	33,1	30,4
2011	31,3*	33,9*	28,1	24,1	36,6	27,1*	33,7	32,2	34,8	29,9	26,2
10 o más veces en el último mes											
2003	28,5	32,7	22,7	21,9	24,9	28,6	28,7	32,8	31,4	25,7	26,9
2005	26,7	29,6	22,9	24,1	25,1	27,8	28,3	26	29,2	24,1	26,5
2007	27,5	31,2	22,7	22,3	31	26,7	25,9	28,6	30	25,8	25,9
2009	27,8	31,6	23	26	29,8	29,8	26,9	25,9	30,7	26,7	21,8
2011	23,6*	28	18,3	22,7	26,3	17,9*	27,1	25	32,9	19,1*	16,9

° Porcentaje sobre quienes declaran consumo

INTENSIDAD DE USO DE COCAÍNA TOTAL SEGÚN DECLARACIONES DE NÚMERO DE VECES: PROPORCIÓN QUE DECLARA UNA O DOS VECES
¿Cuántas veces has consumido cocaína (pasta base) en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Una o dos veces en la vida											
2003	37,8	33,3	46,4	37,9	35,8	37	41	37,3	35,7	39	41,7
2005	21,3	18,7	25,8	15,4	14,1	28,8	24,5	24,2	16,8	27	26,6
2007	41,2	36,8	48,8	40,8	37,8	43,7	44,8	38,5	38,8	44,8	37,3
2009	42,9	41,5	45,4	39,9	45,5	40,2	43,5	44	39	46,6	45,1
2011	41,4	36,2	51,2	35,9	38,4	41,4	44,3	45,8	31,3*	48,5	35,4
Una o dos veces en el último año											
2003	30,9	29,2	34,6	25,8	30,2	30,5	36,9	28,8	28,3	33	33,3
2005	27,7	25,8	31,6	21,3	15,5	39,6	28,5	33,2	23,1	34,6	29,9
2007	38,7	35,4	45,6	40,7	35,4	37,1	40,1	41,1	38,3	40,1	35,4
2009	41,1	38,4	45,7	44,2	40	42,9	40,8	38,8	36,8	45	46,5
2011	35,6	33	40,9	31,6*	37,1	39,1	38,8	26,8	30,8	39,7	26,4*
Una o dos veces en el último mes											
2003	27,1	25	31,9	26,8	23,8	25,9	30,4	27,7	27,7	26,3	26,7
2005	30,1	30,6	28,9	29,7	24,1	33,9	35,6	28,8	29,2	31,8	30,3
2007	42,1	40,6	45,5	47	39,3	39,4	38,7	48,4	42,7	42,7	38,6
2009	38,3	37,7	39	35,1	40,2	36,2	39,5	39,5	35,6	41,9	37,7
2011	30,9	30,4	29,3	32,3	30,5	23,8	39,2	29,3	33,9	30,5	10,2*

°Porcentaje sobre quienes declaran consumo. En cuestionario 2011 se preguntó por separado cocaína y pasta base

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

INTENSIDAD DE USO DE COCAÍNA TOTAL SEGÚN DECLARACIONES DE NÚMERO DE VECES: PROPORCIÓN QUE DECLARA 10 O MÁS VECES

¿Cuántas veces has consumido cocaína (pasta base) en tu vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
10 o más veces en la vida											
2003	32,7	35,9	26,5	26,1	32,2	32,7	32,4	35,4	33,6	31,8	32
2005	25,5	25,6	25,2	18,8	24,6	28,9	25,2	28,6	27,5	20,2	31,1
2007	33,4	37	27	35	37,3	31,4	32,5	32	34,9	30,5	37,5
2009	28,4	29,6	26	28	28,9	28,8	30,7	25,4	28,6	28	29
2011	26,4	30,9	19,8	31	22,8	29,9	20*	29	30,1	23,9	28,5
10 o más veces en el último año											
2003	31,1	33,4	26	29,4	27,9	30,5	30,7	34,6	33,1	28,4	32,3
2005	22,2	21,3	23,8	22,2	21,8	22,2	24,2	20,5	23,6	18,3	26
2007	31,4	32,6	28,9	34,3	34,9	32,6	29,8	27,4	32,9	29	34
2009	26,1	27,4	24	22,5	25,5	26,7	27,9	26,3	28,6	25,1	18,7
2011	32,5*	33,5	28,8	37,2*	27,6	31,8	29	40,6	31,9	33,5	25,3
10 o más veces en el último mes											
2003	36,1	36,6	34,9	41,2	37,3	32,5	38,8	34	35	39,1	32,3
2005	20,1	19,5	21,3	13	21	19,1	25,3	22,5	20,6	15,1	30,8
2007	28,4	28,5	28,3	34	34,4	28,2	30,6	19,2	30,5	26,5	26,6
2009	28,7	28,3	30,5	34,6	32,1	27,5	26,8	24,3	30,6	25,1	33,3
2011	33,4	31,6	36,2	38,7	20,5	39,7	28,5	37,4	31,2	34,1	42,9

° Porcentaje sobre quienes declaran consumo. En cuestionario 2011 se preguntó por separado cocaína y pasta base

INTENSIDAD DE USO DE TABACO, ALCOHOL Y MARIHUANA: PROMEDIO DE DÍAS EN ÚLTIMO MES

Piensa en los últimos 30 días, ¿cuántos días has fumado cigarrillos, tomado algún tipo de alcohol y/o consumido marihuana durante los últimos 30 días?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Cigarrillos: promedio de días en último mes											
2003	15,4	15,5	15,4	9,9	13,4	16,3	17,3	18,4	15,3	15,2	16,2
2005	14,1	14,2	14	8,6	12,2	14,6	16	17	13,9	14	14,9
2007	13,7	13,6	13,8	8,7	12,2	13,9	15,3	15,8	13,6	13,7	14
2009	13,7	13,6	13,9	9,4	12,4	13,9	15,2	15,5	13,9	13,5	13,7
2011	12,3*	12,3*	12,2*	8,8	11,9	12,1*	13,3*	14,1*	12,7*	12,1*	12,4
Alcohol: promedio de días en último mes											
2003	5,4	5,9	5	4,3	5,2	5,5	5,8	5,8	5,5	5,4	5,5
2005	5,2	5,6	4,9	4,4	4,9	5,3	5,5	5,5	5,2	5,2	5,3
2007	5,3	5,6	4,9	4,5	5	5,2	5,5	5,5	5,2	5,3	5,2
2009	5,5	5,9	5	4,8	5,3	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,3
2011	4,3*	4,8*	3,9*	3,6*	4,6	4,2*	4,4*	4,6*	4,6*	4,3*	4,2*
Marihuana: promedio de días en último mes											
2003	7,9	8,9	6,6	7,1	7,9	7,9	8	8,2	8,4	7,4	7,7
2005	7,9	8,5	7,2	8,3	7,8	8,5	8	7,4	8,6	7,4	7,5
2007	6,7	7,4	5,9	5,4	7	6,4	6,8	7,1	7,1	6,6	6,1
2009	6,9	7,5	6,3	5,1	6,6	7,2	7,6	7	7,4	6,7	6,4
2011	5,2*	5,9*	4,5*	3,7*	4,3*	5,3*	5,9*	6,6	5,8*	4,9*	4,4*

° Porcentaje sobre quienes declaran consumo en último mes

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

USO DE ALCOHOL EN SÁBADO POR LA NOCHE: PROPORCIÓN QUE DECLARA ALGUNO

¿Pensando en una salida de sábado por la noche: cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar? Ninguno, Menos de uno, Uno, Entre 2 y 5, Entre 5 y 10, Más de 10.

° Porcentajes sobre muestra total

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
						Alcohol					
2003	54,4	55,3	53,5	32,7	48,2	60,5	67,4	72,8	50,9	55,5	61,1
2005	49,3	48,6	50	24,3	41,6	55,3	63,2	69,9	44,4	50,9	58,4
2007	53,1	52,8	53,4	29,6	45,6	57,5	66,3	70,8	50	54,1	58,7
2009	49,3	49	49,9	27,1	41,4	53,4	61,3	68,6	47,5	49,4	54,1
2011	49,4	48,7	50	28,5	44,6*	54,8	61,8	68,7	46,7	50,2	53,4

ABUSO DE ALCOHOL: PROPORCIÓN QUE DECLARA 5 O MÁS VASOS DE ALCOHOL

¿Pensando en una salida de sábado por la noche: cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar? Ninguno, Menos de uno, Uno, Entre 2 y 5, Entre 5 y 10, Más de 10

° Porcentajes sobre muestra total

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
						Alcohol					
2003	13,4	18	9	5	10,4	15,4	18,8	21,8	13,2	13,6	13,7
2005	11,5	15	8,2	3,6	7,9	12,4	16,9	20,3	11,1	11,8	12,1
2007	11,9	15,6	8,2	3,9	8,3	12,5	17,2	19,3	11,9	11,6	12,6
2009	10,1	13,2	7,2	3	7,5	10,7	14,8	16,4	10,6	9,6	10,5
2011	8,9*	11,7*	6,3*	3,4	7,1	9,8	12,3*	15,7	9,2*	9	6,7*

POLICONSUMO DE DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR: PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ÚLTIMO AÑO DE DISTINTAS DROGAS

Proporción que ha consumido en el mismo período cada una de las drogas consideradas en la cabecera de cada columna

2009						
	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína	Inhalables
Tabaco	100	70,2	88,2	81,7	83,6	79,5
Alcohol	86,5	100	91,0	80,4	83,8	83,0
Marihuana	28,7	24,0	100	74,8	80,8	52,0
Pasta base	4,7	3,7	13,1	100	46,0	27,6
Cocaína	6,2	5,0	18,3	59,3	100	30,6
Inhalables	5,1	4,3	10,2	31,0	26,6	100
2011						
	Tabaco	Alcohol	Marihuana	Pasta base	Cocaína	Inhalables
Tabaco	100	55,7	76,8	60,3	67,2	62,4
Alcohol	85,8	100	85,6	75,2	81,8	81,9
Marihuana	38,9	28,2	100	57,9	67,4	47,4
Pasta base	3,5	2,8	6,6	100	32,8	23,8
Cocaína	5,7	4,5	11,2	47,5	100	24,1
Inhalables	6,4	5,5	9,6	42,2	29,4	100

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PERCEPCIÓN DE RIESGO: PROPORCIÓN QUE DECLARA RIESGO GRANDE

¿Cuál crees que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? Ningún riesgo, Riesgo leve, Riesgo moderado y Riesgo grande, No sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Fuma una o más de una cajetilla al día											
2001	66,7	63,0	70,3	60,0	62,7	68,7	71,1	73,3	64,0	68,5	69,8
2003	57,7	54,7	60,6	52,4	52,8	58,1	63,6	65,8	54,7	59,6	61,0
2005	58,0	54,1	61,8	52,3	53,8	57,9	62,3	66,8	54,4	59,8	62,8
2007	68,0	64,7	71,3	62,1	63,1	69,0	72,6	75,7	65,2	69,3	72,0
2009	65,3	62,8	68,1	60,5	60,9	65,7	69,0	72,2	59,9	68,0	70,3
2011**	83,9	81,7	86,2	81,5	84,0	84,2	86,1	84,0	80,5	85,2	87,6
Uso tabaco frecuentemente											
2005	36,0	35,4	36,6	39,2	36,0	34,6	34,6	35,2	36,5	36,4	33,4
2007	42,5	40,9	44,0	42,6	41,1	42,1	43,6	43,4	42,4	43,2	40,2
2009	45,0	44,0	46,3	45,2	44,2	44,4	45,8	45,8	43,3	46,5	44,4
2011**	49,9	49,2	51,0	52,9	47,1	49,5	50,8	49,2	48,3	50,9	49,3
Toma uno o dos tragos todos o casi todos los días											
2003	42,0	37,0	46,9	38,5	38,3	41,8	46,1	48,5	40,1	43,1	44,5
2005	42,6	38,4	46,7	41,3	40,2	41,3	43,9	48,0	41,4	43,7	42,3
2007	44,4	40,0	48,7	42,1	40,2	43,8	47,4	50,3	43,1	45,5	44,5
2009	45,8	41,8	49,9	43,4	42,5	45,3	48,1	51,0	42,7	48,0	46,3
2011**	57,6	54,1	61,2	52,1	55,4	59,3	61,4	63,5	55,7	57,9	63,6
Embriagarse con bebidas alcohólicas											
2005	52,9	48,3	57,4	55,5	52,7	52,1	51,4	52,5	51,7	54,9	50,1
2007	69,9	64,8	74,8	67,0	67,8	71,5	71,5	72,3	67,2	72,0	70,0
2009	69,1	65,0	73,7	67,2	67,2	69,7	70,6	71,6	65,0	71,7	71,3
2011**	79,8	76,3	83,5	79,4	80,2	80,1	80,5	78,2	77,6	81,4	77,1
Uso alcohol frecuentemente											
2007	61,2	56,9	65,5	59,0	59,4	62,4	63,0	62,8	61,0	62,8	56,3
2009	61,5	57,7	65,6	59,9	60,3	61,4	63,6	62,7	59,2	63,6	60,2
2011**	45,9	44,2	47,7	49,9	44,0	45,1	45,1	44,7	47,5	46,2	37,7

° Según los años, los indicadores son los siguientes: 2003 ("Toma cinco o más tragos al día"); 2005 ("Fumar cigarrillos frecuentemente" y, "Usa cocaína frecuentemente". Porcentajes obtenidos sobre respuestas válidas. Debe notarse que la proporción "No sabe" disminuye con el curso

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

PERCEPCIÓN DE RIESGO: PROPORCIÓN QUE DECLARA RIESGO GRANDE

¿Cuál crees que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? Ningún riesgo, Riesgo leve, Riesgo moderado y Riesgo grande, No sabe,

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Prueba marihuana una o dos veces											
2003	39,6	38,1	41,1	47,5	41,5	37,4	35,1	33,1	40,8	39,7	36,2
2005	39,8	38,4	41,1	48,5	43,7	37,8	33,6	32,1	40,5	40,2	36,4
2007	29,6	29,0	30,3	39,4	32,4	27,8	24,2	22,6	30,7	29,4	27,2
2009	30,2	29,6	30,9	37,6	32,8	29,4	25,8	23,4	29,5	31,0	28,8
2011	17,0	18,3	15,8	24,2	15,8	15,4	13,8	13,0	17,5	16,8	15,9
Fuma marihuana una o dos veces por semana											
2001	51,3	48,9	53,7	52,7	51,3	50,8	50,1	51,8	49,7	51,8	54,7
2003	47,2	44,1	50,3	51,6	47,7	46,0	45,5	43,8	45,5	48,0	50,0
2005	51,8	48,8	54,7	56,0	54,1	50,7	48,4	48,0	49,7	52,8	54,4
2007	38,2	36,0	40,3	45,6	39,4	37,0	34,6	33,2	37,2	38,3	40,9
2009	37,8	36,1	39,8	43,1	39,4	37,5	34,5	33,5	34,9	39,4	40,5
2011**	48,0	45,2	50,9	52,2	48,3	46,6	46,9	43,8	42,0	49,1	62,9
Prueba cocaína una o dos veces											
2003	54,9	51,9	57,8	53,4	52,4	54,1	58,5	58,0	52,8	56,1	57,5
2005	49,6	47,3	51,9	48,5	48,2	49,6	49,7	53,1	47,3	50,9	52,5
2007	43,8	41,6	45,9	44,8	42,4	43,6	43,9	44,6	42,5	44,6	44,8
2009	41,4	39,5	43,7	42,7	41,2	40,7	41,3	41,3	39,5	42,9	41,8
2011	27,6	28,1	27,2	29,9	24,4	27,2	27,9	29,6	27,4	27,5	29,4
Usa cocaína una vez al mes											
2001	52,3	50,5	54,0	46,9	49,1	52,5	55,8	59,2	49,2	52,8	59,2
2003	47,3	44,7	49,9	43,8	43,3	47,2	52,1	53,7	43,5	48,6	54,6
2005	57,5	54,1	61,0	54,9	55,3	57,7	58,9	62,6	54,0	59,3	62,5
2007	46,2	43,5	48,8	45,8	43,1	46,1	47,9	49,0	43,6	47,0	51,0
2009	43,6	41,3	46,2	43,9	41,7	43,6	43,9	45,7	40,4	45,3	46,5
2011	39,0*	39,7*	38,6*	39,6*	34,4*	38,0*	41,8	43,9	36,0	39,2	49,0*
Usa cocaína frecuentemente											
2005	68,9	64,0	73,8	64,7	65,6	69,4	71,8	75,6	64,1	71,5	75,0
2007	63,9	59,4	68,3	60,1	60,5	65,4	65,9	68,8	59,5	66,2	68,7
2009	60,2	55,7	65,1	57,2	57,5	60,7	62,0	65,0	54,0	63,7	65,4
2011	58,8	57,3	60,6*	53,9*	54,9	60,3	64,4	64,0	50,5*	60,7*	76,8*
Prueba pasta base una o dos veces											
2007	49,1	46,8	51,4	47,7	45,7	49,6	51,2	52,8	46,8	50,5	51,3
2009	45,3	43,2	47,6	44,4	43,3	44,9	46,4	48,0	42,5	47,0	46,8
2011	33,5	34,3	32,8	33,7	29,9	35,2	34,4	36,0	32,8	33,8	34,2
Prueba inhalables una o dos veces											
2007	49,8	46,8	52,8	48,3	46,7	50,1	51,5	53,6	47,7	51,2	51,2
2009	45,8	43,3	48,5	45,3	44,1	45,7	46,3	48,0	43,1	47,6	46,6
2011	40,4	39,5	41,3	38,2	37,9	41,5	42,1	44,5	39,5	41,0	38,9
Prueba Éxtasis una o dos veces											
2007	47,1	43,7	50,5	45,9	44,7	47,6	48,3	50,1	45,0	48,2	49,3
2009	46,4	43,5	49,7	45,6	44,8	46,6	47,2	48,7	43,7	48,2	47,8
2011	33,8	33,1	34,6	35,0	29,5	34,4	34,8	37,3	32,9	34,3	33,9

° Según los años, los indicadores son los siguientes: 2003 ("Toma cinco o más tragos al día"); 2005 ("Fumar cigarrillos frecuentemente" y "Usa cocaína frecuentemente". Porcentajes obtenidos sobre muestra total. Debe notarse que la proporción "No sabe" disminuye regularmente con el curso

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

APROBACIÓN DE USO DE TABACO, ALCOHOL, MARIHUANA Y COCAÍNA: PROPORCIÓN QUE RESPONDE NI BIEN NI MAL

¿Qué te parece a ti que una persona haga las siguientes cosas? Me parece muy mal, Me parece mal, Ni bien ni mal

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Que fume una o más de una cajetilla de cigarrillos al día											
2003	24,4	27,4	21,5	19	24	26,5	27,3	26,9	24,4	24,7	23,9
2005	23,1	24,6	21,6	15,5	22,7	26,3	26,3	25,8	23,1	23,5	21,9
2007	18	19,7	16,4	13,5	17,6	19,4	20,2	19,8	18,9	18	15,6
2009	17	19	15,1	12,6	16,4	19	19,5	18,2	17,8	16,8	15,8
2011	21,1*	23,3*	18,8*	17,3*	20,6*	22,3*	21,7	26*	22,7*	21*	14,7
Que tome uno o dos vasos de alcohol todos los días											
2003	29,2	35,3	23,2	22,5	28,4	31,7	32,7	33,2	28,8	29,8	28,9
2005	27,1	31,1	23,1	19,1	26	30,1	30,6	31,3	26,5	27,2	28,4
2007	30,4	33,9	27,1	23,7	29,2	32,5	34,1	33,4	30,7	30,6	29,2
2009	27,4	30,2	24,8	20,6	25,8	29,3	31,6	30,9	27,7	27,1	27,7
2011	32,3*	34,7*	29,8*	23,1*	32,4*	35,5*	35,3*	39,6*	31,7*	33,5*	26,2
Que se emborrache algunas veces											
2003	28,3	32,5	24,1	17,1	24,5	30,7	35,7	38,8	25,9	28,5	34,3
2005	27,7	29,7	25,8	15	23,6	31,3	35	37,7	25,5	27,8	34,1
2007	26,6	28,2	24,9	16,6	22,8	27,7	32,5	35,5	25,9	26,3	29,4
2009	21,8	23,3	20,6	14	18,5	23,5	26,5	28,6	21,2	21,7	24,2
2011**	26,4	28,2	24,5	18,3	24,6	28,3	30,2	35,7	26,1	26,3	28,1
Que pruebe marihuana una o dos veces											
2003	35,8	38,3	33,3	20,6	29,8	39,7	45,8	50,7	32,3	37	42,4
2005	36,9	36,8	37	18,9	29,6	42	47,6	52,7	32,4	38,6	44,8
2007	41,2	40,5	41,8	23,9	34,2	43,9	52,3	55,3	38	42,9	44,3
2009	40,9	40,2	41,8	24,8	34,7	43,1	50,8	55	38,1	41,8	45,5
2011	43,5*	41,4	45,4*	28,2*	38,1*	49,1*	53,3	57,8	39,9	44,9*	47
Que fume regularmente marihuana											
2003	21,7	26,4	17	13,9	18,7	23,9	26,3	29,6	21,6	22	21,3
2005	18,4	20,8	16	9,5	14,7	20,9	23,2	26,6	17,5	18,8	19,3
2007	24,8	26,8	22,8	14	20,7	26,4	31,4	33,7	24,4	25,6	22,9
2009	22,1	24	20,4	13,2	18,8	24	27,4	29,2	22,1	22,1	22,3
2011	28,2*	29,7*	26,6*	18,5*	24,4*	32,7*	33,6*	37,4*	28,3*	29,1*	20,7
Que pruebe cocaína o pasta base una o dos veces											
2003	15	19,2	11	11	14,1	16,4	17,1	18,4	15,5	14,7	14,4
2005	15,8	18,5	13,1	10,7	15,1	17,5	17,8	19	15,9	15,8	15,4
2007	15,6	18	13,3	12,1	15	16,4	17,4	17,7	16,2	15,4	14,7
2009	20,2	23	17,5	16	19,8	22	22,6	21	21,1	19,7	19,4
2011	20,7	23,3	18,1	17,2	20,6	22,5	20,9	24,7	21,9	20,6	17,3

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MARIHUANA: PROPORCIÓN QUE DECLARA MUCHO

Crees tú que la marihuana está relacionada con alguno de estos problemas? Mucho, Algo, Poco, Nada.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Accidentes de tránsito											
2009	45,6	44,2	47,2	50,9	46,8	44,3	42,9	42,1	46,3	45,5	43,9
2011	48,7*	46,1	51,2*	52,4	50,9*	45,2	45,4	48,3*	47,7	49,3*	47,1
Delitos violentos											
2009	56,7	56,3	57,4	59,4	57,7	56,4	54,5	54,7	56,1	57,4	55,6
2011	53,9	51,8	55,8	56,2	54,9	51,8	52,1	54	52,6	54,6	53
Problemas familiares											
2009	60	58,7	61,8	62,1	60,3	60	58,9	58,7	58,2	61,5	60,1
2011	57,8*	55,2*	60,2*	59*	58,3	55,5*	56,6	60	55,1*	58,8*	60,8
Problemas de salud											
2009	52,6	53,3	52,2	57,6	54,4	52,5	49,2	48	51	53,8	52,5
2011	55,3*	53,4	57,1*	58,6	57	52,5	51,9	56*	53,2*	56,3*	56,3*
Dificultades escolares											
2009	55,4	56,3	54,9	56,1	56	55,7	54,5	54,3	53,8	56,3	57
2011	54,7	52,8*	56,6*	56,4	55,8	52,2*	52,3	57,6*	52,3	55,4	59,3

° Porcentajes sobre muestra total

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL: PROPORCIÓN QUE DECLARA MUCHO

¿Crees tú que el alcohol está relacionado con alguno de estos problemas? Mucho, Algo, Poco, Nada

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Accidentes de tránsito											
2007	70,4	68,8	71,9	67,8	66,9	70,7	72,7	75,1	68,4	71,4	72,6
2009	74,6	73,3	76,2	72,8	71,8	74,5	76,1	78,7	72,1	76,1	76
2011	72,4*	69,6*	75,1	68,7*	71,4	72,2	75,6	76,2	67,5*	74*	79*
Delitos violentos											
2007	50,2	47	53,4	50,5	48,7	50,5	50,7	51,1	50,7	50,3	48,7
2009	51,9	50,4	53,8	52,6	51,5	51,7	51,5	52,4	51,7	52,2	51,7
2011	60,4	57,5	63,1	61,1	59,4	59	60,6	62,7	58,5	61,4	60,1
Problemas familiares											
2007	58,5	57,3	59,7	58,6	57,9	58,7	58,8	58,7	58	59,5	56,7
2009	59,2	59,4	59,4	59,8	58,6	60,1	58,4	59,1	57,8	60,5	58,6
2011**	65	63,2	66,8	64,3	63,7	63,5	67,1	67,8	61,1	66,8	66,1
Problemas de salud											
2007	45,6	46,4	44,8	49	45	44,6	45,1	44,2	45,7	45,8	44,5
2009	49,7	50,8	48,9	52,5	49,9	49,7	47,7	48,4	48,8	50,6	49
2011**	61,7	59,2	64,3	63,5	60,7	60,8	61,1	62,9	59,1	63	62,5
Dificultades escolares											
2007	35,5	36,3	34,7	38,5	37,1	34,8	33,7	32,7	36,6	35,2	33,5
2009	40,1	41	39,3	43	41,5	40,5	37,8	36,6	40,3	40,4	37,9
2011**	55	53,6	56,5	58,6	54,5	53,8	53,3	53,8	54	55,8	52,4

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior
** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

ACTITUDES BÁSICAS DE PREVENCIÓN RESPECTO DE LA MARIHUANA:

¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Las personas que fuman marihuana pueden dejar de hacerlo cuando quieran											
2003	45,4	49,8	41	39,9	45,1	47,6	47,6	48,4	48,2	44,8	39
2005	40,4	44,2	36,6	34,6	36,7	40,9	44,9	47,9	42,7	39,5	36,4
2007	45,4	49,2	41,7	40,7	44,5	45,8	48,1	49	47	45,5	40,4
2009	48	51,3	44,9	47,3	47,5	48,4	49	47,6	50,1	47,7	43,1
2011**	42,1	43,6	40,8	41	41,5	44,3	42,7	40,8	44,6	42,6	29,3
Probar marihuana una o dos veces no hace daño											
2003	33	35,3	30,7	22	28	35,9	40,5	44,6	31,9	32,7	36,7
2005	34,3	35,8	32,7	21,4	28,3	36,9	42,8	47	32,6	34,3	39,2
2007	40,9	42,5	39,2	27,4	35,2	42,6	49,9	52,4	39,6	41,3	43
2009	40	41,2	38,9	29,3	35,5	41,9	45,8	50	39,7	39,8	41,4
2011	43	44,3	42,1	33,2	40,3	46,8	49,1	51	42,7	42,9	45,4
La mayoría de los jóvenes fuma marihuana											
2003	40,7	38,5	42,9	36,1	37,6	41,9	44,7	46,2	42,6	39,9	37,2
2005	42,4	40,2	44,6	37,2	40,3	42,5	45,6	48,6	43,8	41,8	40,3
2007	52,2	50,2	54,1	45,4	49,6	53,5	56,3	57,3	53,5	52,2	48
2009	53,2	51,5	55,1	48,2	51,7	55,1	55,6	56,2	55,1	53,3	47,4
2011	50,8*	47,9*	53,8	46,7	50,3	53,8	53	51*	54,9	50,7*	35,9*
La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años											
2003	27	30,1	24	21,5	25	29,1	30,5	31,6	27,4	26,8	26,5
2005	27,8	30,2	25,4	21,2	24,9	29,4	32,4	33,5	27,9	27,9	27,1
2007	31,9	34,2	29,7	25,7	29,3	32,7	36,3	37,1	32,4	32,1	29,9
2009	32,2	34,4	30,1	27,2	30,9	33,5	35,2	35,2	33,9	31,4	30,6
2011**	35,2	37,4	33,4	30,5	35,3	38,9	36,8	34,9	36,7	35,3	28,6

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

FACILIDAD DE ACCESO: PROPORCIÓN QUE CONSIDERA FÁCIL CONSEGUIR Y QUE CONSEGUIRÍA MARIHUANA DENTRO DEL DÍA

¿Cuán difícil te sería conseguir alguna de las siguientes drogas? Me sería fácil, Me sería difícil, No podría conseguir, No sabe.
Si tú quisieras conseguir marihuana en este momento, ¿cuánto tiempo te demorarías en conseguirla? Menos de una hora, Algunas pocas horas, Dentro del día, Dentro de la semana, Más de una semana, No podría conseguirla, No sé cuánto tiempo me demoraría.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Marihuana											
2001	43,5	44,4	42,5	24,4	36,3	48,4	55,6	58,5	40,3	45,7	47,2
2003	44,3	45,6	43,0	26,3	37,2	49,3	57,1	60,8	41,9	45,8	47,6
2005	39,4	40,1	38,8	21,1	30,9	43,5	52,3	56,1	36,5	41,0	43,2
2007	39,6	40,5	38,8	20,7	33,1	43,9	49,9	54,3	37,5	40,9	41,6
2009	38,4	39,5	37,6	23,7	32,8	41,4	47,3	50,4	36,6	39,6	39,2
2011	38,7	39,8	37,9	23,4	36,4*	44,8*	47,4	48,2	37,6	40,0	33,8*
Cocaína											
2001	14,9	17,1	12,8	9,3	12,8	16,4	17,5	20,6	13,0	17,1	15,4
2003	18,6	20,5	16,7	12,7	16,8	20,1	22,0	24,5	17,6	20,5	17,0
2005	16,6	18,3	14,9	12,0	14,6	17,9	19,4	20,8	15,8	17,9	14,9
2007	16,9	19,2	14,6	11,0	15,9	18,3	18,5	21,6	16,3	18,0	14,9
2009	17,2	20,1	14,4	13,6	16,6	18,1	19,1	19,3	16,9	17,7	16,2
2011	12,8*	13,9*	11,8*	10,2*	12,2*	15,8	13,4*	12,5*	13,4*	13,1*	7,8*
Pasta base											
2001	16,5	19,0	14,0	10,3	14,6	18,0	19,4	22,0	15,4	18,3	15,3
2003	18,1	20,5	15,7	12,6	16,6	19,7	20,7	23,1	17,8	19,4	15,6
2005	16,3	18,5	14,1	11,9	14,2	17,4	19,2	20,2	16,4	17,1	13,4
2007	16,4	19,1	13,7	11,4	15,6	18,0	17,6	19,8	16,4	17,0	14,1
2009	16,9	19,7	14,1	13,3	16,5	18,1	18,7	18,6	17,2	17,1	15,7
2011**	10,8	11,7	10,0	8,5	10,4	13,9	10,9	10,7	11,6	11,2	5,3
Éxtasis											
2003	10,8	12,0	9,5	9,2	10,7	11,5	11,1	11,9	10,2	11,1	11,4
2005	11,3	12,5	10,1	9,2	11,0	12,2	12,9	11,6	10,8	11,9	11,3
2007	10,7	12,0	9,4	8,7	10,7	11,5	11,1	11,3	10,4	11,1	9,8
2009	11,8	13,8	9,8	10,7	12,5	12,7	11,7	11,3	12,4	11,5	11,3
2011**	5,3	5,5	5,1	4,7	5,8	6,1	4,7	4,9	5,4	5,5	3,3
Tiempo que demoraría en conseguir marihuana % que declara dentro del día o menos											
2001	42,8	45,9	39,7	26,7	37	46,8	52,7	55,4	42,7	44	40,4
2003	43,2	46,6	40	28,9	37,8	47,1	52,9	56,7	43,7	43,7	40,9
2005	39	41,3	36,6	24,3	32,7	42	48,6	52,7	39	39,7	36,4
2007	41,3	44	38,6	25,3	37	44,8	49	53	42	41,4	38,9
2009	41,3	43,9	38,8	28	37,2	44,3	49	50,6	42,8	40,8	38,5
2011**	33,8	35,4	32,4	20,2	31,5	39,3	41,4	42,3	35	34,7	22,3

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior
** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

OFRECIMIENTO ACTUAL DE DROGAS: PROPORCIÓN QUE DECLARA QUE LE OFRECIERON DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS
¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Marihuana											
2001	18,1	20,3	15,9	8,0	15,2	20,6	24,4	25,0	18,4	17,7	18,0
2003	17,2	19,3	15,2	8,5	14,2	20,1	22,8	24,5	17,8	16,5	17,5
2005	15,5	16,6	14,5	6,7	11,9	17,8	21,0	23,3	15,5	15,5	15,7
2007	20,0	21,2	18,8	8,5	17,1	22,6	26,4	27,1	20,1	20,1	19,5
2009	18,7	20,0	17,5	10,0	16,1	20,6	24,2	24,3	19,6	18,1	18,3
2011	16,4*	16,4*	16,5	9,2	13,7*	21,0	20,7*	20,2*	16,2*	17,2	11,2*
Cocaína											
2001	3,2	4,3	2,2	1,6	2,6	3,8	3,9	4,7	3,2	3,3	3,0
2003	4,9	6,4	3,5	3,2	4,6	5,3	5,8	6,6	5,2	4,9	4,2
2005	4,4	5,5	3,3	2,9	4,0	4,8	5,4	5,4	4,8	4,3	3,5
2007	5,6	7,0	4,3	3,6	5,8	5,6	6,5	6,8	6,2	5,4	4,9
2009	6,5	8,0	4,9	5,3	6,2	7,2	6,8	7,0	7,5	6,0	5,6
2011	4,6*	5,9*	3,5*	4,5	4,2*	5,4	4,1*	5,3*	5,4*	4,6*	2,2*
Pasta base											
2001	2,9	3,8	2,0	1,6	2,8	3,4	3,4	3,6	3,2	2,8	2,2
2003	4,2	5,5	2,9	2,8	4,2	4,6	4,7	5,0	4,7	4,0	3,2
2005	3,8	4,7	2,9	2,6	3,7	4,1	4,6	4,1	4,3	3,6	2,7
2007	4,9	6,0	3,8	3,6	5,3	4,9	5,2	5,3	5,5	4,5	4,3
2009	5,8	7,1	4,5	5,0	6,0	6,5	5,7	5,7	7,2	4,9	5,0
2011	3,8*	4,8*	3,0*	4,4	4,0*	4,0*	3,0*	3,3*	4,5*	3,8*	1,5*
Éxtasis											
2001	1,4	1,8	1,0	0,9	1,3	1,7	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3
2003	3,4	4,3	2,4	2,9	3,6	3,5	3,2	3,6	3,6	3,3	2,8
2005	3,2	3,9	2,6	2,4	3,4	3,5	3,6	3,3	3,6	3,1	2,6
2007	4,0	4,7	3,2	3,2	4,5	3,9	4,2	3,8	4,3	3,7	3,7
2009	5,1	6,1	4,0	4,6	5,4	5,7	5,0	4,5	6,2	4,4	4,4
2011	3,2*	3,9*	2,6*	3,8	3,3*	3,5*	2,1*	3,0*	3,9*	3,1*	1,6*

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

OFRECIMIENTO RECIENTE DE DROGAS: PROPORCIÓN QUE DECLARA QUE LE OFRECIERON DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Marihuana											
2001	31,0	33,3	28,7	14,6	26,1	34,7	41,4	42,7	30,1	31,1	32,8
2003	29,3	31,8	26,8	15,1	23,8	33,6	39,0	41,9	29,5	28,1	31,3
2005	26,5	27,8	25,3	11,9	20,8	30,0	35,8	39,4	25,7	26,4	29,2
2007	32,4	33,7	31,2	15,1	27,8	36,2	41,8	44,2	31,9	32,5	33,8
2009	30,7	32,1	29,4	17,1	26,5	34,0	39,0	39,5	31,2	30,2	31,1
2011**	25,6	25,8	25,5	14,6	22,7	31,0	32,6	31,3	24,7	26,2	23,8
Cocaína											
2001	7,2	9,0	5,4	3,3	5,9	7,9	9,4	10,6	7,0	7,4	7,1
2003	10,1	12,5	7,7	6,3	9,1	10,9	12,0	14,0	10,5	10,1	8,8
2005	9,5	11,6	7,5	5,7	8,6	10,2	11,9	12,4	10,5	9,1	7,9
2007	10,9	13,3	8,5	6,7	10,8	11,2	12,6	13,6	11,6	10,6	10,0
2009	11,7	14,1	9,4	8,6	11,5	13,1	13,0	12,7	13,6	10,8	9,9
2011	8,1*	9,8*	6,6*	7,2	7,9*	8,7*	8,0*	9,5*	9,4*	7,9*	5,2*
Pasta base											
2001	6,7	8,4	5,0	3,5	6,5	7,7	8,2	8,1	7,4	6,3	5,5
2003	8,1	10,3	5,9	5,7	7,9	8,9	9,1	9,8	9,2	7,6	6,4
2005	8,0	9,9	6,0	5,3	7,7	8,8	9,6	8,9	9,1	7,6	5,9
2007	9,0	11,1	6,9	6,4	9,5	9,2	9,8	10,0	10,1	8,3	8,0
2009	10,3	12,5	8,1	8,2	10,8	11,6	10,5	10,3	12,7	8,9	8,6
2011**	6,4	7,6	5,3	6,6	6,8	6,7	5,7	5,8	7,4	6,3	3,5
Éxtasis											
2001	1,4	1,8	1,0	0,9	1,3	1,7	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3
2003	3,4	4,3	2,4	2,9	3,6	3,5	3,2	3,6	3,6	3,3	2,8
2005	3,2	3,9	2,6	2,4	3,4	3,5	3,6	3,3	3,6	3,1	2,6
2007	4,0	4,7	3,2	3,2	4,5	3,9	4,2	3,8	4,3	3,7	3,7
2009	5,1	6,1	4,0	4,6	5,4	5,7	5,0	4,5	6,2	4,4	4,4
2011	3,2*	3,9*	2,6*	3,8	3,3*	3,5*	2,1*	3,0*	3,9*	3,1*	1,6*

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior
** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

LUGAR DE ÚLTIMO OFRECIMIENTO DE MARIHUANA: TODAS LAS CATEGORÍAS INCLUIDAS

Piensa en la última vez que te ofrecieron marihuana, ¿en qué lugar te la ofrecieron? Piensa solo en la última vez que alguien te ofreció marihuana

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
En la casa											
2001	4,2	4,8	3,5	4,9	4,8	3,9	4	3,6	4,1	4,4	4
2003	6,1	7,3	4,8	7,7	6,8	5,8	5,1	5,8	6,4	6,2	5,2
2005	6,5	7,6	5,3	8,5	7,2	6,4	5,8	6	7,1	6,4	5,4
2007	6,5	7,6	5,3	9,5	7,4	5,6	5,5	6,2	7	6,1	6,1
2009	10	11,4	8,5	16	12,2	10	8	7,1	12	8,8	8,4
2011	6,3	7,7	5	10,6	7	6,7	4,6	4,2	6,7	6,2	5,7
En los alrededores de la casa											
2001	30	32,6	26,9	39,3	33,1	30,4	26,1	24,1	30,4	32,3	23,7
2003	19,1	20,6	17,3	18,1	20,1	19,8	20	16,9	18,3	21,5	15,5
2005	18,1	19,2	16,8	23,2	19,2	18,9	16,8	15,4	18	19,6	14
2007	19,3	20,6	17,9	22,7	20,8	20,6	17,9	16,8	17,9	21,6	16
2009	19,3	20,8	17,9	21,8	19,1	19,9	20,1	16,7	16,7	22,1	16,9
2011	22,6	21,2	23,8	18,6	20,6	21	23,3	29,4	19,3	23,8	26,9
En el colegio											
2001	12,4	11,8	13,1	10,2	13,6	12,9	13,1	11,6	14,5	11	9,6
2003	12,7	12,9	12,4	9,5	14,2	13,8	12,4	12,4	15,9	10,4	9,5
2005	12,9	12,8	13	9,7	14,3	14,3	13,6	11,2	16,5	10,7	9,2
2007	14,1	14,3	14	11,1	15,9	16	14	12,2	18,2	11,3	11,8
2009	14,3	14,7	14	11,6	15,5	15,9	14	13,3	17,4	12,6	11,1
2011	13	13,9	11,7	12,5	14,9	13,5	10,1	14,5	16,6	11,8	7,3
En los alrededores del colegio											
2001	10	9,9	10,1	10,2	10,7	10,6	9,8	8,7	11,7	8,8	7,9
2003	11,5	11,7	11,3	11,9	12,4	12,7	10,4	10,2	13,2	10,6	9,1
2005	11,4	11,6	11,2	12	12,2	12,1	11,3	9,8	13,8	10,1	8,3
2007	12,3	12,6	12	12,2	13,9	13,1	12,3	10,3	14,6	11,1	10
2009	12,1	12,2	12,1	11,9	13,2	12,8	11,9	10,5	13,2	11,4	11,1
2011	9,5	9	9,9	8,8	10,1	9,9	10,3	7,7	10,7	9,3	6,5
En una fiesta, junta, disco, recitales											
2001	43,4	40,8	46,5	35,4	37,8	42,2	47	52,1	39,2	43,4	54,8
2003	37,5	35,3	39,9	29,3	29,9	36,6	43,6	45,3	32,9	38,4	47,5
2005	43,7	41	46,7	32,1	37,4	41,5	47,3	52,7	36,3	46,2	57,2
2007	41,9	38,8	45,3	33,5	34,8	40	45,6	50,3	35,6	44,8	50,9
2009	37,3	34,2	41,2	27,8	31,2	35,5	40	46,6	32,1	39,7	44,3
2011	37,8	38,1	38,1	32	34,8	38,3	42,6	38,2	34,1	39	44,1
Por Internet, mail o chateando											
2003	1,8	1,8	1,9	3,5	2,3	1,7	1	1,2	1,6	2,1	1,7
2005	2,1	2,1	2,1	3,8	2,8	2,1	1,6	1,3	1,9	2,2	2,4
2007	2	1,9	2,2	4,9	2,6	1,6	1,5	1,2	2	2,1	2,1
2009	2,1	2,1	2,2	3,2	2,2	2,4	2,1	1,3	1,7	2,4	2,5
2011	3,1	2,2	3,8	3,8	3,5	2,7	3,4	2,2	2,5	3,4	3,2

° Porcentajes sobre quienes declararon que alguna vez le han ofrecido marihuana. En cuestionario 2001 se pregunta por último ofrecimiento de cualquier droga. En cuestionario 2011 se añade categoría "En la casa de un amigo", la cual no se presenta en esta tabla comparativa

° Por el cambio de categorías en el cuestionario 2011, no se realizará análisis de significancia estadística respecto al estudio anterior

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

CONTACTO DE ÚLTIMO OFRECIMIENTO DE MARIHUANA: TODAS LAS CATEGORÍAS INCLUIDAS

Y esa última vez que te ofrecieron marihuana, ¿quién te la ofreció?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Algún familiar											
2001	3,3	3,5	3	4,9	3,8	3,2	2,3	3	3,2	3,4	3,1
2003	4,4	5,1	3,5	6,2	4,8	4,2	3,3	3,9	4,8	4,2	3,7
2005	4,7	5,1	4,3	6,5	5,2	4,9	4,1	4	5,1	4,5	4,2
2007	5,4	5,9	4,8	8,6	6,3	4,8	4,2	4,9	6	4,8	5,8
2009	8,6	9,7	7,3	14,8	10,4	8,3	6,9	5,6	10,1	7,6	7,3
2011	6,5*	7*	6,1	11,6	8,9	5*	4,6*	4,4*	6*	6,9	5,4*
Algún amigo											
2001	34,7	34	35,7	32,1	33,9	35	36	35,6	34,6	34,4	35,9
2003	32,3	31,6	33,1	27,2	30,6	32,8	33,7	35,8	30,9	32,5	35,9
2005	34,6	34,3	35	28,2	30,8	34,7	36,8	38,5	33,7	34,6	37,3
2007	41,9	41,7	42,1	31,6	39,1	41,6	44,8	46,5	40,1	42,4	45,6
2009	41,5	40,6	43	33,8	37,3	43,2	43,5	45,6	38,9	42,8	44,7
2011**	50,2	48,9	51,5	40,8	46,7	51,1	53,6	55,8	48,3	50,9	52,6
Alguien que conoces pero no es tu amigo											
2001	41,6	39,8	43,9	33	39,1	42,4	44,8	45,6	41,5	42,5	40,1
2003	39,9	37,9	42,4	31,8	37,6	41,7	43,6	42,7	40,2	40,9	37
2005	38,3	35,8	41	30,4	37,2	38,8	40	40,5	38,1	39,1	36,4
2007	36	33,9	38,3	32,5	35,1	38,1	36,8	35,4	36	36,9	32,7
2009	33,4	31,8	35,8	28,5	33,1	33,6	34,5	35,2	32,7	34,9	30,7
2011**	26,9	25,1	28,7	21,1	25,7	31,1	28,2	25,1	25,3	28,1	24,3
Alguien que tú no conoces											
2001	20,3	22,8	17,4	30	23,2	19,4	17	15,8	20,7	19,7	20,9
2003	23,4	25,4	21	34,9	26,9	21,3	19,3	17,7	24,2	22,4	23,4
2005	15,4	17,1	13,4	21	17	15,5	14,1	12,3	14,5	15,5	17,5
2007	13,5	14,8	12,1	20,3	15,5	12,7	12	11	13,7	13,2	13,6
2009	10,9	12,6	9,2	14	11,7	10,6	11	8,8	10,3	11,2	11,4
2011	9,8	11,8	8	12,4	11,7	7,5	8,7*	10,6	10,7	9,1*	12,4

° Porcentajes sobre quienes declararon que alguna vez le han ofrecido marihuana. En cuestionario 2001 se pregunta por último ofrecimiento de cualquier droga

PERCEPCIÓN DE USO, PORTE Y TRÁFICO DE DROGAS EN EL COLEGIO: PROPORCIÓN QUE RESPONDE AFIRMATIVAMENTE

¿En general, tú consideras que en tu colegio (o en los alrededores de tu colegio) hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos?

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Dentro del colegio											
2001	37,6	40,2	35,1	18,6	34,4	43,0	47,0	50,0	44,9	31,1	32,3
2003	35,3	37,8	32,7	17,1	35,7	40,6	42,9	45,1	43,8	27,7	30,0
2005	29,1	31,0	27,1	12,2	27,5	34,6	37,3	37,0	37,1	23,1	23,7
2007	42,4	45,2	39,6	20,7	39,9	48,3	51,0	54,5	50,7	36,6	38,0
2009	39,2	41,0	37,5	21,3	37,4	43,2	46,1	50,5	48,2	33,2	35,6
2011	37,7	38,0*	37,2	20,5	39,3	41,8	44,9	48,9	44,8*	36,1*	21,8*
En los alrededores del colegio											
2001	47,0	47,6	46,3	32,1	43,8	51,3	55,8	55,5	50,7	44,0	43,3
2003	47,5	47,8	47,2	32,3	46,6	52,2	54,9	56,5	52,1	43,6	44,4
2005	40,2	40,6	39,8	24,3	36,6	45,6	50,1	48,3	44,3	37,0	38,0
2007	52,2	53,3	51,2	34,3	50,0	57,2	59,3	62,3	55,6	50,4	48,9
2009	48,6	48,6	48,9	33,2	45,9	52,4	55,6	58,5	52,4	46,1	47,0
2011	50,9*	49,7	51,8*	31,5	51,6*	56,4*	59,2*	64,1*	52,9	51,2*	41,7*

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

USO DE ALCOHOL Y MARIHUANA EN AMIGOS: PROPORCION QUE DECLARA ALGUNO

¿Cuántos de tus amigos toman alcohol regularmente? ¿Cuántos de tus amigos fuman regularmente marihuana? Ninguno, Menos de la mitad, La mitad, Más de la mitad, Todos o casi todos, No sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Alcohol											
2001	76,4	78,1	74,7	61	73,8	80,4	85,1	85,5	74,6	76,5	81,1
2003	70,2	72,4	68,1	51,5	66,3	75,8	81,1	83,9	67,1	70,6	77,9
2005	66,7	68,2	65,3	43	61,3	73,3	79,5	83,1	63,1	67,1	76,4
2007	74	75,4	72,7	52,8	68,5	79,3	85,5	87,4	71,6	74,3	80,4
2009	74,8	76	74	53,8	70,2	81	84,7	87,8	72,7	74,7	80,9
2011**	66,1	65,3	67	45,9	64,3	71,3	77,5	80,8	62,8	66,4	76,8
Marihuana											
2001	47,3	48,9	45,7	36,8	45	49,5	54,1	53,7	48,8	47,1	43,7
2003	39,8	41,7	37,9	27,7	35,7	43,2	48,2	50,2	40,7	38,8	39,9
2005	37,3	38,7	35,9	23,1	31,7	40,1	46,4	50	37,8	36,3	38,7
2007	46,6	48,9	44,4	30,1	41,5	49,5	56,7	58,5	47,1	46,3	46,1
2009	47,8	50,1	45,8	32,8	43,6	52,1	55,5	57,8	49,1	46,6	48,2
2011	42,2*	43,1*	41,3*	28,2*	40,5	47,3*	49,4*	51,4*	44,2*	42,1*	34,4*

° Porcentajes sobre muestra total (la categoría "No sabe" aparece como "Alguno" en el cuadro)

DROGAS EN EL HOGAR: PROPORCIÕN QUE DECLARA CREENCIA RESPECTO A QUE PADRES CONSUMIERON DROGA CUANDO JÕVENES Y PROPORCIÕN QUE DECLARA HÃBITO DE CONSUMO DE ALCOHOL DIARIO DE PADRE Y MADRE

Pensando en tus padres, ¿crees tú que alguno de ellos consumió alguna droga cuando eran jóvenes? ¿Cómo describirías el hábito que tiene tu padre (madre) respecto del alcohol (vino, cerveza o licor)? Nunca toma alcohol; Solo en ocasiones especiales; Solo en fines de semana, pero nunca en día de semana; Toma alcohol diariamente, uno dos tragos; Toma alcohol diariamente, más de dos tragos; No se aplica, no tiene padre (madre) vivo o no lo ve nunca.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Drogas en los padres cuando eran jóvenes											
2003	21,4	20,4	22,4	16,9	19,5	22,8	24,9	25,3	19,6	22,4	24,1
2005	21,6	20,4	22,7	15,8	17,8	23	26,9	26,7	19,8	22,2	24,8
2007	24,1	23	25,1	16,4	21,2	25,7	29,1	29,6	22,2	25	26,6
2009	25,3	24,6	26,2	18,2	23	26,4	30	30,4	24,3	25,7	26,7
2011**	30,7	30,2	31,4	23,7	29,5	32,7	35,3	35,3	28,7	31,4	33
Hábito alcohol padre: Alcohol diario											
2005	6,5	6,3	6,6	4,9	6,1	6,6	7,4	7,8	5,6	5,8	10,7
2007	7,6	7	8,3	6,7	7,5	7,3	8,4	8,5	6,8	7	12,2
2009	7,3	7	7,6	6,4	6,6	7,5	7,7	8,4	6,8	7	9,3
2011	6,8	6,5	7,2	5,4	7,4	7,4	7,3	6,9	6,3	6,4	12,3*
Hábito alcohol madre: Alcohol diario											
2005	1,5	1,7	1,4	1,2	1,5	1,4	1,8	1,8	1,1	1,2	3,8
2007	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,9	2,3	1,9	1,4	1,4	4,5
2009	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,9	1,5	1,5	1,5	1,3	2,9
2011	2,7*	3,1*	2,3*	2,2*	2,7*	2,5	3*	3,5*	3*	2*	6,6*

° Porcentajes sobre muestra total. En 2001 se preguntó por separado para "Marihuana", "Pasta base", "Cocaína" y "Otras drogas" respecto a pregunta de consumo de drogas cuando padres eran jóvenes

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

ACTITUD PARENTAL FRENTE AL USO DE DROGAS: PROPORCIÓN QUE DECLARA QUE SUS PADRES ESTARÍAN EXTREMADAMENTE MOLESTOS

¿Si tu papá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? ¿Si tu mamá te sorprende llegando a la casa con unos tragos de más, ¿tu crees que estaría? Y si tu papá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Y si tu mamá descubriera que fumas marihuana, ¿tu crees que estaría? Extremadamente molestos, Bastante molestos, Algo molestos, Poco molestos, No sabe cómo reaccionarían, No se aplica

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Madre alcohol											
2001	41,3	39,6	42,9	50,3	44,5	40,4	36,6	31,5	43,8	40,9	35,5
2003	41,6	39,8	43,4	48,4	44,8	40,7	37,7	32,5	43,5	42,1	35,4
2005	44,2	43,1	45,3	51,3	49,4	43,7	39	33,4	46,4	44,6	36,4
2007	46,2	44,1	48,3	57,5	51	46	39,9	33,5	48,8	46,2	38,6
2009	50,1	48,3	52,1	61,6	55,6	49,1	44,4	36,1	51,6	50,3	45
2011**	61,2	57,5	64,4	71,7	66,1	59,5	54,3	48	60,6	62,8	52,3
Padre alcohol											
2001	33,1	28,3	37,9	42,2	36,4	32,3	27,5	23,1	36,1	32,2	27,3
2003	34,3	29,4	39,3	42,4	36,9	32,4	30,7	24,6	36,8	34,2	27,9
2005	37,4	33,6	41,4	45,2	42,7	35,7	32,4	26,8	40,3	37,3	29,9
2007	40,7	35,5	46	51	45,9	40,1	34,1	28,8	44,1	40,3	32,8
2009	44,2	39	49,7	56	50	42,8	38	29,9	46,9	43,6	38,4
2011**	56,5	51,2	61,1	68,1	61,3	53,8	48,5	44,1	56,7	57,6	48,3
Madre marihuana											
2001	72,3	73,1	71,6	73,6	72,7	73	71,5	70,4	73	72,6	70,1
2003	71,1	71,9	70,3	72,1	70,7	71,3	71,5	69,9	71	72,3	68,7
2005	73,2	74,2	72,1	75,4	75,1	72,9	71,5	69,6	74	73,8	68,8
2007	75,7	75	76,4	79,8	77,2	76,5	73,1	70,7	76,4	75,9	73,2
2009	77,7	77,3	78,6	80,9	79	78,1	76,2	73,2	76,8	78,5	77,3
2011	80,4*	77,2	83,3*	83,2*	81,2	79,8	78,7	77,8*	76,6	82,1*	82,2*
Padre marihuana											
2001	70	70,3	69,6	72,1	71,2	70,2	68,3	66,8	71	69,9	67,5
2003	69,7	70,1	69,2	71,7	70,1	69,2	69,2	67,2	70,1	70,4	66,8
2005	70,8	71,9	69,7	74,1	73,1	70	68,6	66,3	72,2	70,9	66,6
2007	73,1	72	74,2	77,2	74,8	74,2	70,4	67,3	74,2	73	70,6
2009	74,4	74	75,4	78,9	76	74,6	72,4	68,7	73,9	75,1	73,4
2011	77,3*	74	80,3*	80,9	79,2*	76	74,8	73,8*	73,4	78,9*	80,3*

° Porcentajes sobre muestra total, excluyendo "No se aplica" (no tiene padre o madre o no los ve nunca).

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

Anexo I: Cuadros Estadísticos con Información Complementaria

Evolución de los Factores de Riesgo y Protección Asociados con el Uso de Drogas

EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN ASOCIADOS CON EL USO DE DROGAS

Expectativas educacionales
Deporte
Agresión y victimización escolar
Residencia familiar
Indicadores de involucramiento parental
Identificación y hábito religioso

EXPECTATIVAS EDUCACIONALES: PROPORCIÓN QUE DECLARA MUY PROBABLE (SEGURO) TERMINAR LA ENSEÑANZA MEDIA Y ENTRAR A LA UNIVERSIDAD (ENPE 2011: SEGUIR ESTUDIANDO DESPUÉS DEL COLEGIO)

¿Cuán probable crees tú que termines Cuarto medio? ¿Cuán probable crees tú que entres a la universidad? Es seguro, Muy probable, Más o menos, Poco probable, Imposible, No sabe.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Terminar la enseñanza media											
2003	75,7	73,2	78,1	71,2	71	78,9	81,7	78,4	70,4	78	84,5
2005	77,2	74	80,4	69,1	74,7	79,6	82,6	82,6	72	79,4	85,9
2007	77,1	73,6	80,5	71,6	72,5	80	83,2	79,3	73,2	78,5	83,6
2009	78,5	75	82,5	74	74,1	80,8	83,3	82,1	75,3	79,6	83,9
2011	86,5	84,3	88,8	82,6	84,9	88,9	89,9	87,7	82,4	87,9	92,7
Entrar a la universidad											
2003	31,2	29,3	33	38,8	32,5	32	30,3	18,3	23,8	32,6	48,2
2005	30,5	27,7	33,4	32,9	32,8	31,7	28,9	24,3	22,7	31,8	49,3
2007	37,8	34	41,7	43,2	37,7	39	38,5	29,4	29,7	40,2	53,7
2009	41	37,1	45,1	44,6	42	41,9	41,1	34	33,5	43,4	53,4
2011	75,9	71,4	80,1	75,5	73,3	75,5	78,5	77,9	67,1	78,3	92,3

° Porcentajes sobre muestra total

° En 2011 se agregó la alternativa "Es seguro", por lo que el indicador para ese año no es comparable respecto a la tendencia

DEPORTE: PROPORCIÓN QUE DECLARA 5 O MÁS DÍAS EN ÚLTIMA SEMANA

Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos días hiciste algún ejercicio o actividad física, fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos que te hayan hecho transpirar o respirar fuertemente tales como fútbol, tenis, rugby, natación, danza, etc.

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
2003	20,3	27,5	13,3	25	21,1	20,2	18,4	14,7	21,4	19,7	18,8
2005	17,6	24,6	10,7	23,2	18	17	14,7	13,7	18,6	17,3	15,8
2007	18,6	25,9	11,4	24,9	19,9	17,6	15,6	14,1	18,6	18,6	18,6
2009	18,6	26	11,3	23,1	19,7	18,3	17	13,4	18,8	18,5	18,1
2011	17,5*	23,6*	11,8	19,7*	18,1	17,2	16,8	13,7	16,8*	17,4	20,6*

° Porcentajes sobre muestra total

AGRESIÓN ESCOLAR: PROPORCIÓN QUE DECLARA ALGUNA VEZ EN EL ÚLTIMO AÑO

Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido has hecho alguna de estas cosas en el colegio? (Nunca, 1 vez, 2 veces, 3-4 veces, 5 o más veces)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Participado en un grupo que molesta a un compañero que está solo											
2003	42,8	52,2	33,4	41,3	43,2	44,4	42,7	41,9	39,9	44,5	46,4
2005	46,1	57	35,2	48,2	44,6	46,9	45,5	45,2	44,1	47	48,9
2007	49,8	61,4	38,5	53,4	50,8	49,9	47,5	46,7	47,2	52,1	49,3
2009	46,7	57,6	36,2	51,3	45,8	48	44	44,2	45,1	48,3	45,8
2011**	31,4	36,9	26,2	28,3	34	32,8	29	33,6	29,4	32,8	28,3
Participado en un grupo que ha agredido físicamente a un compañero que está solo											
2003	12,4	18,6	6,4	14,5	13,3	12,4	10,6	10,3	13,1	12,1	11,6
2005	13,8	20	7,6	18,4	13,5	13,3	11,8	11,1	15,6	12,8	11,7
2007	15,1	23,1	7,3	19,2	16,1	14,9	12,7	12,1	15,6	15,1	14,2
2009	14,2	21	7,5	18	13,9	14,6	12,5	11,6	15,1	13,9	12,6
2011	12*	16,5*	7,8	14,5*	11,8*	11,5*	10,7*	11,1	14,6	11,3*	7,3*
Participado en un grupo que ha comenzado una pelea con otro grupo											
2003	18,8	21	16,6	21,7	19,1	18,8	16,8	16,4	18,6	19,5	17,5
2005	22	24,4	19,7	28	21,2	21,7	19,4	18,7	23,6	21,4	19,2
2007	24	26,5	21,7	29,4	24,3	23,9	20,7	21,4	24,2	24,8	20,9
2009	24,8	27,6	22,2	29,1	24,9	25,2	22,8	21,5	25,6	24,9	22,5
2011**	18,6	21,7	15,7	18,9	20,6	18,9	16,8	16,5	20,5	18,3	13,5
Comenzado solo una pelea con otro compañero											
2003	25,1	31	19,2	29,4	26,6	25,5	21,6	19,6	24,5	25,7	25,2
2005	29,4	36,3	22,6	38,9	29,5	28,3	24,9	23,4	30,2	28,8	29
2007	31,5	39,6	23,4	39,7	34	30,3	25,9	25,9	31,3	31,8	30,7
2009	31,3	39,1	23,7	39,9	31,9	31,1	27	25,1	30,9	32	29,9
2011**	21,8	26,1	17,8	23	24,7	22,1	18,8	18,2	21,9	21,9	19,9
Has robado algo a alguien en el colegio											
2003	13,5	17,4	9,6	15,8	13,8	13,7	11,8	11,4	14,1	13,1	12,9
2005	13,4	17,5	9,3	17,3	12,8	12,5	12,3	11,7	15,4	12,2	11,3
2007	11,5	14,7	8,3	14,5	11,4	11,4	9,7	10	11,8	11,1	11,8
2009	11,3	14,4	8,3	13,2	11,2	11,9	10,4	9,7	12	11,1	10,4
2011**	10,5	13,3	7,8	11,8	12	9,2	9,6	8,9	12,6	9,7	8

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

VICTIMIZACIÓN ESCOLAR: PROPORCIÓN QUE DECLARA ALGUNA VEZ EN EL ÚLTIMO AÑO

Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te han sucedido alguna de estas cosas en el colegio? (Nunca, 1 vez, 2 veces, 3-4 veces, 5 o más veces)

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subv.	Pagado
Has sido molestado, estando solo, por un grupo del colegio											
2003	33,2	38,4	28,1	35,8	34,9	33,1	30,8	29,5	34,3	33,4	29,8
2005	36	41,8	30,2	42,2	35,2	36,1	34	31,2	38	35,6	31,5
2007	33,9	39,2	28,6	38,3	34,9	33,6	30,8	30,9	35	34,2	29,3
2009	29,9	35,1	24,8	36,1	30	29,2	26,7	26,6	30,6	29,9	27,7
2011**	21,4	24,4	18,5	22,8	22,7	20,7	19,4	20,3	22,8	21,3	16,6
Has sido físicamente agredido, estando solo, por un grupo del colegio											
2003	9,1	13,2	5,1	11,5	10,2	8,7	7	7	10,6	8,2	7,4
2005	10,2	14,5	6	14,2	10,7	9,3	8,5	7,6	12,3	9,3	7,2
2007	9,3	13,2	5,4	13,1	9,8	8,2	7,5	7,4	10,5	8,4	8,5
2009	8,7	12,2	5,4	12,1	9,1	8,1	7	6,9	10,2	8	7,2
2011	10,2*	13,5*	6,9*	12,6	10,2	9,5	8,5	9,3*	13,4*	9,1*	5,5*
Has estado en un grupo que ha sido atacado por otro grupo											
2003	18,3	18,6	18,1	20,8	18,5	18,7	16,3	16,1	19,2	18,7	14,9
2005	20,3	20,6	20	25	19,4	20	19	17,3	22,7	19,5	15,8
2007	20,9	21,1	20,7	23,8	21,7	21	18,7	18,9	22,2	21	16,6
2009	20,4	20,3	20,6	23	20,5	20,7	19,2	18,4	21,7	20,5	16,6
2011**	14,8	15,9	13,5	15,6	15,3	15,3	13,3	13,7	17,9	13,9	9,4
Alguien, solo, ha comenzado una pelea contigo											
2003	26,3	31,1	21,5	32,5	28,4	26,3	21,6	18,9	27	26,5	23,6
2005	32,1	37,8	26,4	42,6	31,8	30,7	27,7	25,4	34,1	31,7	27,8
2007	31,5	37,3	25,8	40,4	33,9	30,3	26,3	24,8	32,2	31,8	28,1
2009	30,6	36,2	25,2	39,4	31,8	29,3	27	24	31,4	30,9	27,4
2011**	21,1	23,5	18,8	22,7	22,8	22,1	17,9	18,6	22,7	21	16,1
Te han robado algo en el colegio											
2003	46,6	43,2	50	51,7	47,7	47,1	43,2	40,7	47,6	47,1	42,6
2005	50,2	48,3	52,2	58,1	48,5	50	47,6	45,8	52	49,8	46,4
2007	50,4	47,2	53,5	57,7	50,5	48,9	46,5	47,8	49,4	51,4	49,8
2009	47,1	43,1	51,4	53,7	45,6	47,8	44,4	43,5	47,3	47,7	44,4
2011**	33	29,7	35,9	32,3	37,2	32,8	29,7	31,9	33	33,3	30,8

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

ESTRUCTURA FAMILIAR, ¿CON QUIÉN VIVE? TODAS LAS CATEGORÍAS INCLUIDAS

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subv.	Pagado
Padre y madre											
2001	68,1	68,8	67,4	68,5	68,4	68,4	67,9	66,9	64,5	70,3	72,7
2003	67,7	68,3	67,1	66,8	67,4	67,9	69	68,1	64,2	69,8	72,4
2005	66,8	67,7	65,9	65,9	67,2	67,2	67,1	66,5	63	68,8	71,5
2007	66,8	67,9	65,6	67,4	66,1	67,1	66,4	66,8	64,2	67,9	70,2
2009	64,2	65,4	63,2	65	62,9	63,8	64,9	64,6	60,9	65,9	67,2
2011	58,3*	58,8*	58*	57,4*	58,9*	57,3*	59,5*	58,8*	52,2*	60*	69,6
Padre y su pareja											
2001	1,2	1,4	1,0	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
2003	1,3	1,5	1,2	1,5	1,4	1,4	1,1	1,2	1,6	1,2	1,0
2005	1,3	1,5	1,1	1,4	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,2	1,1
2007	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,3
2009	1,4	1,6	1,2	1,4	1,6	1,3	1,1	1,2	1,5	1,2	1,4
2011	1,9*	2,1*	1,7*	2,2*	2	1,9	1,5	1,5	2,3*	1,7*	1,2
Madre y su pareja											
2001	7,4	7	7,7	8	7,9	7	6,9	6,7	8,4	6,6	6,1
2003	6,2	5,6	6,8	7,1	6,3	6,1	5,6	5,5	7,2	5,5	5,2
2005	7,2	6,9	7,5	8,1	7,9	6,6	6,7	6,2	8,2	6,7	5,7
2007	7,1	6,7	7,5	7,9	7,6	7	7	5,9	7,8	6,8	6
2009	7,5	7	8,1	8,4	7,7	7,9	6,9	6,3	8,3	7,2	6,4
2011	7,9	7,3	8,4	7,8	9,1	7,6	7,7	6,3	9	7,7	5,1*
Solo con el padre											
2001	2,1	2,3	1,8	1,9	2,3	2	1,9	2,2	2,2	2	1,7
2003	2,4	2,8	2	2,2	2,6	2,3	2,5	2,4	2,7	2,2	2
2005	2,6	2,9	2,4	2,7	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	2,5	2,3
2007	2,4	2,6	2,1	2,2	2,3	2,4	2,7	2,4	2,6	2,3	2,1
2009	2,6	2,9	2,4	2,5	2,7	2,9	2,7	2,3	2,9	2,5	1,9
2011	3*	3,4*	2,6	2,8	2,8	3,3	3,2	3	3,7*	2,8	1,9
Solo con la madre											
2001	15,6	14,8	16,3	15	14,5	16	15,7	17,1	16,2	15	14,9
2003	16,4	15,9	17	16,6	15,9	16,9	16,4	16,5	16,8	16,3	15,8
2005	17,6	16,8	18,3	17,8	17,1	17,8	17,4	17,7	18,5	16,9	16,9
2007	18,5	17,3	19,6	17,9	18,7	18,4	18,3	18,9	18,8	18,4	17,7
2009	19,6	18,9	20,5	19,1	20,2	19,1	19,8	19,8	20,3	19,1	19,3
2011	17,5*	15,8*	18,9*	15,6*	16,9*	18,6	18,3	18,9	17,5*	17,6*	15,8*
Con ninguno de los dos											
2001	4,8	4,6	5	4,2	4,7	4,8	5,3	5,3	6,3	4	2,7
2003	4,6	4,3	4,8	4,2	4,4	4,4	4,7	5,5	5,9	3,9	2,5
2005	4,5	4,3	4,7	4	4,1	4,5	4,8	5,4	5,8	4	2,5
2007	3,9	3,9	4	3,2	3,9	3,9	4,2	4,7	5,1	3,4	2,4
2009	4,3	4	4,5	3,3	4,1	4,5	4,4	5,1	5,5	3,6	3,1
2011	7,5*	7,9*	7,1*	9*	7*	7*	6,6*	7,5*	9,8*	6,8*	3,6
Solo con padre o madre											
2001	17,6	17,2	18,1	16,9	16,8	18	17,6	19,3	18,5	17,1	16,5
2003	18,8	18,7	18,9	18,8	18,6	19,2	18,8	18,9	19,5	18,5	17,8
2005	20,2	19,7	20,7	20,5	19,5	20,4	20,1	20,5	21,4	19,3	19,2
2007	20,8	20	21,7	20,1	21	20,8	21	21,4	21,3	20,7	19,9
2009	22,2	21,8	22,9	21,6	22,9	22	22,4	22,1	23,3	21,7	21,3
2011	20,5*	19,3*	21,5*	18,4*	19,7*	21,9	21,5	21,9	21,2*	20,4	17,7*
Con padre o madre y otra pareja											
2001	8,5	8,4	8,7	9,3	9,1	8,1	8,2	7,8	9,7	7,8	7,2
2003	7,6	7,1	8	8,6	7,8	7,5	6,7	6,8	8,8	6,7	6,2
2005	8,5	8,4	8,6	9,6	9,1	7,9	8	7,6	9,8	7,9	6,8
2007	8,3	8	8,6	9,1	8,8	8,1	8,2	7,1	9,1	7,9	7,3
2009	8,9	8,6	9,2	9,8	9,4	9,3	8	7,6	9,8	8,4	7,8
2011	9,7*	9,4*	10,1	10	11,1	9,6	9,2	7,8	11,3*	9,4*	6,4*

° Porcentajes sobre muestra total.

° En 2011 se incorporaron categorías: "Solo con hermana(s) o hermano(s)" "Solo con abuelo(s) o Abuela(s)" "Otro adulto responsable". Estas categorías para análisis comparativo se incluyeron en opción "Con ninguno de los dos"

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

INVOLUCRAMIENTO PARENTAL: INDICADORES SELECCIONADOS

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Después que sales del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu padre o tu madre no saben dónde estás? Digamos por un período de una hora o más											
2001	72,4	64,7	79,9	76,4	75	71,7	68,9	68,3	72,5	72,4	71,8
2003	72	64,4	79,5	76,1	72,5	71,1	70,4	68,1	71,7	72,3	71,9
2005	69,5	62,2	76,7	73	70,9	68,6	67,1	66,8	69,1	69,5	70,5
2007	68,3	61,6	74,9	72,7	69,1	66,5	66,6	66,2	67,2	69,1	69
2009	69	62,8	75,6	73,8	69,4	67,8	66,6	67	67,5	70	69,8
2011	71,5*	66,6*	76,5	74,9	73,8*	69,5	68,3	69,2	71,4*	71,2	74,2*
¿Cuán atentos están tus padres (o alguno de ellos) respecto de lo que haces en el colegio?											
2001	83	84,8	81,3	85,7	86	82,4	80,5	79,1	82,2	83,2	84,9
2003	81,7	83,2	80,3	84,8	83,1	81,6	79,6	77,6	81	82,1	82,8
2005	83,9	85,2	82,6	86,9	86	83,6	81,2	80,2	82,9	84,2	86
2007	82,8	84,4	81,2	86,4	84,5	81,8	81,4	79,1	81,9	83	85
2009	83,3	84,4	82,8	86,9	85,2	82,7	81,7	79	82,2	83,6	85,5
2011	80,5*	81,5*	79,8*	84*	81,4*	80*	77,8*	77,4	80,1*	80,1*	84,7
En general, ¿tu dirías que tus padres (o alguno de ellos) conocen bastante, más o menos o poco a tus amigos más cercanos?											
2001	32,2	32,8	31,7	34,4	30,7	31	31,5	33,9	29,8	32,4	38,5
2003	40,2	40,3	40,2	41,6	38,6	38,9	41,1	41,7	37,5	40,4	47,4
2005	40,3	39,6	41,1	40,9	38,1	39,2	40,9	43,8	36,4	41,3	48,7
2007	39,1	38	40,2	40,7	36,8	38,2	39,7	41,1	35,3	39,7	48,4
2009	39,4	37,8	41,2	40,6	37,4	37,9	40	41,4	36,1	39,8	46,8
2011**	43,6	42,5	44,8	47,7	40,8	41,7	43,1	45,5	41,1	43,1	57,4

° Porcentajes sobre muestra total
- % que declara "Siempre o casi siempre saben donde estoy" (demás categorías: "A veces no saben", "Nunca saben").
- % que declara Mucho/bastante (demás categorías: Poco/Nada).
- % que declara Bastante (demás categoría: Más o menos/Poco), En 2001 las categorías fueron "Bastante"/"A unos sí y a otros no"/"Poco", lo que afecta la comparación

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior
** Variación estadísticamente significativa en todos los niveles en relación al estudio anterior

IDENTIFICACIÓN Y HÁBITO RELIGIOSO: TODAS LAS CATEGORÍAS EN RELIGIÓN, EN HÁBITO RELIGIOSO PROPORCIÓN QUE DECLARA IR A MISA O SERVICIO RELIGIOSO, AL MENOS, UNA VEZ A LA SEMANA

	Total	Hombre	Mujer	Octavo	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Municipal	Subvencionado	Pagado
Católica											
2001	61,3	59	63,5	63	62,4	61,1	59,7	59,4	57,1	65,4	63,3
2003	58,4	55,6	61,2	61,7	58,4	58,6	56,9	55,4	54,1	62,1	61,7
2005	53,9	50,5	57,2	55,1	55,6	55	51,4	51,2	50,4	56,6	56,1
2007	54,4	50,8	58	57,8	55,1	54,6	52,8	51,3	49,5	57,7	57,7
2009	52,9	49,6	56,5	55,5	54,5	53,1	50,6	49,7	47,2	56,6	55,4
2011	52,2	48,5	55,8	53,4	54,2	51,7	50,1	50	47,3	53,4*	62,5*
Evangélica/Protestante											
2001	13,8	13,4	14,3	15	13,7	13,9	13,5	12,7	17,3	12	8,7
2003	13,2	12,9	13,6	13	13,6	13,1	12,9	13,4	16,9	11	8,5
2005	13,3	13,4	13,2	15,2	13,3	12,3	13	12,1	17,3	11,1	7,9
2007	13	12,6	13,4	13,1	12,9	12,7	12,9	13,3	16,5	11,1	8,9
2009	14,4	14,3	14,6	14,1	14,8	14,2	14,9	13,9	17,6	12,9	10,7
2011	13,4*	12,9*	13,9	13,1	12,8*	12,6	14,4	14,5	17,3	12,6	4,1*
Otra religión											
2001	5,9	6,3	5,5	6,1	6,2	5,7	6	5,5	6,5	5,1	6,1
2003	6,6	6,8	6,4	7	6,8	6,5	6,4	6	7,5	5,9	5,7
2005	7	7,5	6,5	6,8	7	6,8	7,3	7	7,6	6,6	6,3
2007	7,3	7,9	6,8	7,3	7,6	7,3	7,2	7,2	7,9	6,8	7,4
2009	7,3	8,1	6,6	7	7	7,6	8,2	6,9	8,1	7	6,2
2011	6,5*	7*	6,1	6,7	6,6	6,8	6*	6,4	7,7	6,2*	4,6*
Ninguna religión											
2001	12,4	14,1	10,7	8	11	12,7	15	16,7	11,6	11,9	15,6
2003	13,9	15,7	12	9,3	12,5	14,3	17,2	18,2	12,5	14	17,1
2005	16,6	18,3	14,9	11,8	14,3	17,2	20	21,7	14,3	17,2	21,3
2007	16,3	18,4	14,3	11,5	14,1	17	19,4	20,8	15,9	16,1	18,3
2009	14,7	16,5	13	11,1	12,3	15,1	16,5	20	13,8	14,6	17,8
2011	15,3	17,5	13,3	10,2	14,5*	16,4	19,3	18,2	13,1	16	18,6
No sabe											
2001	5,5	6,2	4,9	6,5	5,6	5,7	4,9	4,5	6,1	4,8	5,4
2003	5,8	6,5	5,1	6,6	6,1	5,6	5	5	6,4	5,2	5,3
2005	7	7,9	6,1	8	7,6	6,7	6,4	6	7,7	6,4	6,8
2007	7,4	8,5	6,3	8,5	8,2	7,2	6,7	6	8	7,2	6,4
2009	7,3	8,2	6,4	9,2	7,6	7,3	6,3	5,7	8,6	6,7	5,9
2011	8,7*	10,2*	7,4*	12*	8,4	8,3	6,7	6,9	10,1*	8,3*	6,4
Hábito religioso entre católicos Al menos una vez a la semana											
2001	19,7	16,8	22,4	22	19,6	20,9	18,6	16,4	17,9	20,3	22,5
2003	22,8	20,1	25,2	24,9	23,2	22,9	22,5	18,9	22,2	23	23,7
2005	21,2	18,7	23,4	23,3	20,8	21,5	21,4	18	21	21	22,1
2007	19,7	18,8	20,5	21,1	20	20	19,1	18	18,7	18,7	25,6
2009	22,8	22,9	22,7	24,8	23,8	23,4	21,2	19,7	24,2	22,1	22
2011	20,8*	22,3	19,6*	25,4	21,6	17,1*	19,7	18,3	21,8	19*	29,7*
Hábito religioso entre evangélicos Al menos una vez a la semana											
2001	48,2	44,9	51,2	52,6	45,4	48,7	46,4	46,8	47,2	50,5	46,6
2003	48,6	45,4	51,6	48,3	48,7	46,5	50,5	49,9	48,1	49,9	47,5
2005	47,5	45,3	49,6	49,4	46,9	45,7	47	48	45,9	49	50,9
2007	47,1	44,9	49,1	48,9	45,8	46,1	47,1	47,6	46,3	47,8	48,3
2009	51	49,7	52,3	50,7	50,1	52	50,6	51,7	50,7	51,5	49,6
2011	43,4*	39,5*	46,7*	43,5*	46,6	42,1*	42,9*	40,6*	40,8*	45,2*	44,8

° Porcentajes sobre muestra total

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

Anexo I: Cuadros Estadísticos con Información Complementaria
Prevalencias Regionales de Consumo de Sustancias

PREVALENCIAS REGIONALES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

PREVALENCIAS DE TABACO

Tabaco vida	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	77,8	75,5	69,8	71,4	68,2	57,2*
Tarapacá	71,2	69,3	62,5	65,2	62,7	50,0*
Antofagasta	78,5	77,2	69,6	70,7	68,0	62,3
Atacama	78,0	74,9	70,8	75,0	68,5	56,7*
Coquimbo	78,6	76,2	72,2	69,8	67,7	55,4*
Valparaíso	78,1	75,8	70,6	72,2	67,5	61,2*
O'Higgins	77,3	74,7	72,8	71,3	68,2	52,0*
Maule	75,6	72,8	68,4	67,5	64,8	52,1*
Biobío	75,3	73,4	66,0	69,1	65,8	52,2*
Araucanía	77,7	72,7	64,2	66,6	69,4	50,0*
Los Lagos	76,9	74,9	70,0	73,0	70,6	56,3*
Aysén	77,5	78,5	77,8	78,4	73,3	63,3
Magallanes	79,7	75,8	73,3	71,0	68,9	61,6
Metropolitana	78,9	76,8	70,9	72,7	69,3	59,6*
Los Ríos	-	-	-	-	67,3	57,1*
Arica y Parinacota	-	-	-	-	65,3	49,0*

Tabaco año	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	55,9	51,6	53,0	48,8	46,3	38,5*
Tarapacá	51,0	47,0	47,1	45,6	42,5	29,8*
Antofagasta	54,7	55,0	50,7	47,0	47,8	42,7
Atacama	56,8	52,7	52,9	54,6	46,0	39,4
Coquimbo	57,9	53,0	56,3	46,7	47,2	38,3*
Valparaíso	58,4	52,8	54,1	50,2	45,3	40,7*
O'Higgins	55,2	52,9	55,6	49,4	45,7	33,2*
Maule	54,3	48,7	50,8	42,6	43,4	35,2*
Biobío	52,2	49,5	48,4	46,2	43,4	35,0*
Araucanía	55,4	48,6	46,2	44,0	48,2	31,2*
Los Lagos	55,4	51,5	52,9	50,4	50,2	34,8*
Aysén	53,0	56,5	61,7	55,7	53,6	43,2
Magallanes	57,2	52,6	54,5	50,2	46,9	37,9
Metropolitana	56,7	52,1	54,7	50,2	46,9	40,9*
Los Ríos	-	-	-	-	45,2	37,9
Arica y Parinacota	-	-	-	-	46,1	28,5*

Tabaco mes	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	42,0	38,2	41,3	35,4	33,1	25,9*
Tarapacá	36,6	32,2	37,0	32,4	30,9	17,5*
Antofagasta	40,5	41,4	38,7	32,8	31,9	30,3
Atacama	44,0	37,8	42,1	42,5	34,0	24,3*
Coquimbo	43,2	39,4	43,8	31,4	34,2	24,7*
Valparaíso	44,2	39,3	41,5	37,7	32,9	27,8*
O'Higgins	40,3	38,2	42,7	35,9	30,8	23,1*
Maule	39,8	33,5	38,1	30,6	30,3	24,7*
Biobío	38,3	35,9	36,9	32,6	31,1	22,6*
Araucanía	39,6	33,9	34,1	31,0	34,4	22,2*
Los Lagos	41,7	37,0	41,8	36,2	36,3	23,5*
Aysén	40,1	45,9	50,4	41,2	39,8	26,5*
Magallanes	41,5	40,6	42,6	36,1	32,7	25,3
Metropolitana	43,4	39,3	43,2	36,6	33,7	27,6*
Los Ríos	-	-	-	-	33,2	22,7*
Arica y Parinacota	-	-	-	-	32,5	16,8*

Tabaco diario	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	18,6	15,3	15,7	14,6	8,1*
Tarapacá	11,2	12,4	10,6	12,1	5,7*
Antofagasta	22,3	12,9	12,3	11,4	9,5
Atacama	17,6	13,0	16,9	12,0	8,9
Coquimbo	17,4	14,3	12,5	12,2	6,5*
Valparaíso	18,4	14,7	17,0	14,3	8,1*
O'Higgins	17,6	15,7	15,0	13,4	7,4*
Maule	14,7	14,2	11,9	11,5	8,6
Biobío	15,9	12,0	13,6	13,6	6,1*
Araucanía	15,5	11,3	12,4	13,9	7,3*
Los Lagos	17,1	16,5	15,6	16,1	7,8*
Aysén	24,1	22,1	19,9	17,7	10,7*
Magallanes	20,9	16,8	15,5	18,7	7,5*
Metropolitana	20,4	17,0	17,4	15,9	9,1*
Los Ríos	-	-	-	15,0	7,7*
Arica y Parinacota	-	-	-	9,9	3,6*

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PREVALENCIAS DE ALCOHOL

Alcohol vida	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	77,6	78,6	73,1	77,1	75,0	78,9*
Tarapacá	68,2	71,4	64,8	67,9	68,0	69,7
Antofagasta	70,3	74,9	68,8	70,3	71,7	78,6
Atacama	75,8	76,5	68,6	72,9	71,2	74,7
Coquimbo	75,9	76,4	72,5	75,5	74,7	75,8
Valparaíso	78,9	78,5	73,0	77,4	75,9	82,0*
O'Higgins	78,2	79,5	75,3	77,8	76,2	77,4
Maule	76,1	76,5	72,7	74,2	72,3	76,7
Biobío	73,3	75,8	69,0	74,2	73,1	77,3*
Araucanía	76,6	79,1	66,9	74,2	76,2	77,5
Los Lagos	74,8	74,9	73,7	76,7	75,5	77,6
Aysén	76,4	77,1	76,9	83,6	76,0	77,4
Magallanes	73,4	73,5	70,1	71,7	67,2	76,2
Metropolitana	80,2	80,8	75,6	79,8	76,4	80,4*
Los Ríos	-	-	-	-	74,8	81,7
Arica y Parinacota	-	-	-	-	68,5	69,3

Alcohol año	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	61,5	60,4	59,8	58,6	57,0	59,3*
Tarapacá	52,3	52,7	52,3	51,0	50,9	49,7
Antofagasta	54,3	59,0	55,2	50,3	54,1	58,3
Atacama	58,7	59,7	55,9	54,4	52,6	58,2
Coquimbo	59,8	58,2	59,9	54,3	57,8	59,2
Valparaíso	64,3	61,9	60,4	60,0	57,8	63,4*
O'Higgins	62,2	62,9	63,0	60,9	58,5	58,6
Maule	60,4	57,6	58,4	53,1	52,9	58,4
Biobío	56,0	56,1	54,5	55,3	52,8	53,4
Araucanía	59,3	60,1	52,6	55,7	59,1	58,5
Los Lagos	58,3	55,4	58,3	57,4	58,7	55,4
Aysén	58,8	59,7	63,0	65,0	60,4	58,4
Magallanes	56,8	57,5	58,1	54,0	51,3	56,7
Metropolitana	64,3	62,6	62,5	61,6	58,7	61,4*
Los Ríos	-	-	-	-	53,5	62,3
Arica y Parinacota	-	-	-	-	52,9	41,8

Alcohol mes	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	38,9	38,7	43,3	38,1	35,5	34,7
Tarapacá	32,4	30,5	37,7	31,4	30,2	24,6
Antofagasta	32,1	36,3	37,5	30,5	32,8	31,6
Atacama	37,5	37,8	39,7	37,5	34,1	35,8
Coquimbo	36,6	39,6	44,7	34,1	36,9	34,3
Valparaíso	41,5	39,9	43,9	40,1	35,7	40,2*
O'Higgins	37,3	40,8	43,8	40,1	34,9	34,1
Maule	36,7	35,0	40,9	34,2	32,3	35,4
Biobío	33,8	34,4	37,4	34,9	32,3	31,8
Araucanía	36,3	37,1	36,0	35,3	38,2	32,4
Los Lagos	35,4	34,0	41,8	37,3	35,8	33,4
Aysén	30,7	39,3	48,2	43,4	36,4	35,7
Magallanes	30,7	35,3	37,8	32,4	32,4	34,7
Metropolitana	41,8	41,1	46,5	40,6	36,8	35,5
Los Ríos	-	-	-	-	31,2	36,8
Arica y Parinacota	-	-	-	-	34,0	19,9*

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

PREVALENCIAS DE MARIHUANA

Marihuana vida	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	24,4	22,2	19,4	25,2	25,3	26,5
Tarapacá	21,6	17,7	20,1	23,9	27,1	26,2
Antofagasta	22,9	25,2	16,8	25,4	28,5	37,0*
Atacama	23,1	21,6	18,8	24,8	25,3	23,9
Coquimbo	24,9	21,5	20,5	24,3	24,2	24,4
Valparaíso	24,9	21,6	19,4	27,8	26,6	30,2
O'Higgins	20,3	18,5	19,9	21,9	22,5	21,6
Maule	14,8	14,9	15,1	16,9	18,7	19,7
Biobío	19,0	19,1	14,6	20,1	20,2	17,5
Araucanía	17,0	16,1	13,1	19,5	22,6	19,1
Los Lagos	15,3	16,9	19,1	23,9	25,4	19,8
Aysén	13,4	18,7	11,2	16,2	21,0	20,5
Magallanes	13,6	12,6	18,8	18,7	21,6	22,1
Metropolitana	29,0	25,4	21,7	28,0	27,2	29,7
Los Ríos	-	-	-	-	21,5	20,6
Arica y Parinacota	-	-	-	-	29,9	26,8

Marihuana año	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	14,8	13,0	14,7	15,6	15,1	19,5*
Tarapacá	12,7	9,9	15,5	15,4	17,0	18,5
Antofagasta	14,1	15,7	11,8	16,4	17,1	25,5*
Atacama	14,3	13,5	14,2	14,9	13,5	18,6
Coquimbo	14,5	13,0	15,4	13,3	15,4	18,8
Valparaíso	15,9	12,7	15,0	17,3	15,7	20,8*
O'Higgins	12,3	11,6	15,9	13,3	13,1	14,3
Maule	8,6	7,8	11,2	10,0	10,7	14,4*
Biobío	11,2	11,0	10,6	12,1	11,4	13,0
Araucanía	11,0	10,0	9,3	12,0	13,4	12,0
Los Lagos	9,4	10,1	14,1	13,2	15,1	14,3
Aysén	8,5	13,8	8,2	9,3	12,4	17,2
Magallanes	8,6	8,8	15,0	11,3	14,5	17,7
Metropolitana	17,4	14,7	16,6	17,6	16,3	22,8*
Los Ríos	-	-	-	-	10,6	12,8
Arica y Parinacota	-	-	-	-	18,8	19,7

Marihuana mes	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	7,9	6,8	6,2	8,3	7,7	11,2*
Tarapacá	7,0	4,7	7,3	8,7	10,2	11,4
Antofagasta	8,3	8,6	4,8	10,0	8,6	15,4*
Atacama	7,2	7,3	6,4	8,7	7,7	9,9
Coquimbo	7,8	6,7	7,0	6,9	8,5	10,4
Valparaíso	8,9	6,6	6,3	10,1	8,3	11,7*
O'Higgins	5,6	5,8	6,1	6,8	5,3	8,8
Maule	3,5	4,1	4,1	5,1	4,9	9,0*
Biobío	6,0	5,6	4,2	6,0	6,2	6,5
Araucanía	5,4	5,4	3,7	5,1	7,4	8,0
Los Lagos	4,7	4,8	6,5	7,3	7,8	6,5
Aysén	3,2	6,4	3,0	4,6	5,2	10,5*
Magallanes	2,8	4,2	5,3	5,7	7,3	9,7
Metropolitana	9,3	7,8	7,1	9,2	8,2	13,3*
Los Ríos	-	-	-	-	5,6	3,8
Arica y Parinacota	-	-	-	-	9,9	9,6

PREVALENCIAS DE COCAÍNA TOTAL

Cocaína total vida	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	7,7	7,6	6,6	8,0	8,2	7,4*
Tarapacá	8,9	6,1	8,0	7,1	7,6	6,3
Antofagasta	5,6	7,7	5,6	5,5	7,5	11,7*
Atacama	4,8	4,4	4,8	4,5	10,9	2,6*
Coquimbo	8,2	7,1	6,4	8,4	6,9	5,0
Valparaíso	6,0	5,9	6,2	8,7	8,4	7,6
O'Higgins	4,5	5,2	7,0	6,8	7,0	5,0
Maule	3,7	4,8	4,6	6,2	8,0	5,5
Biobío	4,9	6,1	5,6	8,3	8,1	4,6*
Araucanía	4,0	5,4	5,2	7,1	8,2	9,8
Los Lagos	4,0	4,2	5,8	6,5	5,8	7,6
Aysén	4,7	4,7	3,7	8,5	3,9	2,2
Magallanes	4,9	2,7	3,7	5,7	5,6	5,3
Metropolitana	10,3	9,7	7,4	8,7	8,8	8,5
Los Ríos	-	-	-	-	8,1	4,6
Arica y Parinacota	-	-	-	-	8,6	5,2

Cocaína total año	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	4,2	4,1	4,2	4,3	4,5	4,4
Tarapacá	4,8	2,5	4,3	3,6	3,1	3,9
Antofagasta	2,7	3,8	3,4	2,7	4,3	5,8
Atacama	1,4	2,8	3,3	1,9	6,2	1,5*
Coquimbo	3,0	4,0	4,3	4,7	3,5	3,2
Valparaíso	3,4	3,1	4,2	5,0	4,6	3,4*
O'Higgins	1,9	2,9	4,8	4,0	3,9	2,9
Maule	2,1	2,1	2,4	3,0	4,8	3,3
Biobío	2,3	3,0	3,2	4,2	4,0	2,8*
Araucanía	1,9	2,8	3,0	3,5	4,3	7,0
Los Lagos	1,9	2,3	3,6	3,1	2,8	5,7
Aysén	2,0	2,5	2,4	4,8	1,3	1,3
Magallanes	2,2	0,7	1,6	3,7	3,4	3,8
Metropolitana	5,9	5,5	4,8	4,7	4,9	5,4
Los Ríos	-	-	-	-	4,6	1,6*
Arica y Parinacota	-	-	-	-	4,7	2,3

Cocaína total mes	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	2,0	2,1	2,0	2,2	2,3	2,3
Tarapacá	2,7	1,3	2,0	1,9	1,4	2,3
Antofagasta	1,3	1,7	1,9	1,5	2,6	3,8
Atacama	0,8	1,1	1,6	1,1	2,9	0,9*
Coquimbo	1,4	2,3	2,2	2,0	1,4	1,6
Valparaíso	1,5	1,4	2,0	2,8	2,4	1,6*
O'Higgins	0,9	1,2	2,2	1,8	1,5	2,0
Maule	0,8	1,1	1,1	1,7	2,4	1,8
Biobío	0,9	1,4	1,5	2,0	1,9	1,0*
Araucanía	0,7	1,7	1,6	1,1	2,3	4,1
Los Lagos	1,0	1,1	1,4	1,7	1,6	2,1
Aysén	0,4	1,4	1,1	3,1	0,8	0,9
Magallanes	0,9	0,5	0,9	2,1	1,8	1,4
Metropolitana	2,8	2,8	2,3	2,4	2,5	2,7
Los Ríos	-	-	-	-	2,9	0,7*
Arica y Parinacota	-	-	-	-	2,5	1,2

PREVALENCIAS DE INHALABLES

Inhalables vida	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	4,5	8,2	5,9	8,0	8,7	7,9*
Tarapacá	4,3	7,1	5,8	6,3	7,3	6,0
Antofagasta	5,7	12,4	6,6	7,7	7,6	8,2
Atacama	5,4	8,7	7,4	8,9	13,2	9,2
Coquimbo	4,0	8,0	6,4	9,7	8,3	6,1
Valparaíso	4,0	7,1	6,7	9,3	9,9	9,3
O'Higgins	3,1	8,0	7,5	6,5	8,0	5,2*
Maule	3,0	7,0	5,2	6,4	8,3	6,0
Biobío	4,1	8,1	5,5	8,3	8,2	5,6*
Araucanía	3,7	8,2	5,2	8,9	9,3	8,9
Los Lagos	4,0	8,5	7,4	8,5	9,0	9,7
Aysén	3,9	8,7	9,6	14,1	14,0	12,4
Magallanes	7,2	9,4	7,3	15,5	17,0	17,0
Metropolitana	5,0	8,2	5,6	7,6	8,3	8,6
Los Ríos	-	-	-	-	11,1	8,0
Arica y Parinacota	-	-	-	-	7,2	5,3

Inhalables año	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	1,9	3,2	2,8	3,1	3,0	4,0*
Tarapacá	1,9	2,4	2,9	2,2	2,1	2,9
Antofagasta	2,5	4,4	2,4	2,4	2,6	3,9
Atacama	2,3	2,8	4,0	3,1	3,8	5,3
Coquimbo	1,7	3,3	2,5	3,7	2,9	3,8
Valparaíso	1,8	3,0	3,3	3,6	3,6	5,0
O'Higgins	1,4	3,1	4,1	2,7	2,2	3,3
Maule	1,3	3,0	2,1	2,2	3,1	2,2
Biobío	1,7	3,3	2,8	3,3	2,2	2,9
Araucanía	1,6	2,6	2,8	3,8	3,5	4,0
Los Lagos	1,8	3,7	3,5	2,5	2,3	3,9
Aysén	1,4	3,0	3,8	6,2	4,5	7,0
Magallanes	3,2	3,4	3,2	7,9	6,2	5,4
Metropolitana	2,0	3,2	2,7	3,0	3,0	4,3*
Los Ríos	-	-	-	-	3,5	4,6
Arica y Parinacota	-	-	-	-	1,7	2,3

Inhalables mes	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Nacional	0,7	1,4	1,1	1,3	1,3	1,7*
Tarapacá	0,7	1,3	1,2	0,7	0,8	1,0
Antofagasta	1,2	1,9	0,9	0,9	1,2	0,9
Atacama	0,9	1,5	1,5	1,5	1,3	2,3
Coquimbo	0,7	1,3	0,9	1,6	1,2	1,9
Valparaíso	0,6	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6
O'Higgins	0,6	1,3	1,6	1,0	0,9	1,5
Maule	0,5	1,5	0,7	0,7	1,7	0,8*
Biobío	0,6	1,3	1,1	1,4	1,2	1,4
Araucanía	0,6	0,9	1,2	1,6	1,3	2,2
Los Lagos	0,7	1,8	1,1	1,1	0,8	0,6
Aysén	0,6	1,7	2,0	3,1	1,5	2,2
Magallanes	0,6	1,7	1,6	3,9	1,8	2,3
Metropolitana	0,8	1,4	1,0	1,2	1,4	2,1*
Los Ríos	-	-	-	-	1,0	1,4
Arica y Parinacota	-	-	-	-	1,0	1,4

* Variación estadísticamente significativa en relación al estudio anterior

ANEXO II
Cuestionario Aplicado

NOVENO ESTUDIO NACIONAL EN POBLACIÓN ESCOLAR DE CHILE

DE 8 BÁSICO A 4 MEDIO, 2011

Lee atentamente y sin apresurarte las preguntas y las alternativas de respuesta de este cuestionario
Ennegrece la alternativa que elijas en la hoja de respuesta
Si no entiendes una pregunta levanta la mano y espera a que se acerque el encargado
Esta es una encuesta anónima y confidencial que puedes responder con toda tranquilidad
Recuerda que es una encuesta nacional que contestan miles de alumnos en todo el país: interesan sólo los datos agregados

Contesta **todas** las preguntas en la hoja anexa de respuesta

A. RBD:

○○○○○

B. Curso: ○

C. Letra curso: ○
(Identifica con letra "z" si tu curso no tiene letra)

1. Inicio de la encuesta

Hora de Inicio de la encuesta: ○ : ○○

2. Sexo

① Hombre
② Mujer

3. Edad en años cumplidos: ○

Monitoreo parental

4. ¿Quién es tu apoderado?

① Padre
② Madre
③ Abuela o Abuelo
④ Otro

5. Después de que sales del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu madre, padre o apoderado no saben dónde estás? Ya sea por un periodo de una hora o más.

① Nunca o casi nunca saben dónde estoy
② A veces no saben
③ Siempre o casi siempre saben dónde estoy

6. En general, ¿alguno de tus padres o apoderados se fija o conoce los programas que ves en la televisión y/o páginas de Internet que visitas?

① Si
② No

7. ¿Cuán atentos están tus padres o apoderados (o alguno de ellos) respecto de lo que haces en el colegio?

① Mucho
② Bastante
③ Poco
④ Nada

8. En una semana normal, ¿Cuántos días se sientan a comer juntos, tú y tus padres o apoderados (o alguno de ellos), en la misma mesa?, ya sea para desayunar, almorzar, tomar once o cenar (MARCA SÓLO UNA OPCIÓN)

① Ningún día
② 1 día
③ 2 días
④ 3 días
⑤ 4 días
⑥ 5 días
⑦ 6 días
⑧ Todos los días

9. Durante los fines de semana, ¿tus padres o apoderados (o alguno de ellos) controlan a qué hora llegas a tu casa en la noche?

① Si
② No

10. Cuando sales de la casa en las tardes o en los fines de semana, ¿tus padres o apoderados (o alguno de ellos) te preguntan y/o esperan que tú les digas a dónde vas?

① Si
② No

11. En general, ¿cuánto crees que tus padres o apoderados (o alguno de ellos) conocen a tus amigos más cercanos?

① Bastante
② Más o menos
③ Poco

Percepción de riesgo tabaco y alcohol

12. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?

	Ningún riesgo	Riesgo leve	Riesgo moderado	Riesgo grande	No sé
12a. Fumar cigarrillos de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑨
12b. Fumar cigarrillos frecuentemente	①	②	③	④	⑨
12c. Fumar una o más cajetillas de cigarros al día	①	②	③	④	⑨
12d. Tomar bebidas alcohólicas de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑨
12e. Tomar alcohol frecuentemente	①	②	③	④	⑨
12f. Emborracharse con alcohol	①	②	③	④	⑨
12g. Tomar uno o dos tragos de alcohol todos o casi todos los días	①	②	③	④	⑨

Las siguientes preguntas son acerca del consumo de tabaco

13. ¿Has fumado cigarrillos alguna vez en la vida?

① Sí
② No

14a. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a fumar cigarrillos por primera vez? No consideres si tus padres o algún adulto te dieron a probar siendo niño.

Edad en años: ○ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has fumado***

14b. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a fumar cigarrillos todos o casi todos los días?

Edad en años: ○ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has fumado***

15. ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste cigarrillos?

① Durante los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

16. ¿Cuándo fue la última vez que fumaste un cigarrillo?

① En los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

17. ¿Cuántos días has fumado cigarrillos en los últimos 30 días?

N° de días: ○ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has fumado en los últimos 30 días***

18. Considerando sólo los días que fumaste en el último mes. ¿Aproximadamente, cuántos cigarrillos fumaste al día?

N° de cigarrillos: ○○ ***Marca "00" en la hoja de respuestas si no has fumado en los últimos 30 días***

Las siguientes preguntas son acerca del consumo de bebidas alcohólicas

19. ¿Has probado alcohol alguna vez en la vida (cerveza, vinos o tragos fuertes)?

① Sí
② No

20. ¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna bebida alcohólica? No consideres si tus padres o un adulto te dieron a probar siendo niño.

Edad en años: ○ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

21. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste alcohol?

① En los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

22. Si quisieras hacerlo ¿cuán difícil te sería comprar alguna bebida alcohólica?

① Me sería muy fácil
② Me sería fácil
③ Me sería difícil
④ Me sería muy difícil
⑤ No podría comprarla
⑨ No sé

23. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste alcohol?

① En los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

24. Contesta las siguientes preguntas relacionadas al consumo de alcohol

	SI	NO
24a. ¿Alguna vez has viajado en un auto conducido por una persona (o por ti mismo) que haya consumido alcohol?	①	②
24b. ¿Alguna vez amigos o familiares te han sugerido o mencionado que disminuyas el consumo de alcohol?	①	②
24c. ¿Alguna vez has consumido alcohol para relajarte, para sentirte mejor contigo mismo o para integrarte a un grupo?	①	②
24d. ¿Alguna vez te has metido en problemas al consumir alcohol?	①	②
24e. ¿Alguna vez se te ha olvidado lo que hiciste al consumir alcohol?	①	②
24f. ¿Alguna vez has consumido alcohol estando solo o sola?	①	②

25. Piensa en los últimos 30 días ¿Cuántos días has consumido algún tipo de alcohol?

N° de días: ◯ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

26. ¿Cuántos tragos sueles tomar en un día típico de consumo de alcohol?. Guíate por la siguiente tabla para saber cuántos tragos consumes

1 trago (una botella o lata individual de cerveza (333 cc.); Un vaso de vino (140 cc.); Un trago de licor (40 cc. de pisco, ron, vodka o whisky, sólo o combinado)
1 trago y medio (medio litro de cerveza)
3 tragos (un litro de cerveza)
6 tragos (una botella de vino (750 cc.)
8 tragos (una caja de vino (1 litro)
18 tragos (una botella de licor (750 cc.)

① 1 a 2 tragos
② 3 a 4 tragos
③ 5 a 6 tragos
④ 7 a 8 tragos
⑤ 9 o más tragos
⑥ No consumo alcohol

27. ¿Cuántas veces te has emborrachado o intoxicado tomando alcohol, por ejemplo tambalearse al caminar, no ser capaz de hablar bien, vomitar o no recordar qué ocurrió?

	Nunca	1-2 veces	3-5 veces	6-9 veces	10-19 veces	20-39 veces	40 o más veces
27a. En tu vida	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
27b. En los últimos 12 meses	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
27c. En los últimos 30 días	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥

28. Piensa en los últimos 12 meses

	SI	NO	No he consumido en los últimos 12 meses
28a. ¿Has tenido algún problema serio en la casa, en el colegio o en el trabajo a causa del alcohol? Como faltar a clases, bajar el rendimiento.	①	②	③
28b. ¿Te ha sucedido que a causa del alcohol te hayas expuesto a algún peligro contra tu integridad física? Por ejemplo, estar a punto de chocar o sufrir algún otro accidente.	①	②	③
28c. ¿Has hecho algo bajo los efectos del alcohol que pudiera causarte algún problema con la autoridad pública o la ley? Como conducir un vehículo en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido.	①	②	③
28d. ¿Has tenido problemas con tu familia o tus amigos a causa del alcohol? Como un disgusto o discusión seria que haya resentido esa relación.	①	②	③
28e. ¿Te has visto envuelto en una pelea a golpes, o has agredido a alguien bajo los efectos del alcohol?	①	②	③

29. Y Pensando en los últimos 30 días, señala si has tomado bebidas alcohólicas en los siguientes lugares
Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido alcohol en los últimos 30 días

	SI	NO
29a. Bares o pubs	①	②
29b. Discotecas	①	②
29c. Restaurantes	①	②
29d. Casa donde vives, incluyendo todo el recinto	①	②
29e. Casa de otra persona	①	②
29f. En calles, plazas, parques o espacios públicos	①	②
29g. En el colegio	①	②
29h. Cancha de futbol u otro deporte	①	②
29i. En otro lugar	①	②

30. Pensando en el último día que consumiste alcohol ¿cuál de las siguientes bebidas alcohólicas fue la que más tomaste ese día? ***Marca aquella bebida (o tipo de alcohol) que más consumiste.***

① Cerveza
② Vino
③ Espumantes (champaña, Manquehuito, vinos con sabores u otros)
④ Tragos fuertes solos o combinados (piscola, roncola, vodka naranja u otro)
⑤ No consumo alcohol

31. Por favor indica, de 1 a 10, qué tan borracho consideras que estuviste el último día que consumiste alcohol, donde 1 equivale a "tomé alcohol pero no sentí ningún efecto" y 10 equivale a "estaba tan borracho que no me acuerdo de nada".

No me hizo efecto	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	No me acuerdo de nada

Marca "99" en la hoja de respuestas si no has consumido

32. Pensando en una SALIDA DE SÁBADO POR LA NOCHE ¿Cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a tomar?

① Nunca he tomado alcohol
② Ninguno
③ Menos de 1
④ Uno
⑤ Entre 2 y 5
⑥ Entre 6 y 10
⑦ Más de 10

33. Pensando en los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has tomado 5 o más tragos en una sola ocasión (por ejemplo en un carrete, una salida o una junta)? 5 o más tragos equivaldría a por ejemplo:

> 5 latas de cerveza o aproximadamente 1 litro y medio de cerveza (1.600 ml de cerveza)
> 5 copas de vino o aproximadamente 1 botella de vino (700 ml de vino)
> 5 combinados suaves o 3 combinados fuertes (200 ml de ron, pisco, vodka u otro licor)

① Ninguna vez
② 1 vez
③ 2 veces
④ 3 a 5 veces
⑤ 6 a 9 veces
⑥ 10 o más veces

34. Durante los últimos 30 días, ¿Cuántos tragos o vasos de alcohol tomaste el día de mayor consumo? Considerar como medida: una lata o una botella de cerveza, un vaso de vino o champaña, un trago de licor o un combinado.

Consumo en tragos o vasos de alcohol: ○○ ***Marca "00" en la hoja de respuestas si no has tomado***

Percepción de riesgo de sustancias lícitas

35. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?

	Ningún riesgo	Riesgo leve	Riesgo moderado	Riesgo grande	No sé
35a. Prueba tranquilizantes SIN RECETA médica una o dos veces en la vida (como clonazepam, Ravotril, alprazolam, diazepam, valium)	①	②	③	④	⑨
35b. Toma tranquilizantes SIN RECETA médica de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑨
35c. Toma tranquilizantes SIN RECETA médica frecuentemente	①	②	③	④	⑨
35d. Prueba estimulantes SIN RECETA médica una o dos veces en la vida (como anfetaminas, Mentix, modafinilo, Escancil, Pemolina)	①	②	③	④	⑨
35e. Toma estimulantes SIN RECETA médica de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑨
35f. Toma estimulantes SIN RECETA médica frecuentemente	①	②	③	④	⑨
35g. Prueba solventes o inhalables una o dos veces en la vida (como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers, pinturas)	①	②	③	④	⑨
35h. Aspira solventes o inhalables de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑨
35i. Aspira solventes o inhalables frecuentemente	①	②	③	④	⑨

A continuación te queremos preguntar por el consumo de tranquilizantes (tales como clonazepam, alprazolam, diazepam, lorazepam, valium), ya sea CON o SIN receta médica. Los tranquilizantes a veces son usados para calmarse, dormirse o relajarse.

36. ¿Has consumido tranquilizantes alguna vez en la vida?

	Si	No
36a. SIN receta médica	①	②
36b. CON receta médica	①	②

37. Qué edad tenías cuando probaste tranquilizantes por primera vez?

	Años de edad	
37a. SIN receta médica	○	***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***
37b. CON receta médica	○	***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

38. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste tranquilizantes?

	En los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca he probado
38a. SIN receta médica	①	②	③	④
38b. CON receta médica	①	②	③	④

39. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste tranquilizantes?

	En los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca he probado
39a. SIN receta médica	①	②	③	④
39b. CON receta médica	①	②	③	④

40. ¿Cuán difícil te sería conseguir tranquilizantes sin una receta médica, si quisieras hacerlo?

① Me sería muy fácil
② Me sería fácil
③ Me sería difícil
④ Me sería muy difícil
⑤ No podría conseguirlos
⑥ No sé

41. ¿Cuántos días has consumido tranquilizantes durante los últimos 30 días?

	N° días	
41a. SIN receta médica	◯	***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***
41b. CON receta médica	◯	***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

Percepción de riesgo de sustancias ilícitas

42. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?

	Ningún riesgo	Riesgo leve	Riesgo moderado	Riesgo grande	No sé
42a. Prueba marihuana una o dos veces en la vida	①	②	③	④	⑤
42b. Fuma marihuana de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑤
42c. Fuma marihuana frecuentemente (una o dos veces por semana)	①	②	③	④	⑤
42d. Prueba cocaína una o dos veces en la vida	①	②	③	④	⑤
42e. Consume cocaína de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑤
42f. Consume cocaína frecuentemente (una vez al mes)	①	②	③	④	⑤
42g. Prueba pasta base una o dos veces en la vida	①	②	③	④	⑤
42h. Consume pasta base de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑤
42i. Consume pasta base frecuentemente	①	②	③	④	⑤
42j. Prueba éxtasis una o dos veces en la vida	①	②	③	④	⑤
42k. Consume éxtasis de vez en cuando (ocasionalmente)	①	②	③	④	⑤
42l. Consume éxtasis frecuentemente	①	②	③	④	⑤
42m. Prueba alucinógenos como LSD o peyote una o dos veces en la vida	①	②	③	④	⑤

Las siguientes preguntas son sobre consumo de marihuana

43. ¿Has consumido marihuana alguna vez en la vida?

① Sí
② No

44. ¿Qué edad tenías cuando probaste marihuana por primera vez?

Edad en años: ◯ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

45. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste marihuana?

① Durante los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

46. ¿Cuántas veces has consumido marihuana...?

	Nunca	1-2 veces	3-5 veces	6-9 veces	10-19 veces	20-39 veces	40 o más veces
46a. En tu vida	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
46b. En los últimos 12 meses	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
46c. En los últimos 30 días	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥

47. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste marihuana?

① En los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

48. Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia te ha ocurrido algo como lo que se describe a continuación? MARCA "0" EN LA HOJA DE RESPUESTAS si no has consumido marihuana en los últimos 12 meses

	Nunca	Rara vez	De vez en cuando	Bastante a menudo	Muy a menudo
48a. ¿Has fumado marihuana antes del medio día?	①	②	③	④	⑤
48b. ¿Has fumado marihuana estando solo/a?	①	②	③	④	⑤
48c. ¿Has tenido problemas de memoria al fumar marihuana?	①	②	③	④	⑤
48d. ¿Te han dicho los amigos o alguien de tu familia que deberías reducir el consumo de marihuana?	①	②	③	④	⑤
48e. ¿Has intentado reducir el consumo de marihuana sin conseguirlo?	①	②	③	④	⑤
48f. ¿Has tenido problemas debido a tu consumo de marihuana (pelea, accidente, mal resultado académico, etc.)?	①	②	③	④	⑤

49. ¿Cuán difícil te sería conseguir marihuana, si quisieras hacerlo?

① Me sería muy fácil
② Me sería fácil
③ Me sería difícil
④ Me sería muy difícil
⑤ No podría conseguirla
⑨ No sé

50. Y si quisieras conseguir marihuana en este momento ¿Cuánto tiempo te demorarías en conseguirla?

① Menos de una hora
② Algunas pocas horas
③ Dentro del día
④ Dentro de la semana
⑤ No podría conseguirla
⑨ No sé

51. Y Pensando en la última vez que consumiste marihuana ¿Cómo la conseguiste?

① Comprada
② Regalada
③ La compartieron conmigo
④ La cultivé
⑤ De otra forma
⑥ No he consumido

52. ¿Cuántos días has consumido marihuana en los últimos 30 días?

N° de días: ○ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

53. ¿Cuántos pitos de marihuana consumes en un día típico de consumo?

N° de pitos: ○○ ***Marca "00" en la hoja de respuestas si no has consumido***

54. ¿Qué tipo de marihuana has consumido con mayor frecuencia durante los últimos 12 meses?

① Marihuana prensada o "paraguaya"
② Marihuana verde o yerba
③ Marihuana verde transgénica (Skunk)
④ No he probado

Las siguientes preguntas son sobre consumo de cocaína

55. ¿Has consumido cocaína alguna vez en la vida?

① Si
② No

56. ¿Qué edad tenías cuando probaste cocaína por primera vez?

Edad en años: ○ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

57. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste cocaína?

① Durante los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

58. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste cocaína?

① En los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

59. ¿Cuán difícil te sería conseguir cocaína, si quisieras hacerlo?

① Me sería muy fácil
② Me sería fácil
③ Me sería difícil
④ Me sería muy difícil
⑤ No podría conseguirla
⑨ No sé

60. ¿Cuántas veces has consumido cocaína?

	Nunca	1-2 veces	3-5 veces	6-9 veces	10-19 veces	20-39 veces	40 o más veces
60a. En tu vida	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
60b. En los últimos 12 meses	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
60c. En los últimos 30 días	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥

61. En relación a la última vez que consumiste cocaína, ¿cuantas líneas inhalaste? Por favor indica también la cantidad en gramos.

61a. N° de gramos de cocaína: ○○ ***Marca "00" en la hoja de respuestas si no has consumido***
61b. N° de líneas de cocaína: ○○ ***Marca "00" en la hoja de respuestas si no has consumido***

Las siguientes preguntas son sobre consumo de pasta base

62. ¿Has consumido pasta base alguna vez en la vida?

① Sí
② No

63. ¿Qué edad tenías cuando probaste pasta base por primera vez?

Edad en años: ○ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

64. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste pasta base?

① Durante los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

65. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste pasta base?

① En los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

66. ¿Cuán difícil te sería conseguir pasta base, si quisieras hacerlo?

① Me sería muy fácil
② Me sería fácil
③ Me sería difícil
④ Me sería muy difícil
⑤ No podría conseguirla
⑨ No sé

67. ¿Cuántas veces has consumido pasta base?

	Nunca	1-2 veces	3-5 veces	6-9 veces	10-19 veces	20-39 veces	40 o más veces
67a. En tu vida	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
67b. En los últimos 12 meses	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
67c. En los últimos 30 días	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥

68. En relación a la última vez que consumiste pasta base ¿cuántos papelillos fumaste?

N° de papelillos: ○○ ***Marca "00" en la hoja de respuestas si no has consumido***

En la siguiente sección se pregunta sobre consumo de inhalables como neoprén, tolueno, éter, acetona, poppers, pinturas u otros similares

69. ¿Has consumido inhalables alguna vez en la vida?

① Sí
② No

70. ¿Qué edad tenías cuando probaste inhalables por primera vez?

Edad en años: ◯ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has consumido***

71. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste inhalables?

① Durante los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

72. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste inhalables?

① En los últimos 30 días
② Hace más de un mes, pero menos de un año
③ Hace más de un año
④ Nunca he probado

73. Si quisieras conseguir inhalables ¿cuán difícil te sería hacerlo?

① Me sería muy fácil
② Me sería fácil
③ Me sería difícil
④ Me sería muy difícil
⑤ No podría conseguirlos
⑨ No sé

74. ¿Cuántas veces has consumido inhalables?

	Nunca	1-2 veces	3-5 veces	6-9 veces	10-19 veces	20-39 veces	40 o más veces
74a. En tu vida	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
74b. En los últimos 12 meses	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥

75. Pensando en la última vez que consumiste inhalables, ¿cuál de los siguientes productos consumiste? Marca la categoría PRINCIPAL

① Pegamentos, neoprén, tolueno
② Aerosoles caseros como desodorantes corporales, desodorantes ambientales
③ Pinturas, spray, disolventes
④ Bencina, parafina, gas
⑤ Poppers
⑥ Cloruro de etilo, éter u otros anestésicos
⑦ Acetona
⑧ No he consumido

En la siguiente sección se pregunta sobre consumo de otras drogas como crack, heroína, alucinógenos, entre otras

76. ¿Has consumido las siguientes sustancias alguna vez en la vida?

	Si	No
76a. Crack	①	②
76b. Éxtasis	①	②
76c. Relevón	①	②
76d. Heroína	①	②
76e. Alucinógenos sintéticos como LSD, PCP, polvo de ángel, u otros ácidos	①	②
76f. Alucinógenos de origen natural como peyote, mezcalina hongos, floripondio u otro.	①	②
76g. Metanfetaminas, cristal, meth, ice o tina	①	②
76h. Anfetaminas u otros estimulantes SIN RECETA MÉDICA como ritalin	①	②
76i. Bebidas energéticas, como Red Bull, Battery, Dark Dog, Speed Injection u otra	①	②
76j. Modafinilo, como mentix, alertex o novigil	①	②

77. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste alguna de las siguientes drogas?

	En los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca he probado
77a. Crack	①	②	③	④
77b. Éxtasis	①	②	③	④
77c. Relevón	①	②	③	④
77d. Heroína	①	②	③	④
77e. Alucinógenos sintéticos	①	②	③	④
77f. Alucinógenos de origen natural	①	②	③	④
77g. Metanfetaminas	①	②	③	④
77h. Anfetaminas o Estimulantes	①	②	③	④
77i. Bebidas energéticas	①	②	③	④
77j. Modafinilo	①	②	③	④

78. Y si quisieras conseguir alguna de las siguientes sustancias ¿cuán difícil te sería hacerlo?

	Me sería muy fácil	Me sería fácil	Me sería difícil	Me sería muy difícil	No podría conseguir	No sabe
78a. Crack	①	②	③	④	⑤	⑥
78b. Éxtasis	①	②	③	④	⑤	⑥
78c. Relevón	①	②	③	④	⑤	⑥
78d. Heroína	①	②	③	④	⑤	⑥
78e. Alucinógenos sintéticos	①	②	③	④	⑤	⑥
78f. Alucinógenos de origen natural	①	②	③	④	⑤	⑥
78g. Metanfetaminas	①	②	③	④	⑤	⑥
78h. Anfetaminas o Estimulantes	①	②	③	④	⑤	⑥
78i. Bebidas energéticas	①	②	③	④	⑤	⑥
78j. Modafinilio	①	②	③	④	⑤	⑥

Las siguientes preguntas son respecto al acceso de drogas, a tus juntas, al gasto en dinero y a la percepción que tienes respecto al consumo de drogas

79. Pensando en los últimos 30 días, señala los lugares donde has comprado bebidas alcohólicas.
MARCA LAS 2 ALTERNATIVAS PRINCIPALES

① Bares o pubs
② Discotecas
③ Botillerías
④ Supermercados
⑤ Almacenes, Tiendas o kioskos
⑥ Internet o venta telefónica
⑦ No he comprado

80. ¿Y podrías señalar si en los últimos 30 días compraste o conseguiste alguna bebida alcohólica de las siguientes formas?

	SI	NO
80a. Yo directamente	①	②
80b. A través de familiares de 18 años o mayores	①	②
80c. A través de otras personas de 18 años o mayores	①	②
80d. A través de familiares menores de 18 años	①	②
80e. A través de otras personas menores de 18 años	①	②
80f. De otra forma	①	②

81. Pensando en el último mes ¿cuánta plata gastaste en...?

	Nada	Menos de $1.000	Entre $1.000 y $5.000	Entre $5.001 y $10.000	Entre $10.001 y $20.000	Entre $20.001 y $40.000	Más de $40.000
81a. Cigarrillos	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
81b. Alcohol	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
81c. Marihuana	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
81d. Cocaína	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥
81e. Pasta base	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥

82. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases?

	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
82a. Las personas que fuman marihuana pueden dejar de hacerlo cuando quieran	①	②	③	④
82b. Probar marihuana una o dos veces no hace daño	①	②	③	④
82c. La mayoría de los jóvenes fuma marihuana	①	②	③	④
82d. La marihuana debería ser legal para los mayores de 18 años	①	②	③	④

A continuación vamos a preguntarte respecto a la forma y los lugares donde, según lo que tú sabes, se consiguen algunas drogas como marihuana o pasta base.

83. ¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar?

	Durante los últimos 30 días	Hace más de un mes, pero menos de un año	Hace más de un año	Nunca me han ofrecido
83a. Marihuana	①	②	③	④
83b. Cocaína	①	②	③	④
83c. Pasta Base	①	②	③	④
83d. Inhalables	①	②	③	④
83e. Éxtasis	①	②	③	④
83f. Metanfetaminas	①	②	③	④

84. ¿Qué edad tenías cuando te ofrecieron por primera vez alguna de estas drogas, sea para probar o comprar?

	Años de edad
84a. Marihuana	◯
84b. Cocaína	◯
84c. Pasta Base	◯

Marca "0" en la hoja de respuestas si no te han ofrecido

85. Pensando en la última vez que te ofrecieron marihuana ¿en qué lugar te la ofrecieron?

① En tu casa
② En tu colegio
③ En los alrededores de tu colegio
④ En una fiesta, junta, discoteque, recitales
⑤ En la casa de un amigo
⑥ En los alrededores de tu casa
⑦ Por Internet, mail o chateando
⑧ Nunca me han ofrecido

86. Y esa última vez que te ofrecieron marihuana ¿quién te la ofreció?

① Algún familiar
② Algún amigo
③ Alguien que conoces pero no es tu amigo
④ Alguien que tú no conoces
⑤ Nunca me han ofrecido

Las siguientes preguntas son sobre tus padres. Si has sido criado principalmente por un padrastro u otra persona responde pensando en ellos. Por ejemplo, si tienes un padrastro y un padre natural, contesta pensando en el que ha sido más importante en tu crianza.

87. ¿Quién es el jefe de tu hogar?

① Padre
② Madre
③ Abuela o Abuelo
④ Otro

88. ¿Qué educación alcanzaron tu padre, tu madre y el/la jefe/a de hogar?

	Básica incompleta	Básica completa	Media incompleta	Media completa	Técnica superior incompleta	Técnica superior completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	No sé o No aplica
88a. Padre	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
88b. Madre	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
88c. Jefe de hogar	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

89. ¿Con qué personas vives actualmente?

① Padre y madre
② Padre y su pareja
③ Madre y su pareja
④ Sólo con el padre
⑤ Sólo con la madre
⑥ Sólo con Hermana(s) o hermano(s)
⑦ Sólo con Abuelo(s) o Abuela(s)
⑧ Otro adulto responsable

Las siguientes preguntas tienen relación con las personas con quien vives, en especial con tu padre, madre o el adulto que es responsable por tu bienestar y cuidado

90. ¿Has conversado con alguno de tus padres o apoderados acerca de las consecuencias del consumo de drogas?

① Si
② No

91. ¿Crees tú que alguno de tus padres o apoderados saben que has probado o consumido alguna droga? (no consideres alcohol, cigarrillos o tranquilizantes)

① Si
② No
③ Nunca he probado drogas

92. Pensando en tus padres o apoderados, ¿crees que alguno de ellos consumió alguna droga cuando joven? (no consideres alcohol, cigarrillos o tranquilizantes)

① Si
② No

93. Hasta donde tú conoces ¿alguno de tus hermanos consume alguna droga ilicita (ilegal)?

① Estoy seguro que no lo ha(n) hecho
② Creo que no lo ha(n) hecho
③ Creo que lo hace(n)
④ Estoy seguro que lo hace(n)
⑤ No tengo hermanos

94. ¿Cómo describirías el hábito que tiene tu padre y madre respecto al alcohol (vino, cerveza, licor)?

	Nunca toma Alcohol	Sólo en ocasiones especiales	Sólo en fines de semana, pero nunca en días de semana	Toma alcohol diariamente, uno o dos tragos	Toma alcohol diariamente, más de dos tragos	No aplica, no tiene padre o madre vivo, no lo ve nunca
94a. Padre	①	②	③	④	⑤	⑥
94b. Madre	①	②	③	④	⑤	⑥

95. ¿Cómo crees que estaría tu papá y tu mamá en estas situaciones?

	Extremadamente molesto(a)	Bastante molesto(a)	Algo molesto(a)	Poco molesto(a)	Indiferente	No aplica
95a. Si tu papá te sorprende llegando a casa con unos tragos de más	①	②	③	④	⑤	⑥
95b. Si tu mamá te sorprende llegando a casa con unos tragos de más	①	②	③	④	⑤	⑥
95c. Si tu papá descubriera que fumas marihuana	①	②	③	④	⑤	⑥
95d. Si tu mamá descubriera que fumas marihuana	①	②	③	④	⑤	⑥

Las siguientes preguntas tienen relación con cómo te sientes en el colegio en el que estás actualmente

96. Durante este año (2011), ¿Te ha tocado asistir o participar en el colegio en actividades especificamente destinadas a prevenir el consumo de drogas, como por ejemplo charlas o talleres?

① No
② Sí, una vez
③ Sí, más de una vez

97. Durante este año, ¿has hecho la cimarra? Digamos, no fuiste al colegio una parte importante de la jornada o en toda la jornada

① Nunca
② Casi nunca
③ Pocas veces
④ Varias veces
⑤ Muchas veces

98. ¿Cuál es el promedio de notas con el que terminaste el año pasado? Describelo en estos rangos

① Menos de 4,5
② Entre 4,5 y 4,9
③ Entre 5,0 y 5,4
④ Entre 5,5 y 5,9
⑤ Entre 6,0 y 6,4
⑥ Entre 6,5 y 7,0

99. En general, ¿tú consideras que en tu colegio hay estudiantes que traen, toman o comparten alcohol dentro del colegio?

① Si
② No

100. En general, ¿tú consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos **dentro** del colegio?

① Si
② No

101. ¿Y tú consideras que en los **alrededores** de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio?

① Si
② No

102. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido has hecho alguna de las siguientes cosas en el colegio?

	Nunca	Una vez	Dos veces	3 o 4 veces	5 o más veces
102a. Participado en un grupo que molesta a un compañero que está solo	①	②	③	④	⑤
102b. Participado en un grupo que ha agredido físicamente a un compañero que está solo	①	②	③	④	⑤
102c. Participado en un grupo que ha comenzado una pelea con otro grupo	①	②	③	④	⑤
102d. Comenzado una pelea solo con otro compañero	①	②	③	④	⑤
102e. Has robado algo a alguien en el colegio	①	②	③	④	⑤

103. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te ha sucedido alguna de las siguientes cosas en el colegio?

	Nunca	Una vez	Dos veces	3 o 4 veces	5 o más veces
103a. Has sido molestado estando solo, por un grupo del colegio	①	②	③	④	⑤
103b. Has sido físicamente agredido estando solo, por un grupo del colegio	①	②	③	④	⑤
103c. Has estado en un grupo que ha sido atacado por otro grupo	①	②	③	④	⑤
103d. Alguien solo ha iniciado un pelea contigo	①	②	③	④	⑤
103e. Te han robado algo en el colegio	①	②	③	④	⑤

104. ¿Cuán probable es que pases de curso este año?

① Es seguro
② Muy probable
③ Más o menos probable
④ Poco probable
⑤ Imposible

105. ¿Cuán probable es que termines cuarto medio?

① Es seguro
② Muy probable
③ Más o menos probable
④ Poco probable
⑤ Imposible

106. ¿Cuán probable es que sigas estudiando después del colegio? (en la Universidad, Instituto Profesional, Centro de Formación técnica u otro)

① Es seguro
② Muy probable
③ Más o menos probable
④ Poco probable
⑤ Imposible

Las siguientes preguntas son sobre tus amigos y la relación que mantienes con ellos

107. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te ha tocado estar cerca de alguien o alrededor de un grupo que ha estado consumiendo alguna de estas cosas con el evidente propósito de volarse, drogarse o embriagarse?

	Nunca	Casi nunca	De vez en cuando	Bastante seguido	Muy seguido
107a. Marihuana	①	②	③	④	⑤
107b. Cocaína	①	②	③	④	⑤
107c. Pasta base	①	②	③	④	⑤
107d. Inhalables	①	②	③	④	⑤
107e. Alcohol	①	②	③	④	⑤

108. ¿Con qué frecuencia te juntas con tus amigos fuera de la casa y/o del colegio en una semana normal? Digamos en un período de más de una hora y que no sea para hacer tareas o trabajos del colegio

① Todos o casi todos los días
② Algunas veces en la semana y en los fines de semana
③ Sólo los fines de semana
④ Ocasionalmente en el mes
⑤ Nunca o casi nunca

109. Si en tu grupo de amigos cercanos supieran que fumas marihuana, tú crees que:

① Te harían algún reproche o te dirían algo para que no lo hicieras
② Algunos te harían reproches y otro no
③ No te harían ningún problema
④ Te alentarían a que lo siguieras haciendo

110. ¿Si en tu grupo de amigos más cercanos supieran que has probado una droga distinta a la marihuana como cocaína, pasta base, éxtasis, ácidos o cosas parecidas, tú crees que:

① Te harían algún reproche o te dirían algo para que no lo hicieras
② Algunos te harían reproches y otro no
③ No te harían ningún problema
④ Te alentarían a que lo siguieras haciendo

111. ¿Cuántos amigos toman regularmente alcohol? Digamos, todos los fines de semana o más seguido

① Ninguno
② Menos de la mitad
③ Como la mitad
④ Más de la mitad
⑤ Todos o casi todos

112. ¿Cuántos amigos fuman regularmente marihuana? Digamos, todos los fines de semana o más seguido

① Ninguno
② Menos de la mitad
③ Como la mitad
④ Más de la mitad
⑤ Todos o casi todos

La siguiente sección se refiere a tu percepción sobre el consumo de diversas sustancias y algunas actitudes en relación a ella

113. ¿Qué te parece a ti que una persona haga las siguientes cosas?

	Ni bien ni mal	Me parece mal	Me parece muy mal
113a. Pruebe marihuana una o dos veces	①	②	③
113b. Fume regularmente marihuana	①	②	③
113c. Tome uno o dos vasos de alcohol todos los días	①	②	③
113d. Se emborrache algunas veces	①	②	③
113e. Pruebe cocaína o pasta base una o dos veces	①	②	③
113f. Fume una o más de una cajetilla de cigarrillos al día	①	②	③

114. ¿Alguna vez sentiste curiosidad por probar alguna droga como marihuana, pasta base, cocaína u otra?

① Si
② No
③ Ya he probado

115. ¿Crees tú que es probable que en el futuro consumas drogas?

① Mucho
② Bastante
③ Algo
④ Poco
⑤ Nada
⑨ No sabe

116. ¿Crees tú que el alcohol está relacionado con alguno de estos problemas?

	Mucho	Algo	Poco	Nada
116a. Accidentes de tránsito	①	②	③	④
116b. Delitos violentos	①	②	③	④
116c. Problemas familiares	①	②	③	④
116d. Problemas de salud	①	②	③	④
116e. Dificultades escolares	①	②	③	④

117. ¿Crees tú que la marihuana está relacionado con alguno de estos problemas?

	Mucho	Algo	Poco	Nada
117a. Accidentes de tránsito	①	②	③	④
117b. Delitos violentos	①	②	③	④
117c. Problemas familiares	①	②	③	④
117d. Problemas de salud	①	②	③	④
117e. Dificultades escolares	①	②	③	④

118. Durante los últimos 12 meses ¿Qué tan a menudo te han ocurrido las siguientes cosas, producto de tu consumo de ALCOHOL U OTRAS DROGAS?

	Nunca	1 vez	2 a 4 veces	5 a 10 veces	Más de 10 veces
118a. Peleas con golpes, empujones o patadas	⓪	①	②	③	④
118b. Accidentes o daños físicos	⓪	①	②	③	④
118c. Ser víctima de robo	⓪	①	②	③	④
118d. Ser hospitalizado o atendido en un servicio de urgencia	⓪	①	②	③	④
118e. Tener relaciones sexuales sin condón	⓪	①	②	③	④
118f. Tener relaciones sexuales de las que te has arrepentido el día siguiente	⓪	①	②	③	④
118g. Ser detenido o tener problemas con la autoridad	⓪	①	②	③	④

119. ¿Has recibido alguna vez en la vida algún tipo de tratamiento por el consumo de alcohol o drogas?

① No
② Sí, por alcohol
③ Sí, por drogas
④ Sí, por alcohol y drogas
⑨ No sabe, no contesta

120. Durante los últimos 12 meses ¿Has sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol o drogas?

① No
② Sí, por alcohol
③ Sí, por drogas
④ Sí, por alcohol y drogas
⑨ No sabe, no contesta

Por último, la siguiente sección aborda información adicional sobre ti.

121. ¿Con qué religión te identificas?

① Católica
② Evangélica/Protestante
③ Otra religión
④ Ninguna religión
⑨ No lo sé

122. ¿Y con qué frecuencia vas a misa u oficios religiosos de tu iglesia? (sin contar bautizos, matrimonios o funerales)

① Más de una vez a la semana
② Una vez a la semana
③ Algunas veces al mes
④ Algunas veces en el año
⑤ Nunca o casi nunca

123. ¿Cuál es tu comuna de residencia? (VER LISTADO DE COMUNAS)

○○○

124. ¿De cuánto dinero al mes dispones generalmente para tus gastos? Haz un cálculo mensual

① Menos de $5.000
② Entre $5.000 y $10.000
③ Entre $10.001 y $20.000
④ Entre $20.001 y $30.000
⑤ Entre $30.001 y $40.000
⑥ Entre $40.001 y $60.000
⑦ Más de $60.000

125. ¿Perteneces a alguno de estos pueblos originarios o indígenas?

① Aymara
② Rapa Nui
③ Quechua
④ Mapuche
⑤ Atacameño
⑥ Coya
⑦ Kawésqar
⑧ Yagán
⑨ Diaguita
⑩ No pertenezco a ningún pueblo indígena
⑪ No sé

126. ¿Trabajas regularmente además de estudiar?

① Si
② No

127. ¿Cuál es el estado conyugal actual de tus padres?

① Casados
② Convivientes y viven juntos
③ Separados, anulados, divorciados o no viven juntos
④ Viudo o viuda
⑤ Soltero o soltera
⑥ Otra situación

128. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuántos días hiciste ejercicio o actividad física, fuera del horario de clases, durante al menos 20 minutos y que te haya hecho transpirar o respirar fuertemente?

N° de días: ◯ ***Marca "0" en la hoja de respuestas si no has realizado actividad física***

129. ¿Cuál de estas situaciones describe mejor la actividad principal de tu padre y de tu madre?

	129a. Padre	**129b**. Madre	**129c**. Apoderado(a)
Trabaja jornada completa	①	①	①
Trabaja jornada parcial	②	②	②
Busca trabajo o cesante	③	③	③
Temporalmente fuera del lugar de trabajo por enfermedad prolongada u otra razón	④	④	④
Jubilado(a)	⑤	⑤	⑤
Dueña(o) de casa	⑥	⑥	⑥
Otra actividad	⑦	⑦	⑦
No sabe	⑧	⑧	⑧
No aplica	⑨	⑨	⑨

130. ¿Cuáles de los siguientes bienes poseen en tu hogar?

	Si	No
130a. Ducha	①	②
130b. TV Color	①	②
130c. Refrigerador	①	②
130d. Lavadora	①	②
130e. Calefont u otro sistema de ducha caliente	①	②
130f. Horno microonda	①	②
130g. Auto, camioneta, jeep	①	②
130h. TV cable o satelital	①	②
130i. Computador /PC	①	②
130j. Internet	①	②

131. Término de la encuesta

Hora de Término de la encuesta: ◯ : ◯◯

NOVENO ESTUDIO NACIONAL DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS EN POBLACIÓN ESCOLAR DE CHILE
DE 8° BÁSICO A 4° MEDIO, 2011
HOJA DE REGISTRO DEL CURSO

Folio

RBD | **Nombre del Establecimiento** | **Código Comuna** | **Fecha**

____/____/____
(día / mes / año)

Curso

1. Octavo Básico
2. Primero Medio
3. Segundo Medio
4. Tercero Medio
5. Cuarto Medio

Letra del Curso

1. A	6. F	11. K
2. B	7. G	12. L
3. C	8. H	13. M
4. D	9. I	14. N
5. E	10. J	15. Z

Tipo de colegio

1. Municipal
2. Particular Subvencionado
3. Particular Pagado

Tipo de establecimiento

1. Técnico-Profesional
2. Científico-Humanista
3. Polivalente
4. Otro

Tipo de jornada escolar

1. Solo mañana
2. Solo tarde
3. Mañana y tarde (jornada escolar completa)

Tipo de Orientación

1. Laico
2. Religioso católico (de curas, monjas o laicos expresamente católicos)
3. Religioso no católico

Tipo de alumnos

1. Solo hombres
2. Solo mujeres
3. Mixto

N° de matrículas, ausencias y encuestados

	Hombres	Mujeres	Total
a. N° Alumnos matriculados en el curso			
b. N° Alumnos ausentes			
c. N° Alumnos encuestados			

Nombre del Encuestador | **Hora de Inicio** : | **Hora de Término** :

ENCUESTADOR: estas preguntas se hacen para propósitos de validación del cuestionario y no pretenden evaluar su desempeño. Ninguna de las dificultades que se mencionan más abajo invalidan o menoscaban su trabajo.

Anote el número de alumnos

	N° alumnos
a. Alumnos que rehusaron responder el cuestionario	
b. Alumnos que se demoraron menos de 20 minutos en contestar el cuestionario	
c. Alumnos que se demoraron más de 60 minutos en contestar el cuestionario	
d. Alumnos que se levantaron e hicieron reiteradas preguntas sobre el cuestionario	
e. Alumnos que rehusaron explícitamente contestar una pregunta del cuestionario	
f. Alumnos que se retiraron de la sala por cualquier razón y después no volvieron	
g. Alumnos que no quisieron entregar el cuestionario que habían respondido	

¿Cuántos alumnos se mostraron ruidosos, inquietos y conversadores mientras contestaban el cuestionario?

1. Todos
2. Casi todos
3. La mayoría
4. Algunos
5. Pocos o muy pocos

¿Cuántos alumnos se mostraron realmente interesados en el estudio?

1. Todos
2. Casi todos
3. La mayoría
4. Algunos
5. Pocos o muy pocos

¿Cuántos alumnos mostraron contestar seriamente el cuestionario?

1. Todos
2. Casi todos
3. La mayoría
4. Algunos
5. Pocos o muy pocos

Por favor, indique si se presentaron algunas de las siguientes situaciones mientras se aplicó el cuestionario

	SÍ	NO
a. Hubo algún incidente mayor, disturbio, pelea o algo por el estilo, dentro de la sala de clases, que obligó a interrumpir la sesión o distrajo gravemente la sesión.	1	2
b. Hubo algún incidente fuera de la sala de clases que obligó a interrumpir la sesión o distrajo gravemente la atención de los alumnos.	1	2
c. Hubo alumnos que conversaron abiertamente y molestaron a sus compañeros.	1	2
d. Hubo muchos comentarios en voz baja, cuchicheos y risas.	1	2

¿Ha estado el colegio en paro y/o en toma?

Sí, solo en paro	1
Sí, solo en toma	2
Sí, en paro y en toma	3
Ni en paro, ni en toma	4

SI HA ESTADO EN PARO, ¿entre qué fechas?

Inicio (Día/mes)	/
Término (Día/mes)	/

SI HA ESTADO EN TOMA, ¿entre qué fechas?

Inicio (Día/mes)	/
Término (Día/mes)	/

FONO DROGAS Y ALCOHOL

188 800 100 800

DESDE CELULARES **800 22 18 18**

www.senda.gob.cl