


## ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA EXPOSICIÓN INVOLUNTARIA A HUMO DE TABACO AMBIENTAL (HTA) EN LUGARES DE TRABAJO EN CHILE

### Exposición a HTA en población general

\* El 31,5% de la población con 15 años o más está expuesta a humo de tabaco entre lunes y jueves, porcentaje que aumenta a 38,1% de viernes a domingo.(1)

### Exposición a HTA en lugares de trabajo

\* Casi un tercio (31%) de los trabajadores chilenos dice que son fumadores pasivos en sus lugares de trabajo. Uno de cada 10 trabajadores entre los 15 y 45 años está expuesto a HTA en el trabajo. La exposición a HTA en el trabajo es dos veces más común en sectores económicos medios y altos que en el sector bajo. (2)



### Impactos de exposición a HTA en bares y restaurantes

\* **El 65% de los trabajadores NO fumadores** de bares y restaurantes en Chile están expuestos permanentemente al humo de tabaco ambiental del tabaco (3).

\* **Los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes** para fumadores de Santiago presentan mayores índices de nicotina en el pelo que aquellos que trabajan en locales para NO fumadores (4).

\* Una encuesta realizada a 77 trabajadores en 18 bares para fumadores reveló un promedio de permanencia en el trabajo de 9 horas diarias durante 6 días a la semana. **El 64.8% señaló estar siempre o casi siempre expuesto al humo de tabaco en el trabajo.** (5)

FUENTES: (1) Encuesta Nacional de Salud 2009-10, Ministerio de Salud. (2) Encuesta Nacional de Salud 2009-10, Ministerio de Salud. (3) Erazo, M; Iglesias V, Droppelmann, A et al. "Secondhand tobacco smoke in bars and restaurants in Santiago, Chile: evaluation of partial smoking ban legislation in public places". *Tobacco Control* 2010;19:469-474. (4) Iglesias V, Erazo, M; Droppelmann, A; Aceituno, P; Orellana, S; Navas Ancien, A. *Revista Chilena de Salud Pública*, Vol. 14, N° 2/3, 2010. (5) Aceituno P et al, trabajo presentado a las Jornadas de Salud Pública 2009, Escuela Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.