

Chile 
Libre de tabaco

TABAQUISMO EN CHILE, UN PROBLEMA PAÍS


DRA. LIDIA AMARALES
MAGISTER EN SALUD PÚBLICA
BRONCOPULMONAR INFANTIL-PEDIATRA

Índice

- ❖ Epidemiología
- ❖ Estudios Poblacionales de Fumador Pasivo en Chile
- ❖ Impacto de la Ley de Tabaco actual
- ❖ Evidencia Nacional de exposición a HTA
- ❖ Opinión pública de los HLHT
- ❖ Necesidad de nueva Ley

Muertes Relacionadas al Tabaco

Chile 2009



Costos del Tabaco en Chile

- ❖ En Chile mas de 41 personas diarias mueren cada día por enfermedades asociadas al tabaco: 1 chileno cada media hora (MINSAL)
- ❖ Si se disminuyera el consumo de tabaco de 43% a 30%, evitaría 2.694 muertes anuales (Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible - Chile 2007)
- ❖ El gasto en enfermedades asociadas a tabaquismo es de US\$ 1.140 millones, de un presupuesto total para Chile de US\$ 6.000 millones: 18.3% (Ministro de Salud)



Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010

- ❖ En Chile el 40.6% de la población general adulta fuma actualmente (diario y ocasional):
 - ▶ Total de personas: 5.350.000
 - ▶ Mayor prevalencia en RM: 46.6%
 - ▶ Grupo etareo de 25-44 años prevalencia de 49.4%
 - ▶ Fumador diario: 73%
- ❖ Existe mayor consumo de tabaco en los niveles educacionales mas bajos:
 - ▶ 14.7 cigarros diarios NEDU Bajo
 - ▶ 9 cigarros diarios NEDU Alto


Chile 
Libre de tabaco

Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010

- ❖ El 33.2 % de los fumadores es dependiente del cigarrillo:
 - ❖ Aumento de dependencia al aumentar la edad: 40% en > 65 años
 - ❖ Alta dependencia en hombres NEDU bajo: 62% vs 23% NEDU alto

- ❖ El 65,7% de los fumadores tiene intención de dejar de fumar:
 - ❖ 78.5% de los hombres de grupo etáreo 25-44 años
 - ❖ 72.7% hombres / 57.8% mujeres

Tabaquismo: aumenta inequidad




Fuente: CONACE

- NSE bajo y alto aumenta de 2 a 5.2 puntos entre 2006 y 2008

- 2008:
NSE bajo 30,7%
NSE alto 25,5%

Prevalencia actual de consumo de tabaco en adultos*




Informe sobre Control del Tabaco para la Región de las Américas OPS 2011

Prevalencia actual de consumo de tabaco en jóvenes*



Informe sobre Control del Tabaco para la Región de las Américas OPS 2011

Prevalencia de tabaquismo, último mes, en países americanos



Fuente; Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2008

Chile
Libre de tabaco



Atlas de Tabaco en Chile

- ❖ En 2010. las ganancias de la industria tabacalera correspondió a casi U\$ 6000 por cada muerte provocada por tabaco.
- ❖ Consumo actual de tabaco es de 860 cigarrillos por cápita
- ❖ El 28% de los niños de 13-15 años y el 39,9% de las niñas actualmente fuman en Chile

www.tobaccoatlas.org




Índice

- ❖ Epidemiología
- ❖ Estudios Poblacionales de Fumador Pasivo en Chile
- ❖ Impacto de la Ley de Tabaco actual
- ❖ Evidencia Nacional de exposición a HTA
- ❖ Opinión pública de los HLHT
- ❖ Necesidad de nueva Ley

Exposición pasiva a tabaco.

ENS 2009-2010



Chile
Libre de tabaco



Fumadores pasivos.

ENS 2009-2010

- ▶ De Lunes a Jueves, están expuestos al Humo Ambiental del tabaco, 31,5% de chilenos/as mayores de 15 años

4 millones de personas

- ▶ La cifra aumenta a 38,1% entre viernes y domingo


5 millones

Chile
Libre de tabaco



Fumador pasivo en el trabajo


ENS 2009-2010



Chile
Libre de tabaco

Fumador pasivo en el trabajo

ENS 2009-2010




Chile
Libre de tabaco



Índice

- ❖ Epidemiología
- ❖ Estudios Poblacionales de Fumador Pasivo en Chile
- ❖ Impacto de la Ley de Tabaco actual
- ❖ Evidencia Nacional de exposición a HTA
- ❖ Opinión pública de los HLHT
- ❖ Necesidad de nueva Ley

Evolución de la prevalencia diaria de tabaco




Fuente: CONACE 2007

- Disminución de 4 puntos porcentuales
- Equivale a disminución de 21%

Chile
Libre de tabaco

Prevalencia de tabaquismo escolar

Prevalencia vida, año y mes de tabaquismo escolar



Fuente: CONACE 2009

Chile
Libre de tabaco

Disminución de
prevalencia- mes de 9
puntos porcentuales

Evaluación Objetivos Sanitarios 2000 - 2010: Tabaquismo



Objetivos Sanitarios de la Década 2000-2010:
Evaluación final del período, Ministerio de Salud

Índice

- ❖ Epidemiología
- ❖ Estudios Poblacionales de Fumador Pasivo en Chile
- ❖ Impacto de la Ley de Tabaco actual
- ❖ Evidencia Nacional de exposición a HTA
- ❖ Opinión pública de los HLHT
- ❖ Necesidad de nueva Ley



	Todos los lugares públicos y de trabajo cerrados son totalmente libres de humo de tabaco (o al menos 90% de la población está cubierta por legislación subnacional).
	Igual que la categoría anterior, pero está pendiente la reglamentación y/o la implementación.
	De seis a siete tipos de lugares públicos totalmente libres de humo de tabaco.
	De tres a cinco tipos de lugares públicos totalmente libres de humo de tabaco.
	Hasta dos tipos de lugares públicos totalmente libres de humo de tabaco.
	No se notificaron datos.

**AMBIENTES LIBRES
DE HUMO DE TABACO
Informe
sobre
Control
del Tabaco
para la Región
de las Américas
OPS 2011**



- ▶ En Chile, la concentración de nicotina ambiental en espacios para no-fumadores de bares y restaurantes fue tres veces mayor que en los locales que son completamente para no-fumadores.
- ▶ El 65% de los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes en Chile están expuestos permanentemente al HTA.


Erazo M. et al. "Secondhand tobacco smoke in bars and restaurant in Santiago, Chile: evaluation of partial smoking ban legislation in public places". *Tobacco Control* 2010; 19: 469-474

Chile
Libre de tabaco



- ▶ Los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes para fumadores de Santiago presentan mayores índices de nicotina en pelo que aquellos que trabajan en locales para NO fumadores. Iglesias, V. y col “Concentración de nicotina en pelo en trabajadores expuestos a humo de tabaco ambiental” Revista Chilena de Salud Pública. Vol 14, N° 2/3, 2010
- ▶ La concentración de cotinina en orina en trabajadores/as de locales para fumadores es 10 veces mayor en relación a los que trabajan en locales para NO fumadores.
- ▶ La prevalencia de uno o mas signos y sintomas respiratorios fue de 86,4%. Iglesias, V. y col. “ Imapacto de la exposición involuntaria a humo de tabaco ambiental sobre la salud respiratoria: estudio en trabajadores de pubs, bares y restaurant de Santiago” ESP: por publicar

Contaminación por Humo de Tabaco por $PM_{2.5}$



Chile
Libre de tabaco




Contaminación por Humo de Tabaco por PM_{2.5}

- ▶ OMS: El nivel aceptable de calidad del aire para PM_{2.5} es una media anual de 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- ▶ Aumento de riesgo de mortalidad del 6% por cada $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para concentraciones anuales y de 1% de aumento de riesgo de muerte por c/ 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para concentraciones diarias
- ▶ Norma chilena de calidad de aire para PM_{2.5}
 - ▶ Alerta ambiental: 80-109 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - ▶ Preemergencia: 110-169 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - ▶ Emergencia: 170 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ o superior

Contaminación por Humo de Tabaco por $PM_{2.5}$

Nivel de contaminación por $MP_{2.5}$ promedio según tipo de local




Chile
Libre de tabaco


Índice

- ❖ Epidemiología
- ❖ Estudios Poblacionales de Fumador Pasivo en Chile
- ❖ Impacto de la Ley de Tabaco actual
- ❖ Evidencia Nacional de exposición a HTA
- ❖ Opinión pública de los HLHT
- ❖ Necesidad de nueva Ley

Fumadores: ¿cuán de acuerdo están con que NO se fume al interior de los restaurantes?



Fumadores: 76% aumentaría o mantendría su frecuencia de visita



Encuesta “Trabajando.com” Mayo 2009

www.trabajando.com | Hay 448.111 vacantes de trabajo en toda nuestra comunidad en Iberoamérica

Inicio | Ingresar CV | Ofertas | Prácticas | Educación continua | Comunidad Laboral | Biblioteca de contenidos | Jobbus

Chile (cambiar país) | Seleccione su región

Un 88% cree que se debiesen tomar medidas para regular el consumo de tabaco en la oficina

En el marco de la celebración del día mundial sin tabaco, Trabajando.com realizó una encuesta para saber cuántos fuman en la oficina y cómo es visto esto por las empresas, sobre todo en estos tiempos, cuando las cifras de desempleo llegan a 9,8% a nivel nacional. ¿Será que los trabajadores tienen que tomar más precaución ante estos simples hechos? ¿estarán las empresas tomando más atención al tiempo que pueden perder sus empleados a la hora de salir a fumar?


Compartir en: Contacto | Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Digg | StumbleUpon | RSS

Si bien en Chile existe una ley que no permite fumar en espacios cerrados, aún hay lugares en los que es difícil establecer un control. Por eso, y en el marco del día mundial sin tabaco que se celebró el domingo 31 de mayo, es que Trabajando.com decidió realizar un estudio para ver qué pasa en las empresas chilenas y cómo es visto por ellas el hecho de que sus trabajadores fumen.

Más de 3 mil 500 personas respondieron la encuesta realizada por la Comunidad Laboral Líder de Iberoamérica, dentro de las cuales un 49,8% fuma y un 50,2% no. A la pregunta ¿en tu empresa permiten fumar?, un 58,4% asegura que no les permiten fumar por ningún motivo. Otro 26,2% dice que no hay ningún problema y finalmente, un 15,4% afirma que si bien está permitido, es mal visto.

Podemos ver que la cifra de cesantía en el trimestre febrero-abril llegó al 9,8%, es decir, estamos en medio de una situación de crisis bastante compleja, por lo tanto, se debe ser mucho más cauteloso con lo que se hace y deja de hacer en la oficina. Algo nos debe decir el hecho de que cerca de un 60% de las empresas no permite fumar en sus dependencias, si bien algunas lo hacen porque la ley lo dice, otras lo hacen porque creen que la productividad de un fumador es mucho menor a la de

Encuesta Universidad Central Enero 2011



Encuesta Diario La Tercera, Junio 2011



Índice

- ❖ Epidemiología
- ❖ Estudios Poblacionales de Fumador Pasivo en Chile
- ❖ Impacto de la Ley de Tabaco actual
- ❖ Evidencia Nacional de exposición a HTA
- ❖ Opinión pública de los HLHT
- ❖ Necesidad de nueva Ley

Propuestas Generales

- ❖ Cambio de Ley:
 - ❖ Ambientes Libres de Humo de Tabaco
 - ❖ Prohibición de Publicidad Indirecta y en lugares de venta
 - ❖ Aumento del tamaño, número y fuerza de las advertencias
 - ❖ Fiscalización y sanción efectivas
- ❖ Aumento de Impuesto
- ❖ Inclusión en el AUGE
 - ❖ Cesación en Atención Primaria
 - ❖ Prevención y Promoción en Salas IRA y ERA

A photograph of a green field with several white crosses scattered across it. The crosses are simple, T-shaped structures. The field is lush green, and the crosses are arranged in a somewhat irregular pattern. The text "Sector NO fumadores" is overlaid on the image in white, italicized font.

Sector NO fumadores

EL QUE NO LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ES PORQUE NO QUIERE



www.chilelibredetabaco.cl

Chile
Libre de tabaco



www.chilelibredetabaco.cl

Chile 
Libre de tabaco

