

# Presente y futuro del tabaquismo en Chile

#### DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

MAGISTER SALUD PÚBLICA © BRONCOPULMONAR INFANTIL-PEDIATRA

#### Ley del Tabaco



#### Original

- I. Aumento de Impuestos
- 2. Promoción Publicidad
- Prohibición venta de tabaco a 
  18 años
- 4. Advertencia
- Prohibición de fumar en órganos del Estado
- 6. Prohibición de fumar en restoranes, bares, discos
- 7. Rol de Autoridades Sanitarias

- I. Aumento de Impuestos
- 2. Promoción directa o indirecta
- 3. A 300 metros
- 4. I o mas advertencias
- 5. Total
- 6. Total, salgo espacios al aire libre o sala cerrada
- 7. AS aplicación del Código Sanitario

#### **Definitiva**


- I. Sin aumentos de impuestos
- Promoción sólo directa
- 3. A 100 metros
- 4. I o mas advertencias sucesivas
- 5. Permitido en oficinas individuales
- 6. Restoranes y bares < y > 100 mts; discos permitidos
- 7. AS sólo notificadoras

### ¿ Que impacto ha tenido la Ley del Tabaco a 5 años de su implementación ?



#### Prevalencia de tabaquismo escolar

#### Tabaquismo en escolares 1997 - 2009




Fuente: CONACE 2009




# Evolución de la prevalencia diaria de tabaco en población escolar

#### Uso Diario de Tabaco




#### Percepción Riesgo Escolares



Fuente: CONACE 2007




#### en países americanos





#### Tabaquismo por grupo de edad

Tendencia de consumo de tabaco por grupo de edad. Chile 1994 - 2008



Fuente: CONACE



### Tabaquismo

Reducir el consumo de tabaco

En población general: 25%

(de 40 % a 30 %)

En escolares de 8º básico: 26%

(de 27% a 20 %)

En mujeres en edad fértil: 11% (de 45 a 40 %)

#### **Estancamiento**

CONACE:

2000: 42,7%

2004: 42,5%

Encuesta Calidad de

Vida

2000: 40%

2006 **39,5%** 

#### Disminución

2001: 26,1%

2003: **24%** 

2005: **26%** 

2007: 20.4%

(CONACE)

#### Retroceso

19-25 años:

2000: **52% -** 2004: **55%** 

26-34 años

2000: **45% -** 2004: **48%** 

35-44 años

2000: **45% -** 2004: **47%** (CONACE)

# Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010

- ❖ En Chile el 40.6% de la población general adulta fuma actualmente (diario y ocasional).
- \* En grupo etareo de 25-44 años la prevalencia es de 49.4%
- El fumador actual baja 1.4 puntos porcentuales en 7 años (ENS 2003)
- Existe mayor consumo de tabaco en los niveles educacionales mas bajos: I4.7 cigarros diarios NEDU Bajo / 9 cigarros diarios NEDU Alto



# Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010

- El 33.2 % de los fumadores es dependiente del cigarrillo:
  - Aumento de prevalencia al aumentar la edad: 40% en > 65 años
  - ❖ Mayor prevalencia el las mujeres > 65 años: 47.1%
  - ❖ Alta dependencia en hombres NEDU bajo: 62% / 22.9% NEDU alto
- ❖ El 65,7% de los fumadores tiene intención de dejar de fumar:
  - ❖ 78.5% de los hombres de grupo etáreo 25-44 años
  - ❖ 72.7% hombres / 57.8% mujeres



# ¿ Como la industria tabacalera utiliza los resquicios legales y compra de influencias?



#### Publicidad Encubierta





Divulgación de tácticas de la industria tabacalera de utilizar personas, grupos de lobby y organizaciones afiliadas para promover sus intereses Artículo 5.3 del CMCT



- Directorio de BAT Chile está constituida por ex autoridades de alto rango, tanto del gobierno militar como de los gobiernos democráticos: ex Ministro de Hacienda, ex Ministro de Economía, ex integrante del Tribunal Constitucional y ex presidenta de ONG responsable de la transparencia
- En actual gobierno, el Presidente del Directorio de BAT Chile es a su vez miembro del Consejo Directivo de Libertad y Desarrollo, de donde provienen la parte importante de los equipos ministeriales: Hacienda, Economía y Secretaría General de la Presidencia











QUIENES SOMOS **AUSPICIADORES** 

SOCIOS

ORGANIZACIÓN | EVENTOS Y SOCIALES

ARCHIVOS DESCARGABLES | BENEFICIOS |























# ¿ Cuales son las nuevas evidencias para modificar la ley?



#### Exposicion a tabaco ambiental en Chile.

#### Evaluación de la ley anti-tabaco

DrPh Marcia Erazo- DrPh Verónica Iglesia

#### **Hallazgos**



- Los niveles de nicotina ambiental se mantienen altos en los lugares de uso público en Santiago, independientemente si éstos son para fumadores, mixtos o no fumadores.
- Comparado con 2002, hay una reducción de la contaminación por humo de tabaco de un 85% sólo en los locales que cambiaron a estatus "no fumador".
- Las áreas "libres de humo" de tabaco en locales mixtos, presentaron niveles más altos de nicotina en aire, cuando se comparan con los lugares libres de humo.



#### Exposicion a tabaco ambiental en Chile.

#### Evaluación de la ley anti-tabaco

DrPh Marcia Erazo- DrPh Verónica Iglesia

#### Hallazgos



- Los sistemas de barrera implementados son insuficientes para eliminar la exposición a humo de tabaco ambiental.
- Los clientes no respetan la actual prohibición de no fumar en lugares libres de humo de tabaco.
- Los trabajadores y clientes no fumadores están altamente expuestos al humo de tabaco ajeno, incluso en los lugares "libres de humo de tabaco".



#### Exposicion a tabaco ambiental en Chile.

#### Evaluación de la ley anti-tabaco

DrPh Marcia Erazo- DrPh Verónica Iglesia

#### Conclusión



 Con estos hallazgos, se vuelve imperioso revisar la actual ley y discutir la implementación de una ley que prohiba definitivamente fumar en espacios de uso público.






Encuesta a clientes de restaurantes de Santiago sobre preferencias en zonas para fumadores o no fumadores María Teresa Valenzuela y col.

¿Cuán de acuerdo está usted con que NO se fume en el interior de los restaurantes?

#### Nivel de acuerdo



78% está de acuerdo o muy de acuerdo con que NO se permita fumar al interior de los restaurantes








### Fumadores: ¿cuán de acuerdo están con que NO se fume al interior de los restaurantes?


#### Nivel de acuerdo







### Si NO se fumara al interior de los restaurantes, usted:




4 de 5 personas (80%) aumentaría o mantendría su frecuencia de visita a restaurantes si NO se fumara en ellos





### Fumadores: 76% aumentaría o mantendría su frecuencia de visita



# Concentración de nicotina en pelo en trabajadores expuestos a humo de tabaco ambiental Verónica Iglesias y col.

#### Resultados:

- Mayor concentración de nicotina en pelo de trabajadores no fumadores fue en locales para fumadores: 5.5
- Locales para no fumadores: 3.5
- Locales mixtos: 3.7

#### Conclusiones:

Los resultados muestran que los trabajadores de este tipo de locales quedan desprotegidos frente a la actual ley del tabaco que prohíbe parcialmente la exposición a humo de tabaco ambiental en lugares públicos. Dado el potencial riesgo en salud asociado con la exposición a HTA resulta urgente reevaluar la ley

Libre de tabace

### ¿ Cuales son nuetras propuestas?



### Propuestas Generales

- Cambio de Ley:
  - Ambientes Libres de Humo de Tabaco
  - Prohibición de Publicidad Indirecta y en lugares de venta
  - Aumento del tamaño, número y fuerza de las advertencias
  - Fiscalización y sanción por Autoridades Sanitarias
- Aumento de Impuesto
- Inclusión en el AUGE
  - Cesación en Atención Primaria
  - Prevención y Promoción en Salas IRA y ERA



#### Fortalecimiento de la capacidad

American Cancer Sociaty World Lung Foundation

- Desarrollo del liderazgo
- Apoyo político
- \* Inversión en infraestructura para la vigilancia
- \* Aplicación uniforme de leyes para el control del tabaco
- Promoción de organizaciones e instituciones no gubernamentales sólidas y efectivas
- Capacitación de los ciudadanos con información, habilidades y recursos para controlar el tabaco y promocionar la salud pública





www.chilelibredetabaco.cl



# Convenio Marco Control del Tabaco Recomendaciones OMS

- Aumento de los impuestos
- Limitar acceso de menores de edad
- Prohibiciones de Publicidad y Promoción
- Advertencias Sanitarias
- Ambientes Libres del Humo de Tabaco
- Empaquetado y etiquetado
- Educación y formación del público
- Apoyo a fumadores para dejar de fumar



#### Costos del Tabaco en Chile

- En Chile mas de 41 personas diarias mueren cada día por enfermedades asociadas al tabaco
- El aumento de la brecha de tabaquismo entre NSE alto y bajo es una nueva causa de inequidad

El gasto en enfermedades asociadas a tabaquismo es de US\$
 1.100 millones, de un presupuesto total para Chile de US\$
 6.000 millones: 18.3% (Ministro de Salud)

